

**AMENAJAMENT PASTORAL
COMUNA ȘEICA MARE**

- 2018 -



**PROCES VERBAL DE AVIZARE A TEMEI DE
PROIECTARE**

Conferința I – Comuna ȘEICA MARE

Nr. 5227 din 02.08. 2017

I. OBIECTIVUL AVIZĂRII.

Tema de proiectare pentru Amenajamentul pastoral al UAT-ului Șeica Mare, întocmit de grupul de lucru format conform Legii 86/2014 și a normativelor de punere în aplicare a prezentei legi (art. 8 alin. 2).

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Șeica Mare, județul Sibiu.

II. COMPONENTA ECHIPEI DE AMENAJARE.

Grupul de lucru este alcătuit din:

- Directia pentru Agricultură Județeană Sibiu:

- Ing. DRUSAN Tiberiu



- Consilier - Responsabil proiect

- Ing. DANILESCU Ion



- UAT Șeica Mare -

- Secretar Comună - Coman Vasile



-

- Consilier – Menchiu Florin Andrei



III. DATE DE AMENAJARE.

Conform Temei de proiectare discutate și avizate, suprafața de studiat, rezultată din acte, este de **4425,71 ha**, pe teritoriul a **137 trupuri** cu următoarea structură:

| Localizare | Categorie de folosință (ha) | | | Suprafața (ha) |
|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|----------------|
| | Pășune | Fâneață | Neproduktiv | |
| UAT Seica Mare | 1866,62 | 2559,09 | 961,29 | 5387 |
| Număr de trupuri - | 137 | | | |
| TOTAL | | | | 5387 |

IV. CONCLUZII.

Amenajamentul pastoral va cuprinde elemente referitoare la situația teritorial – administrativă, caracteristici geografice, climatice și pedologice ale terenului acoperit de pajiști studiat, precum și descrierea parcelară, cu încadrarea lor în tipuri de pajiști, conform normativelor în vigoare. De asemenea, va include date despre capacitatea de pășunat și lucrările de îngrijire și îmbunătățire a pajiștilor.

Reprezentanții UAT Șeica Mare avizează realizarea studiului de Amenajament pastoral, pe suprafețele declarate și cu ajutorul datelor prezentate.

Prezentul document s-a întocmit în 2 exemplare, 1 pentru proiectant și 1 pentru beneficiar.

Luat la cunoștință

Primar:

Șușa Nicolae



**PROCES VERBAL DE AVIZARE A TEMEI DE
PROIECTARE**

Conferința II – Comuna Șeica Mare

Nr. 6496 din 17.10.2018

V. OBIECTIVUL AVIZĂRII.

Tema de proiectare pentru Amenajamentul pastoral al UAT-ului Șeica Mare, întocmit de grupul de lucru format conform Legii 86/2014 și a normativelor de punere în aplicare a prezentei legi (art. 8 alin. 2).

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială **Șeica Mare**, județul Sibiu.

VI. COMPONENTA ECHIPEI DE AMENAJARE.

Grupul de lucru este alcătuit din:

- Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu:

- Ing. DRUSAN Tiberiu



- Consilier - Responsabil proiect

- Ing. DANILESCU Ion



- UAT Șeica Mare -

- Secretar Comună - Coman Vasile



- Consilier – Menchiu Florin Andrei



VII. DATE DE AMENAJARE.

Conform Temei de proiectare discutate și avizate, suprafața de studiat, rezultată din acte, este de **4425,71 ha**, pe teritoriul a **137 trupuri** cu următoarea structură:

| Localizare | Categorია de folosință (ha) | | | Suprafața (ha) |
|--------------------|-----------------------------|---------|-------------|----------------|
| | Pășune | Fâneață | Neproductiv | |
| UAT Seica Mare | 1866,62 | 2559,09 | 961,29 | 5387 |
| Număr de trupuri - | 137 | | | |
| TOTAL | | | | 5387 |

VIII. CONCLUZII.

Amenajamentul pastoral va cuprinde elemente referitoare la situația teritorial – administrativă, caracteristici geografice, climatice și pedologice ale terenului acoperit de pajiști studiat, precum și descrierea parcellară, cu încadrarea lor în tipuri de pajiști, conform normativelor în vigoare. De asemenea, va include date despre capacitatea de pășunat și lucrările de îngrijire și îmbunătățire a pajiștilor.

Reprezentanții UAT Șeica Mare avizează realizarea studiului de Amenajament pastoral, pe suprafețele declarate și cu ajutorul datelor prezentate.

Prezentul document s-a întocmit în 2 exemplare, 1 pentru proiectant și 1 pentru beneficiar.

Luat la cunoștință

Primar:

Șușa Nicolae



| <u>CUPRINS:</u> | Pag. |
|--|-------------|
| INTRODUCERE | 2 |
| CAP. 1. SITUAȚIA TERITORIAL – ADMINISTRATIVĂ | 7 |
| CAP. 2. ORGANIZAREA TERITORIULUI | 9 |
| CAP. 3. CARACTERISTICI GEOGRAFICE ȘI CLIMATICE | 82 |
| CAP. 4. VEGETAȚIA | 87 |
| CAP. 5. CADRUL DE AMENAJARE | 91 |
| CAP. 6. ORGANIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA, DOTAREA ȘI FOLOSIREA PAJIȘTILOR | 97 |
| CAP. 7. DESCRIERE PARCELARĂ | 109 |
| CAP. 8. DIVERSE | 221 |
| CAP. 9. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ | 229 |
| HĂRȚI | 230 |

INTRODUCERE

Pajiștile sunt un element esențial al sistemelor de agricultură durabilă. Pe lângă rolul decisiv de asigurarea furajelor pentru animale, au o funcție importantă în dezvoltarea rurală și a mediului înconjurător prin conservarea biodiversității, îmbunătățirea fertilității solului, fixarea simbiotică a azotului, sechestrarea carbonului, echilibru hidrologic, prevenirea inundațiilor și alunecărilor de teren, calitatea peisajului și important patrimoniu cultural.

În zilele noastre, sistemele de creștere a animalelor bazate pe valorificarea pajiștilor, trebuie să facă față necesităților de hrană tot mai mari, iar producția de furaje obținute pe aceste suprafețe să țină pasul cu cerințele tot mai mari de carne și lapte și cu schimbările climatice.

Pajiștile permanente din țara noastră au o răspândire de aproximativ 4,9 milioane hectare și reprezintă 33% din suprafața agricolă, România ocupând în Europa, locul 5.

Aria de răspândire a suprafeței pajiștilor se regăsește pe toate formele de relief, de la altitudinea din Delta Dunării și câmpie, până la altitudinea de 2500 m de pe platourile alpine ale munților Carpați. 79 % din suprafața de pajiști este situată în zona de deal și montană. Din suprafața totală de pajiști din țara noastră, 68% o reprezintă pășunile, iar 32 % fânețele. *(Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov - Ghid de întocmire a amenajamentelor pastorale –2014).*

Pajiștile agricole înregistrate ca pășune/fâneată la data de 1 ianuarie 2007, alcătuiesc suprafața de pajiști care trebuie menținută la nivel național. *(Legea 86/2014).*

Ținând cont de importanța creșterii animalelor și de facilitarea accesului acestora la suprafețele de pajiști disponibile, aflate atât în domeniul public, cât și în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, în condițiile în care pentru majoritatea crescătorilor de animale singura sursă de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obținută de pe pajiști, este necesară reglementarea modului de utilizare a pajiștilor.

Pajiștile permanente din extravilanul localităților, denumite în continuare pajiști permanente, sunt terenuri consacrate producției de iarbă și de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane, care nu au făcut parte din sistemul de rotație a culturilor din exploatație timp de cel puțin 5 ani sau mai mult, așa cum este prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului European.

Pajiștile permanente pot include și alte specii, precum arbuștii și/sau arborii, utilizați și pentru pășunat, cu condiția ca iarba și alte plante furajere să rămână predominante. *(Legea 86/2014)*

În categoria pajiști sunt cuprinse și: pășunile împădurite cu consistența mai mică de 0,4, calculată numai pentru suprafața ocupată efectiv de vegetația forestieră; pășunile alpine; pășunile situate în zonele inundabile ale râurilor și în Lunca Dunării și Rezervația Biosferei "Delta Dunării". *(O.U.G. 34/2013 modificată prin Legea 86/2014).*

Modul de gestionare a pajiștilor se stabilește prin amenajamente pastorale, în condițiile legii. *(H.G. 78/2015, art. 8 alin. 1).*

ORDIN nr. 544 din 21 iunie 2013, privind - metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște, emis de MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE (act publicat în monitorul oficial nr. 386 din 28 iunie 2013).

Ordonanța de urgență nr. 15 din 27 mai 2015 pentru modificarea art.2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18 / 1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3 / 2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36 / 1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură.

Hotararea nr. 78 din 4 februarie 2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 aprobată prin Hotararea Guvernului nr. 1064/2013 (act publicat în Monitorul Oficial nr. 124 din 18 februarie 2015).

Legea nr. 86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18 / 1991.

Ordinul nr. 407 din 31 mai 2013 (publicat în MO nr 333 din 7 iunie 2013) pentru aprobarea contractelor - cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public / privat al comunelor , orașelor, respectiv municipiilor.

HOTĂRÂRE nr. 1.064, din 11 decembrie 2013, privind **Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991**, document emis de Guvernul României (act publicat în monitorul oficial nr. 833 din 24 decembrie 2013).

HOTĂRÂRE nr. 214 din 12 aprilie 2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013.

ORDIN nr. 234 din 10 iulie 2017 pentru modificarea și completarea procedurii privind recepția studiilor pedologice și agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare și a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 125/2017

Amenajamentul pastoral este o lucrare cu caracter complex, care are ca scop reglementarea procesului de producție al pajiștilor permanente, după care se conduce întreaga activitate pastorală.

Reprezintă documentația care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice și economice necesare ameliorării și exploatării pajiștilor (H.G. 1064/2013, art.1 lit. a).

Pentru conservarea și utilizarea durabilă a pajiștilor, importante datorită diversității lor biologice mari, este necesară dezvoltarea unor planuri speciale de management care să conțină măsuri specifice de îngrijire și întreținere, recoltarea la momentul optim a fânețelor, folosirea rațională a pășunilor ca durată de pășunat, încărcarea cu animale, circulație...

Scopul final al punerii în practică a amenajamentelor pastorale constă în diminuarea sau înlăturarea procesului de degradare a pajiștilor permanente printr-un mod rațional de gospodărire a fondului pastoral național. (Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov - Ghid de întocmire a amenajamentelor pastorale –2014).

Consiliile locale au obligația să elaboreze amenajamentul pastoral, valabil pentru toate pajiștile aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză. Actualizarea proiectelor de amenajamente pastorale se realizează la o perioadă de 10 ani.

Pentru punerea în valoare a pajiștilor aflate în domeniul public al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor și pentru folosirea eficientă a acestora, unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de concesiune / închiriere, în condițiile legii, pentru suprafețele de pajiști disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani.

Folosirea și exploatarea pajiștilor se face cu respectarea bunelor condiții agricole și de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (*Legea 86/2014*).

Datorită faptului că pajiștile sunt amplasate în condiții staționare foarte variate, sunt afectate de o serie de factori limitativi pentru producția de furaje: aciditatea solului, eroziune, exces de umiditate, salinitate și alcalinitate, textura solului, fertilitate scăzută și altele, care ajung să influențeze 60% din suprafața pajiștilor permanente. Creșterea producției pajiștilor este posibilă doar prin măsuri ameliorative de înlăturare sau de diminuare a acțiunii acestor factori limitativi. (*Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov - Ghid de întocmire a amenajamentelor pastorale –2014*).

Unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, au obligația de a include în cadrul documentației de concesiune sau închiriere a pajiștilor permanente, amenajamentul pastoral și condiții speciale de îndeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Consiliul local, după aprobarea proiectului de amenajament pastoral valabil pentru toate pajiștile aflate pe raza unității administrativ-teritoriale în cauză, inclusiv suprafețele aflate la ADS de pe raza UAT respective, va stabili în răspunderea directă a primarilor, distribuirea extraselor din proiectul de amenajament pastoral tuturor proprietarilor și / sau utilizatorilor de pajiști.

Proiectul de amenajament pastoral va cuprinde, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele elemente (conform *H.G. 78/2015, art. 9 alin. 2*):

a) descrierea situației geografice, topografice și planul parcelar al pajiștilor aflate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale;

b) descrierea solului și a florei;

c) capacitatea de pășunat a pajiștii;

d) lucrările de îngrijire și îmbunătățire a pajiștilor;

e) planul de fertilizare și măsurile agropedoameliorative.

Implementarea amenajamentelor pastorale se face de către utilizatori, cu asistența tehnică a specialiștilor din cadrul Consiliilor locale.

Definiții de termeni utilizați în studiu, conform legislației în vigoare:

- iarbă și alte plante furajere erbacee - toate plantele erbacee care se găsesc în mod tradițional pe pășunile și fânețele naturale sau care sunt incluse în amestecurile specifice pentru însămânțări și supraînsămânțări, din familiile de graminee și de leguminoase, utilizate ca furaje în hrana animalelor erbivore, pe baza cărora se calculează producția, valoarea nutrițională a pajiștii și capacitatea de pășunat;

- pășuni și fânețe - suprafețe agricole înscrise în actele de proprietate cu aceste categorii de folosință, care sunt destinate producerii de furaje, iarbă și alte plante erbacee pentru animale, recoltate prin cosire sau valorificate prin pășunare;
- unitate vită mare (UVM) - unitate de măsură standard stabilită pe baza necesarului de hrană al fiecărei specii de animale, care permite conversia diferitelor categorii de animale;
- utilizator de pășuni și fânețe - crescător de animale persoană fizică având animale înscrise în Registrul național al exploatațiilor (RNE) / crescător de animale, orice tip de persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Codului civil, având animale proprii sau ale membrilor, înscrise în RNE, care desfășoară activități agricole specifice categoriei de folosință pajiști, conform clasificării statistice a activităților economice în Comunitatea Europeană pentru producția vegetală și animală (H.G. 1064/2013, art. 1 lit. C), care deține legal dreptul de folosință asupra suprafeței agricole și care valorifică pășunea prin pășunare cu efective de animale aflate în proprietatea sa sau prin cosire cel puțin o dată pe an;
- Registrul național al exploatațiilor (RNE) - colecția de date în format electronic care cuprinde informațiile de identificare a fiecărei exploatații din România;
- deținători de pajiști - titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deținători ai pajiștilor;
- schimbarea destinației suprafețelor de pajiște - schimbarea categoriei de folosință a pajiștilor / scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosință pajiște;
- amenajament pastoral - documentație care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice și economice necesare ameliorării și exploatării pajiștilor;
- capacitate de pășunat - reprezintă numărul de animale care pot fi hrănite pe suprafața de 1 ha de pajiște în întreaga perioadă de pășunat, se exprimă în unități vită mare (UVM) la hectar și se determină prin raportarea producției efective la necesarul de furaje pentru 1 UVM.
- activitate agricolă ce se desfășoară pe pajiști:
 - creșterea bovinelor de lapte (grupa 014, clasa 0141);
 - creșterea altor bovine (grupa 014, clasa 0142);
 - creșterea cailor și altor cabaline (grupa 014, clasa 0143);
 - creșterea ovinelor și caprinelor (grupa 014, clasa 0145). (Regulamente CE).
- caiet de lucru - în care vor fi trecute toate lucrările efectuate pe fiecare trup de pajiște / parcelă în ordinea efectuării lor. În încheierea fiecărei mențiuni cu lucrări efectuate persoana care completează datele își va trece numele, data și va semna pentru conformitate.

Lucrările ce se vor efectua vor fi cele propuse de specialiștii amenajați, se vor respecta indicațiile lor privind momentul și ordinea executării lor, cât și metodologia menționată. Caietul de lucru va fi completat de către utilizatori și se va afla în posesia acestora pe toată perioada contractului de închiriere.

Lucrările trecute în caietul de lucru vor fi datate (ziua /zilele, luna, anul efectuării) și în mod obligatoriu utilizatorul, care completează materialul, își va trece numele și va semna ca garant al executării acestora. Dacă perioada de închiriere este mai redusă ca durată decât cea

a amenajamentului, caietul va fi predat reprezentativilor UAT- ului, după studierea judicioasă a

acestui în scopul verificării executării întocmai a lucrărilor propuse de specialiștii amenajști, pe baza unui proces verbal de predare - primire. Dacă pe teritoriul UAT-ului există

mai mulți utilizatori care au concesionat pe o durată determinată pajiștile, fiecare dintre aceștia

va fi obligat să posede un caiet de lucru care să acopere suprafețele utilizate și să se înscrie la alineatul anterior.

Reprezentantul desemnat al UAT-ului are dreptul să verifice caietul de lucru în scopul verificării executării lucrărilor propuse în amenajament și va notifica dacă este cazul, prin adresă scrisă către consiliul UAT-ului, neconformitățile identificate. (*Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov - Ghid de întocmire a amenajamentelor pastorale –2014*).

CADRU LEGISLATIV

Reglementarea organizării, administrării și exploatării pajiștilor permanente:

- **Ordonanța de urgență a Guvernului – OUG nr. 34/2013** privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
- **Ordin nr. 544/2013** privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște, emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
- **Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013** privind Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013.
- **Hotărârea Guvernului nr. 78/2015** privind completarea și modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013.

CAP. 1. SITUAȚIE TERITORIAL – ADMINISTRATIVĂ ȘI ORGANIZARE

Șeica Mare (în maghiară: *Nagyselyk*, în germană: *Marktschelken*) este o comună în județul Sibiu, România, formată din satele Boarta, Buia, Mighindoala, Petiș, Șeica Mare (reședința) și Ștenea.

Localitatea este situată la 30 km de municipiul Sibiu și la 12 km de Copșa Mică, 28 km de Municipiul Mediaș, pe DN 14 Sibiu-Medias, respective DJ 141 A-împreună cu localitățile aparținătoare-se întinde pe o suprafață de 12.016 ha, fiind plasat într-o zonă deluroasă a Podișului Hârțibaciului, subdiviziunea sudică a Podișului Târnavelor. Plasat între râurile Târnava Mare (nord) și Olt (sud), respectiv Valea Visei/cursul inferior al Cibinului (vest) și Subcarpații Transilvaniei (est), Podișul Hârțibaciului are altitudinea medie de 650m, cu văi adânci și largi, cu lunci nedete (care către obârșie prezintă unele mici depresii), ce adăpostesc numeroase așezări.

Pădurile au rămas doar în câteva petece reduse ca dimensiuni, locul lor fiind luat de pașuni, culturi agricole și –pe versantul dinspre râul Târnava Mare –de vii. Dealurile, înșirate de-a lungul văilor, sunt dispuse perpendicular pe râul Visa, fiind de numeroase pârâiașe formate prin acțiunea eroziv –corozivă a torenților și a unor izvoare, cel mai adesea temporare; coamele lor se largesc și ele treptat și se netezesc spre Vale Visei, oferind imaginea unor poduri suspendate mai mult sau mai puțin rotunjite, numite local șesuri (șesul Borții, șesul Călvaserului, șesul Șeicii, etc)

În zonă sunt frecventate alunecările de teren, care au dat naștere numeroaselor glimee (dâmburi în limbajul localnicilor) și au favorizat dezvoltarea proceselor de pantă –surpături (popular râpe), vizibile pe versanți din stânga (la Șeica Mare) și dreapta (la Petiș) Visei.

Rețeaua hidrografică a comunei poate fi considerată densă fără să prezinte vreun pericol major de inundații, ea este compusă din pâraiele aflate în bazinul Visei (cel mai important râu din zonă), între acestea cel mai lung (23 km) și cu aport hidrografic cel mai mare fiind Calva. Celelalte pâraie (Petiș) sunt scurte și cu debite foarte reduse în anii secetoși, însă importante pentru economia zonei, având în vedere faptul că unele dintre ele au fost amenajate de-a lungul timpului baraje și morii de apă (Valea Petișului, Valea Calvei –Buia).

Coordonatele geografice ale localității sunt L 46°01'02" latitudine nordică și 24°13'42" longitudine estică de la Greenwich.



Comuna are 3 189 locuitori după recensământul din 2011.

1.2 DENUMIREA DEȚINĂTORULUI LEGAL

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘEICA MARE cu sediul în localitatea ȘEICA MARE din județul SIBIU.

1.3 DOCUMENTE CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE SAU DEȚINERE LEGALĂ. ISTORICUL PROPRIETĂȚII.

Suprafețele de pajiști nu sunt întăbulate, dar sunt înregistrate conform Ordinului Prefectului nr.80/19.03.2012 și conform Hotărîrii nr.997/12.03.2012. Documentele care atestă dreptul de proprietate al Consiliului Local Șeica Mare, se găsesc la sediul Primăriei Șeica Mare.

Ca istoric, suprafețele de pajiști ale comunei, pe trupuri, se prezintă astfel :

- majoritatea terenurilor ce formează în prezent pădurea comunei Șeica Mare au fost la origine păduri. Ele au fost transformate de-a lungul timpului în pășuni, pentru cele mai multe fiind elaborate studii de transformare începând cu anul 1923. Pășunile actuale au fost obținute prin împroprietărire în urma Reformei agrare din 1921 sau pe bază de schimb.

În anul 1949, în urma deciziei nr. 18 al Consiliului de Stat, actualele pășuni au trecut în administrarea organelor agricole aparținând Ministerului Agriculturii, moment în care pentru aceste trupuri s-au întocmit primele amenajamente silvopastorale. Până în anul 1991, actuala pășune Șeica Mare a fost administrată de Consiliul Popular Șeica Mare și C.A.P. Șeica Mare.

Prefectura județului Sibiu transmite în proprietatea comunei Șeica Mare și în administrarea Primăriei locale, toate trupurile de pășune și fânețe aparținut comunei Șeica Mare, conform Ordinului Prefectului nr.80/19.03.2012 și Hotărîrii nr.997/12.03.2012 astfel :

Anexa 14 izlaz comunal:- Localitatea Șeica Mare –suprafață pajiști - 424,03 ha
Localitatea Calvaser – suprafața totală- 252,44 ha
Localitatea Petiș – suprafața totală- 210,78 ha
Localitatea Mighindoala –suprafața totală-76,59 ha
Localitatea Șteneș –suprafața totală- 138,26ha
Localitatea Buia – suprafața totală- 108,98 ha

Total comună Șeica Mare -1620,03 ha.

CAP. 2 ORGANIZAREA TERITORULUI

JUDETUL SIBIU

PRIMARIA COMUNEI ȘEICA MARE

2.1 Pasune - Ordinul Prefectului

PARCELELE PRELUATE DE LA IAS AXENTE SEVER -LOCALITATEA SEICA-MARE

| Nr. CRT | Numar Parcela | Numar Tarla | Suprafata | Categoria de folosinta | Observatii |
|----------------------|------------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 27 | 2 | 1,46 | Pasuni | Deal în Vale |
| 2 | 30 | 2 | 35,40 | Pasuni | Deal în Vale |
| Total tarla 2 | | | 36,86 | | |
| 3 | 31 | 3 | 3,09 | Pasuni | La Gara Seica Mare |
| 4 | 32 | 3 | 2,19 | Pasuni | La Gara Seica Mare |
| 5 | 34 | 3 | 0,47 | Pasuni | La Gara Seica Mare |
| 6 | 35 | 3 | 0,27 | Pasuni | La Gara Seica Mare |
| 7 | 57/1/1 | 3 | 3,80 | Pasuni | La Gara Seica Mare |
| Total tarla 3 | | | 9,82 | | |

PARCELELE PRELUTATE DE LA PRIMARIA SEICA MICA - LOCALITATEA SEICA-MARE

| Nr. CRT | Numar Parcela | Numar Tarla | Suprafata | Categoria de folosinta | Observatii |
|------------|------------------|----------------|-----------|------------------------|------------|
| 8 | 2115 | 67 | 1,86 | Pasuni | Sub Hedel |
| 9 | 2116 | 67 | 0,06 | Pasuni | Sub Hedel |
| 10 | 2117 | 67 | 7,79 | Pasuni | Sub Hedel |
| 11 | 2119 | 67 | 6,32 | Pasuni | Sub Hedel |
| 12 | 2122 | 67 | 5,26 | Pasuni | Sub Hedel |

| | | | | | |
|-----------------------|------|----|--------------|--------|-----------|
| 13 | 2125 | 67 | 33,98 | Pasuni | Sub Hedel |
| 14 | 2127 | 67 | 23,18 | Pasuni | Sub Hedel |
| Total tarla 67 | | | 78,45 | | |
| | | | | | |

PARCELELE AFLATE IN ADMINISTRAREA PRIMARIEI SEICA-MARE-LOCALITATEA SEICA-MARE

| Nr. CRT | Numar Parcela | Numar Tarla | Suprafata | Categoria de foiosinta | Observatii |
|-----------------------|------------------|----------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
| Total tarla 3 | | | | | |
| 15 | 1749 | 47 | 1,35 | Pasuni | Baza sportivă |
| 16 | 1750 | 47 | 0,36 | Pasuni | Baza sportivă |
| Total tarla 47 | | | 1,71 | | |
| 17 | 1819 | 48 | 2,83 | Pasuni | Baza sportivă |
| Total tarla 48 | | | 2,83 | | |
| 18 | 2020 | 62 | 7,77 | Pasuni | Baza sportivă |
| 19 | 2021 | 62 | 0,09 | Pasuni | Baza sportivă |
| 20 | 2023 | 62 | 24,99 | Pasuni | Baza sportivă |
| 21 | 2024 | 62 | 3,87 | Pasuni | Baza sportivă |
| 22 | 2026 | 62 | 0,21 | Pasuni | Baza sportivă |
| 23 | 2027 | 62 | 5,68 | Pasuni | Baza sportivă |
| 24 | 2029 | 62 | 2,57 | Pasuni | Baza sportivă |
| 25 | 2030 | 62 | 3,15 | Pasuni | Baza sportivă |
| 26 | 2031 | 62 | 0,57 | Pasuni | Baza sportivă |
| 27 | 2032 | 62 | 0,88 | Pasuni | |
| Total tarla 62 | | | 49,78 | | |
| 28 | 2147/1 | 68 | 153,47 | Pasuni | Pirlituri/Poenița DI.Sigherului |
| 29 | 2149 | 68 | 2,29 | Pasuni | Pirlituri/Poenița DI.Sigherului |
| 30 | 2152 | 68 | 1,02 | Pasuni | Pirlituri/Poenița DI.Sigherului |
| 31 | 2153 | 68 | 5,20 | Pasuni | Pirlituri/Poenița DI.Sigherului |
| 32 | 2155 | 68 | 3,46 | Pasuni | Pirlituri/Poenița DI.Sigherului |
| 33 | 2165 | 68 | 1,32 | Pasuni | Pirlituri/Poenița DI.Sigherului |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|----|---------------|--------|------------------------------------|
| 34 | 2168/1 | 68 | 26,20 | Pasuni | Pirrituri/Poenița DI.Sigherului |
| 35 | 2170 | 68 | 0,62 | Pasuni | Pirrituri/Poenița DI.Sigherului |
| Total tarla 68 | | | 193,58 | | |
| 36 | 2171 | 69 | 0,38 | Pasuni | Viile Iștioanului |
| Total tarla 69 | | | 0,38 | | |
| 37 | 2337 | 74 | 2,03 | Pasuni | Dealul Hedel |
| 38 | 2339 | 74 | 48,59 | Pasuni | Dealul Hedel |
| Total tarla 74 | | | 50,62 | | |

PARCELELE AFLATE IN ADMINISTRAREA PRIMARIEI SEICA-MARE-LOCALITATEA CALVASER

| Nr. CRT | Numar Parcela | Numar Tarla | Suprafata | Categoria de folosinta | Observatii |
|-----------------------|------------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------|
| 39 | 1186/1 | 36 | 45,00 | Pasuni | Șesul Colibelor |
| Total tarla 36 | | | 45,00 | | |
| 40 | 1194 | 37 | 38,60 | Pasuni | La Cireși |
| 41 | 1206 | 37 | 3,74 | Pasuni | La Cireși |
| 42 | 1208 | 37 | 1,08 | Pasuni | La Cireși |
| 43 | 1210 | 37 | 1,12 | Pasuni | La Cireși |
| 44 | 1211/2 | 37 | 0,18 | Pasuni | La Cireși |
| 45 | 1211/4 | 37 | 0,20 | Pasuni | La Cireși |
| 46 | 1213 | 37 | 1,54 | Pasuni | La Cireși |
| 47 | 1214 | 37 | 0,37 | Pasuni | La Cireși |
| 48 | 1215 | 37 | 0,18 | Pasuni | La Cireși |
| 49 | 1216 | 37 | 0,93 | Pasuni | La Cireși |
| 50 | 1218 | 37 | 0,71 | Pasuni | La Cireși |
| 51 | 1219 | 37 | 0,37 | Pasuni | La Cireși |
| 52 | 1220 | 37 | 0,19 | Pasuni | La Cireși |
| 53 | 1223 | 37 | 0,23 | Pasuni | La Cireși |
| 54 | 1224 | 37 | 0,06 | Pasuni | La Cireși |
| 55 | 1225 | 37 | 0,07 | Pasuni | La Cireși |
| 56 | 1226 | 37 | 0,05 | Pasuni | La Cireși |
| 57 | 1229 | 37 | 1,26 | Pasuni | La Cireși |
| 58 | 1231 | 37 | 0,15 | Pasuni | La Cireși |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|----|--------------|--------|------------------|
| Total tarla 37 | | | 51,03 | | |
| 59 | | 38 | 2,21 | Pasuni | Fintina Maigului |
| 60 | 1235 | 38 | 0,05 | Pasuni | Fintina Maigului |
| 61 | 1237 | 38 | 0,04 | Pasuni | Fintina Maigului |
| 62 | 1244 | 38 | 2,44 | Pasuni | Fintina Maigului |
| 63 | 1245 | 38 | 0,87 | Pasuni | Fintina Maigului |
| 64 | 1246 | 38 | 0,47 | Pasuni | Fintina Maigului |
| 65 | 1248 | 38 | 10,01 | Pasuni | Fintina Maigului |
| 66 | 1252 | 38 | 1,03 | Pasuni | Fintina Maigului |
| 67 | 1260 | 38 | 10,61 | Pasuni | Fintina Maigului |
| 68 | 1263 | 38 | 0,41 | Pasuni | Fintina Maigului |
| 69 | 1264/1 | 38 | 0,49 | Pasuni | Fintina Maigului |
| 70 | 1265 | 38 | 0,70 | Pasuni | Fintina Maigului |
| 71 | 1267 | 38 | 6,36 | Pasuni | Fintina Maigului |
| 72 | 1269 | 38 | 1,34 | Pasuni | Fintina Maigului |
| 73 | 1272 | 38 | 14,12 | Pasuni | Fintina Maigului |
| Total tarla 38 | | | 51,15 | | |
| 74 | 1278 | 39 | 0,05 | Pasuni | Găunoasa |
| 75 | 1279 | 39 | 0,22 | Pasuni | Găunoasa |
| 76 | 1280 | 39 | 0,03 | Pasuni | Găunoasa |
| 77 | 1281 | 39 | 0,77 | Pasuni | Găunoasa |
| 78 | 1283 | 39 | 0,13 | Pasuni | Găunoasa |
| 79 | 1288 | 39 | 3,13 | Pasuni | Găunoasa |
| 80 | 1290 | 39 | 0,14 | Pasuni | Găunoasa |
| 81 | 1291 | 39 | 0,44 | Pasuni | Găunoasa |
| 82 | 1293 | 39 | 0,57 | Pasuni | Găunoasa |
| 83 | 1295 | 39 | 2,45 | Pasuni | Găunoasa |
| 84 | 1297 | 39 | 0,18 | Pasuni | Găunoasa |
| 85 | 1299 | 39 | 0,29 | Pasuni | Găunoasa |
| 86 | 1301 | 39 | 0,34 | Pasuni | Găunoasa |
| 87 | 1302 | 39 | 0,09 | Pasuni | Găunoasa |
| 88 | 1303 | 39 | 0,78 | Pasuni | Găunoasa |
| 89 | 1307 | 39 | 2,08 | Pasuni | Găunoasa |
| 90 | 1309 | 39 | 0,76 | Pasuni | Găunoasa |

| | | | | | |
|----------------|--------|----|--------|--------|----------|
| 91 | 1311 | 39 | 0,27 | Pasuni | Găunoasa |
| 92 | 1313 | 39 | 0,39 | Pasuni | Găunoasa |
| 93 | 1317 | 39 | 0,56 | Pasuni | Găunoasa |
| 94 | 1329 | 39 | 1,50 | Pasuni | Găunoasa |
| 95 | 1334 | 39 | 3,01 | Pasuni | Găunoasa |
| 96 | 1335 | 39 | 0,12 | Pasuni | Găunoasa |
| 97 | 1337 | 39 | 0,81 | Pasuni | Găunoasa |
| 98 | 1339 | 39 | 0,78 | Pasuni | Găunoasa |
| 99 | 1341 | 39 | 0,06 | Pasuni | Găunoasa |
| 100 | 1342 | 39 | 0,04 | Pasuni | Găunoasa |
| 101 | 1349 | 39 | 6,98 | Pasuni | Găunoasa |
| 102 | 1350 | 39 | 0,05 | Pasuni | Găunoasa |
| 103 | 1352 | 39 | 0,58 | Pasuni | Găunoasa |
| 104 | 1354 | 39 | 0,07 | Pasuni | Găunoasa |
| 105 | 1355 | 39 | 1,09 | Pasuni | Găunoasa |
| 106 | 1357 | 39 | 45,00 | Pasuni | Găunoasa |
| 107 | 1360 | 39 | 15,68 | Pasuni | Găunoasa |
| 108 | 1367 | 39 | 6,07 | Pasuni | Găunoasa |
| 109 | 1370 | 39 | 0,45 | Pasuni | Găunoasa |
| 110 | 1372 | 39 | 0,96 | Pasuni | Găunoasa |
| 111 | 1374 | 39 | 0,05 | Pasuni | Găunoasa |
| 112 | 1378 | 39 | 0,14 | Pasuni | Găunoasa |
| 113 | 1383/2 | 39 | 4,40 | Pasuni | Găunoasa |
| 114 | 1388 | 39 | 1,34 | Pasuni | Găunoasa |
| 115 | 1389/1 | 39 | 2,18 | Pasuni | Găunoasa |
| 116 | 1389/2 | 39 | 0,23 | Pasuni | Găunoasa |
| Total tarla 39 | | | 105,26 | | |

PARCELE AFLATE IN ADMINISTRAREA PRIMARIEI SEICA-MARE-LOCALITATEA PETIS

| Nr. CRT | Numar Parcela | Numar Tarla | Suprafata | Categoria de folosinta | Observatii |
|------------|------------------|----------------|-----------|------------------------|------------|
| 117 | 359 | 16 | 6,05 | Pasuni | La Petis |
| 118 | 362 | 16 | 0,14 | Pasuni | La Petis |
| 119 | 365 | 16 | 0,16 | Pasuni | La Petis |

| | | | | | |
|-----------------------|-----|----|--------------|--------|---------------|
| 120 | 367 | 16 | 0,51 | Pasuni | La Petis |
| 121 | 369 | 16 | 1,23 | Pasuni | La Petis |
| 122 | 371 | 16 | 0,13 | Pasuni | La Petis |
| 123 | 373 | 16 | 2,75 | Pasuni | La Petis |
| 124 | 383 | 16 | 0,10 | Pasuni | La Petis |
| 125 | 384 | 16 | 0,02 | Pasuni | La Petis |
| 126 | 385 | 16 | 0,04 | Pasuni | La Petis |
| 127 | 387 | 16 | 4,50 | Pasuni | La Petis |
| 128 | 410 | 16 | 0,07 | Pasuni | La Petis |
| 129 | 411 | 16 | 11,98 | Pasuni | La Petis |
| 130 | 414 | 16 | 2,05 | Pasuni | La Petis |
| 131 | 416 | 16 | 0,78 | Pasuni | La Petis |
| 132 | 417 | 16 | 0,75 | Pasuni | La Petis |
| 133 | 420 | 16 | 0,39 | Pasuni | La Petis |
| 134 | 422 | 16 | 0,39 | Pasuni | La Petis |
| Total tarla 16 | | | 32,04 | | |
| 135 | 641 | 22 | 0,17 | Pasuni | Pășunea Roaba |
| 136 | 647 | 22 | 0,46 | Pasuni | Pășunea Roaba |
| 137 | 652 | 22 | 0,28 | Pasuni | Pășunea Roaba |
| 138 | 654 | 22 | 0,05 | Pasuni | Pășunea Roaba |
| 139 | 656 | 22 | 2,74 | Pasuni | Pășunea Roaba |
| 140 | 657 | 22 | 0,78 | Pasuni | Pășunea Roaba |
| 141 | 658 | 22 | 0,63 | Pasuni | Pășunea Roaba |
| 142 | 666 | 22 | 33,92 | Pasuni | Pășunea Roaba |
| Total tarla 22 | | | 39,03 | | |
| 143 | 678 | 24 | 3,35 | Pasuni | Șesul Roabei |
| 144 | 680 | 24 | 52,66 | Pasuni | Șesul Roabei |
| 145 | 681 | 24 | 6,37 | Pasuni | Șesul Roabei |
| 146 | 682 | 24 | 0,13 | Pasuni | Șesul Roabei |
| Total tarla 24 | | | 62,51 | | |
| 147 | 683 | 25 | 0,43 | Pasuni | Pășunea Roaba |
| 148 | 685 | 25 | 0,69 | Pasuni | Pășunea Roaba |
| 149 | 692 | 25 | 34,36 | Pasuni | Pășunea Roaba |
| 150 | 693 | 25 | 1,49 | Pasuni | Pășunea Roaba |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|----|--------------|--------|---------------|
| 151 | 696 | 25 | 0,33 | Pasuni | Pășunea Roaba |
| 152 | 697 | 25 | 0,16 | Pasuni | Pășunea Roaba |
| 153 | 699 | 25 | 0,04 | Pasuni | Pășunea Roaba |
| 154 | 700 | 25 | 0,15 | Pasuni | Pășunea Roaba |
| 155 | 702 | 25 | 0,13 | Pasuni | Pășunea Roaba |
| 156 | 703 | 25 | 0,54 | Pasuni | Pășunea Roaba |
| 157 | 705 | 25 | 0,47 | Pasuni | Pășunea Roaba |
| Total tarla 25 | | | 38,79 | | |
| 158 | 874 | 28 | 0,89 | Pasuni | La Petis |
| 159 | 875 | 28 | 0,62 | Pasuni | La Petis |
| 160 | 876 | 28 | 9,80 | Pasuni | La Petis |
| Total tarla 28 | | | 11,31 | | |
| 161 | 1072 | 33 | 0,65 | Pasuni | Valea Lupului |
| 162 | 1073 | 33 | 3,74 | Pasuni | Valea Lupului |
| 163 | 1074/1 | 33 | 22,71 | Pasuni | Valea Lupului |
| Total tarla 33 | | | 27,10 | | |

PARCELELE AFLATE IN ADMINISTRAREA PRIMARIEI SEICA-MARE-LOCALITATEA MIGHINDOALA

| Nr. CRT | Numar Parcela | Numar Tarla | Suprafata | Categoria de folosinta | Observatii |
|------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------------|
| 164 | 3381 | 105 | 8,89 | Pasuni | Șesul Roabei |
| 165 | 3382 | 105 | 1,02 | Pasuni | Șesul Roabei |
| Total tarla 105 | | | 9,91 | | |
| 166 | 3386 | 106 | 1,26 | Pasuni | La Mighindoala |
| Total tarla 106 | | | 1,26 | | |
| 167 | 3460 | 109 | 2,39 | Pasuni | Valea Viilor Mighindoala |
| Total tarla 109 | | | 2,39 | | |
| 168 | 3478 | 110 | 0,37 | Pasuni | Poiana Mighindoalei |
| 169 | 3480 | 110 | 4,01 | Pasuni | Poiana Mighindoalei |
| 170 | 3482 | 110 | 13,81 | Pasuni | Poiana Mighindoalei |
| 171 | 3484 | 110 | 11,19 | Pasuni | Poiana Mighindoalei |
| 172 | 3485 | 110 | 4,32 | Pasuni | Poiana Mighindoalei |
| 173 | 3486 | 110 | 15,63 | Pasuni | Poiana Mighindoalei |
| Total tarla 110 | | | 49,33 | | |

| | | | | | |
|------------------------|------|-----|--------------|--------|------------------|
| 174 | 3690 | 115 | 0,35 | Pasuni | Zăpodia Domnului |
| 175 | 3691 | 115 | 0,09 | Pasuni | Zăpodia Domnului |
| Total tarla 115 | | | 0,44 | | |
| 176 | 3697 | 116 | 2,41 | Pasuni | Coasta Hampului |
| 177 | 3701 | 116 | 2,19 | Pasuni | Coasta Hampului |
| 178 | 3708 | 116 | 2,40 | Pasuni | Coasta Hampului |
| 179 | 3709 | 116 | 1,25 | Pasuni | Coasta Hampului |
| 180 | 3711 | 116 | 0,45 | Pasuni | Coasta Hampului |
| 181 | 3715 | 116 | 0,21 | Pasuni | Coasta Hampului |
| 182 | 3718 | 116 | 4,35 | Pasuni | Coasta Hampului |
| Total tarla 116 | | | 13,26 | | |

PARCELELE AFLATE IN ADMINISTRAREA PRIMARIEI SEICA-MARE-LOCALITATEA BUIA

| Nr. CRT | Numar Parcela | Numar Tarla | Suprafata | Categoria de folosinta | Observatii |
|------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------------|------------------------------|
| 183 | 3491 | 112 | 2,60 | Pasuni | Coasta Mare /Fundul lui Iuga |
| 184 | 3492 | 112 | 0,68 | Pasuni | Coasta Mare /Fundul lui Iuga |
| 185 | 3494 | 112 | 0,48 | Pasuni | Coasta Mare /Fundul lui Iuga |
| 186 | 3496 | 112 | 1,84 | Pasuni | Coasta Mare /Fundul lui Iuga |
| 187 | 3502 | 112 | 15,27 | Pasuni | Coasta Mare /Fundul lui Iuga |
| 188 | 3512/1 | 112 | 20,02 | Pasuni | Coasta Mare /Fundul lui Iuga |
| 189 | 3516 | 112 | 1,16 | Pasuni | Coasta Mare /Fundul lui Iuga |
| 190 | 3517 | 112 | 0,44 | Pasuni | Coasta Mare /Fundul lui Iuga |
| Total tarla 112 | | | 42,49 | | |
| 191 | 3567 | 113 | 0,31 | Pasuni | Zăpodia Rîpii |
| 192 | 3583/1 | 113 | 82,83 | Pasuni | Zăpodia Rîpii |
| Total tarla 113 | | | 83,14 | | |
| 193 | 3656 | 114 | 0,81 | Pasuni | La Buia |
| 194 | 3660 | 114 | 2,16 | Pasuni | La Buia |
| Total tarla 114 | | | 2,97 | | |

| | | | | | |
|------------------------|--------|-----|--------------|--------|------------------|
| 195 | 3665 | 115 | 0,09 | Pasuni | Zăpodia Domnului |
| 196 | 3674 | 115 | 30,06 | Pasuni | Zăpodia Domnului |
| Total tarla 115 | | | 30,15 | | |
| 197 | 3814/1 | 117 | 35,80 | Pasuni | Coasta Hampului |
| Total tarla 117 | | | 35,80 | | |
| 198 | 4901 | 138 | 6,85 | Pasuni | La Buia |
| Total tarla 138 | | | 6,85 | | |
| 199 | 4971/4 | 140 | 5,50 | Pasuni | Dealul Sibiului |
| Total tarla 140 | | | 5,50 | | |
| 200 | 5046 | 141 | 0,76 | Pasuni | Gracina |
| 201 | 5064/1 | 141 | 49,04 | Pasuni | Gracina |
| 202 | 5067 | 141 | 0,76 | Pasuni | Gracina |
| Total tarla 141 | | | 50,56 | | |
| 203 | 5370/1 | 149 | 21,73 | Pasuni | Zăpodia Nucilor |
| Total tarla 149 | | | 21,73 | | |
| 204 | 5456 | 152 | 5,83 | Pasuni | Gracina |
| 205 | 5460 | 152 | 0,17 | Pasuni | Gracina |
| 206 | 5462 | 152 | 1,11 | Pasuni | Gracina |
| Total tarla 152 | | | 7,11 | | |
| 207 | 5474/1 | 153 | 3,90 | Pasuni | Ograda |
| 208 | 5484/1 | 153 | 3,17 | Pasuni | Ograda |
| Total tarla 153 | | | 7,07 | | |
| 209 | 5901 | 168 | 2,69 | Pasuni | Cioara |
| 210 | 5905 | 168 | 0,68 | Pasuni | Cioara |
| Total tarla 168 | | | 3,37 | | |
| 211 | 5935 | 170 | 4,34 | Pasuni | Pîrul Boghi |
| 212 | 5948/1 | 170 | 14,50 | Pasuni | Pîrul Boghi |
| 213 | 5950 | 170 | 0,79 | Pasuni | Pîrul Boghi |
| 214 | 5951 | 170 | 0,22 | Pasuni | Pîrul Boghi |
| 215 | 5954 | 170 | 5,20 | Pasuni | Pîrul Boghi |
| Total tarla 170 | | | 25,05 | | |
| 216 | 6070 | 172 | 5,45 | Pasuni | Pășunea Sașilor |
| 217 | 6072 | 172 | 0,02 | Pasuni | Pășunea Sașilor |
| 218 | 6076 | 172 | 16,75 | Pasuni | Pășunea Sașilor |

| | | | | | |
|------------------------|--------|-----|--------------|--------|-----------------|
| Total tarla 172 | | | 22,22 | | |
| 219 | 6101 | 173 | 20,51 | Pasuni | Pășunea Sașilor |
| Total tarla 173 | | | 20,51 | | |
| 220 | 6153/1 | 174 | 45,91 | Pasuni | Zăpodea Cetății |
| Total tarla 174 | | | 45,91 | | |

PARCELELE AFLATE IN ADMINISTRAREA PRIMARIEI SEICA-MARE-LOCALITATEA STENEA

| Nr. CRT | Numar Parcela | Numar Tarla | Suprafata | Categoria de folosinta | Observatii |
|------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------------|--------------|
| | 5496 | 154 | 1,78 | Pasuni | Șesul Ștenii |
| 221 | 5497/1 | 154 | 0,42 | Pasuni | Șesul Ștenii |
| Total tarla 154 | | | 2,20 | | |
| 222 | 5503 | 156 | 0,02 | Pasuni | Dumbrava |
| 223 | 5504 | 156 | 1,63 | Pasuni | Dumbrava |
| 224 | 5506 | 156 | 1,85 | Pasuni | Dumbrava |
| 225 | 5508 | 156 | 9,63 | Pasuni | Dumbrava |
| 226 | 5509 | 156 | 9,41 | Pasuni | Dumbrava |
| 227 | 5510 | 156 | 7,02 | Pasuni | Dumbrava |
| 228 | 5511 | 156 | 0,38 | Pasuni | Dumbrava |
| 229 | 5543 | 156 | 1,62 | Pasuni | Dumbrava |
| 230 | 5545 | 156 | 0,74 | Pasuni | Dumbrava |
| 231 | 5549 | 156 | 0,56 | Pasuni | Dumbrava |
| Total tarla 156 | | | 32,86 | | |
| 232 | 5551 | 157 | 0,02 | Pasuni | Dumbrava |
| 233 | 5554 | 157 | 0,07 | Pasuni | Dumbrava |
| 234 | 5557 | 157 | 0,03 | Pasuni | Dumbrava |
| 235 | 5558 | 157 | 0,10 | Pasuni | Dumbrava |
| 236 | 5560 | 157 | 0,05 | Pasuni | Dumbrava |
| 237 | 5561 | 157 | 0,06 | Pasuni | Dumbrava |
| 238 | 5566 | 157 | 8,81 | Pasuni | Dumbrava |
| 239 | 5569 | 157 | 2,27 | Pasuni | Dumbrava |
| 240 | 5571 | 157 | 2,04 | Pasuni | Dumbrava |
| 241 | 5576 | 157 | 1,64 | Pasuni | Dumbrava |
| 242 | 5580 | 157 | 0,92 | Pasuni | Dumbrava |

| | | | | | |
|------------------------|--------|-----|--------------|--------|--------------|
| Total tarla 157 | | | 16,01 | | |
| 243 | 5665 | 160 | 28,02 | Pasuni | Delul Viilor |
| Total tarla 160 | | | 28,02 | | |
| 244 | 5671 | 161 | 1,73 | Pasuni | Delul Viilor |
| 245 | 5677 | 161 | 10,33 | Pasuni | Delul Viilor |
| 246 | 5681/1 | 161 | 0,82 | Pasuni | Delul Viilor |
| Total tarla 161 | | | 12,88 | | |
| 247 | 4489 | 131 | 1,83 | Pasuni | Delul Viilor |
| 248 | 4493 | 131 | 2,33 | Pasuni | Delul Viilor |
| 249 | 4495 | 131 | 0,88 | Pasuni | Delul Viilor |
| 250 | 4506/1 | 131 | 1,59 | Pasuni | Delul Viilor |
| Total tarla 131 | | | 6,63 | | |
| 251 | 4779 | 135 | 0,19 | Pasuni | Şesul Ştenii |
| 252 | 4790 | 135 | 13,75 | Pasuni | Şesul Ştenii |
| 253 | 4791 | 135 | 0,56 | Pasuni | Şesul Ştenii |
| 254 | 4794 | 135 | 0,47 | Pasuni | Şesul Ştenii |
| 255 | 4795 | 135 | 0,15 | Pasuni | Şesul Ştenii |
| 256 | 4796 | 135 | 4,90 | Pasuni | Şesul Ştenii |
| 257 | 4797 | 135 | 0,52 | Pasuni | Şesul Ştenii |
| 258 | 4798 | 135 | 18,59 | Pasuni | Şesul Ştenii |
| Total tarla 135 | | | 39,13 | | |

PARCELELE AFLATE IN ADMINISTRAREA PRIMARIEI SEICA-MARE-LOCALITATEA BOARTA

| Nr. CRT | Numar Parcela | Numar Tarla | Suprafata | Categoria de folosinta | Observatii |
|------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------------|------------|
| 259 | 4352 | 125 | 0,38 | Pasuni | Năsîndoala |
| 260 | 4354 | 125 | 0,04 | Pasuni | Năsîndoala |
| 261 | 4355 | 125 | 0,01 | Pasuni | Năsîndoala |
| 262 | 4357 | 125 | 0,25 | Pasuni | Năsîndoala |
| 263 | 4368 | 125 | 58,80 | Pasuni | Năsîndoala |
| Total tarla 125 | | | 59,48 | | |
| 264 | 4430 | 128 | 11,40 | Pasuni | La Boarta |
| 265 | 4431 | 128 | 1,30 | Pasuni | La Boarta |
| Total tarla 128 | | | 12,70 | | |

| | | | | | |
|-----------------|------|-----|-------|--------|--------------------------|
| 266 | 4442 | 130 | 0,95 | Pasuni | Pășunatul Vacilor Boarta |
| 267 | 4444 | 130 | 0,25 | Pasuni | Pășunatul Vacilor Boarta |
| 268 | 4455 | 130 | 34,65 | Pasuni | Pășunatul Vacilor Boarta |
| Total taria 130 | | | 35,85 | | |

| | |
|---------------------|----------------|
| TOTAL Pasune | 1620,03 |
|---------------------|----------------|

| | | | | | |
|-----|------|-----|------|--------|----------|
| 269 | 5536 | 156 | 0,03 | fanete | Dumbrava |
| 270 | 5537 | 156 | 0,01 | fanete | Dumbrava |
| 280 | 5538 | 156 | 0,49 | fanete | Dumbrava |

| | |
|---------------------|-------------|
| TOTAL FANETE | 0,53 |
|---------------------|-------------|

| | | |
|----------------------|--|----------------|
| TOTAL GENERAL | | 1620,56 |
|----------------------|--|----------------|

PRIMAR,

ȘUȘA NICOLAE

SECRETAR,

COMAN VASILE

INTOCMIT,

MENCHIU FLORIN ANDREI



2.2 TABEL CENTRALIZATOR- PASUNI

UAT Seica Mare

| Nr. crt. | Nr. Tarla | UAT Seica Mare | Suprafata din Registrul cadastral | Categoria de folosinta | Denumire populara |
|----------|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 11 | 5,84 | P - PASUNI | Deal in vale |
| 2 | 2 | 2 | 0,94 | P - PASUNI | Deal in vale |
| 3 | 2 | 6 | 0,19 | P - PASUNI | Deal in vale |
| 4 | 2 | 8 | 0,36 | P - PASUNI | Deal in vale |
| 5 | 2 | 9 | 0,92 | P - PASUNI | Deal in vale |
| | Total tarla 2 | | 8,25 | | |
| 6 | 3 | 45 | 0,11 | P - PASUNI | La gara Seica Mare |
| | Total tarla 3 | | 0,11 | | |
| 7 | 16 | 397 | 0,21 | P - PASUNI | Dealul Furnicilor |
| 8 | 16 | 399 | 1,20 | P - PASUNI | Dealul Furnicilor |
| 9 | 16 | 400 | 0,22 | P - PASUNI | Dealul Furnicilor |
| 10 | 16 | 401 | 0,04 | P - PASUNI | Dealul Furnicilor |
| 11 | 16 | 402 | 0,07 | P - PASUNI | Dealul Furnicilor |
| 12 | 16 | 403 | 0,50 | P - PASUNI | Dealul Furnicilor |
| 13 | 16 | 404 | 0,39 | P - PASUNI | Dealul Furnicilor |
| | Total tarla 16 | | 2,63 | | |
| 14 | 19 | 484 | 0,14 | P - PASUNI | Balcau |
| 15 | 19 | 524 | 17,84 | P - PASUNI | Balcau |
| | Total tarla 19 | | 17,98 | | |
| 16 | 21 | 595 | 0,10 | P - PASUNI | Roaba |
| 17 | 21 | 622 | 1,28 | P - PASUNI | Roaba |

| | | | | | |
|----|-------------------|------|-------|------------|-------------------|
| | Total tarla 21 | | 1,38 | | |
| 18 | 22 | 667 | 1,04 | P - PASUNI | Dealul Furnicilor |
| 19 | 22 | 673 | 3,90 | P - PASUNI | Dealul Furnicilor |
| 20 | 22 | 676 | 1,03 | P - PASUNI | Dealul Furnicilor |
| | Total tarla 22 | | 5,97 | | |
| 21 | 26 | 760 | 1,60 | P - PASUNI | Gaura Portii |
| 22 | 26 | 764 | 12,42 | P - PASUNI | Gaura Portii |
| 23 | 26 | 766 | 1,29 | P - PASUNI | Gaura Portii |
| 24 | 26 | 775 | 0,17 | P - PASUNI | Gaura Portii |
| | Total tarla 26 | | 15,48 | | |
| 25 | 28 | 864 | 18,00 | P - PASUNI | Gaura Portii |
| 26 | 28 | 866 | 0,16 | P - PASUNI | Gaura Portii |
| | Total tarla 28 | | 18,16 | | |
| 27 | 29 | 957 | 1,11 | P - PASUNI | Malai |
| 28 | 29 | 962 | 0,24 | P - PASUNI | Malai |
| 29 | 29 | 963 | 2,62 | P - PASUNI | Malai |
| 30 | 29 | 965 | 0,46 | P - PASUNI | Malai |
| | Total tarla 29 | | 4,43 | | |
| 31 | 31 | 1018 | 2,29 | P - PASUNI | Malai |
| 32 | 31 | 996 | 4,12 | P - PASUNI | Malai |
| | Total tarla 31 | | 6,41 | | |
| 33 | 41 | 1428 | 0,26 | P - PASUNI | Coasta Rapii |
| | Total tarla 41 | | 0,26 | | |
| 34 | 43 | 1521 | 0,42 | P - PASUNI | Dealul Teis |
| 35 | 43 | 1524 | 0,34 | P - PASUNI | Dealul Teis |
| | Total tarla 43 | | 0,76 | | |

| | | | | | |
|----|-------------------|--------|-------|------------|----------------|
| 36 | 44 | 1556 | 0,09 | P - PASUNI | Coasta marului |
| 37 | 44 | 1563 | 0,11 | P - PASUNI | Coasta marului |
| | Total tarla 44 | | 0,20 | | |
| 38 | 45 | 1615 | 0,02 | P - PASUNI | Coasta marului |
| 39 | 45 | 1671 | 0,10 | P - PASUNI | Coasta marului |
| 40 | 45 | 1690 | 0,10 | P - PASUNI | Coasta marului |
| | Total tarla 45 | | 0,22 | | |
| 41 | 61 | 2016 | 1,72 | P - PASUNI | Valea Mare |
| 42 | 61 | 2017 | 13,66 | P - PASUNI | Valea Mare |
| | Total tarla 61 | | 15,38 | | |
| 43 | 63 | 2033 | 0,22 | P - PASUNI | Valea Mare |
| 44 | 63 | 2034 | 4,65 | P - PASUNI | Valea Mare |
| 45 | 63 | 2040 | 0,25 | P - PASUNI | Valea Mare |
| 46 | 63 | 2048 | 6,23 | P - PASUNI | Valea Mare |
| | Total tarla 63 | | 11,35 | | |
| 47 | 70 | 2224-5 | 0,36 | P - PASUNI | Intre lacuri |
| 48 | 70 | 2226 | 0,34 | P - PASUNI | Intre lacuri |
| | Total tarla 70 | | 0,70 | | |
| 49 | 76 | 2401 | 0,26 | P - PASUNI | In Hedel |
| | Total tarla 76 | | 0,26 | | |
| 50 | 77 | 2430 | 0,29 | P - PASUNI | Pe Visa |
| 51 | 77 | 2432 | 0,72 | P - PASUNI | Pe Visa |
| 52 | 77 | 2433 | 0,04 | P - PASUNI | Pe Visa |
| 53 | 77 | 2434 | 0,12 | P - PASUNI | Pe Visa |
| | Total tarla 77 | | 1,17 | | |
| 54 | 90 | 2939 | 0,35 | P - PASUNI | Redea |

| | | | | | |
|----|--------------------|------|------|------------|--------------------|
| 55 | 90 | 2944 | 0,18 | P - PASUNI | Redea |
| 56 | 90 | 2948 | 0,42 | P - PASUNI | Redea |
| | Total tarla 90 | | 0,95 | | |
| 57 | 91 | 2962 | 0,02 | P - PASUNI | La Ochiuri |
| | Total tarla 91 | | 0,02 | | |
| 58 | 93 | 3086 | 0,15 | P - PASUNI | Grivoaia |
| 59 | 93 | 3093 | 0,10 | P - PASUNI | Grivoaia |
| | Total tarla 93 | | 0,25 | | |
| 60 | 94 | 3118 | 0,05 | P - PASUNI | Lanul lui Onut |
| 61 | 94 | 3123 | 0,13 | P - PASUNI | Lanul lui Onut |
| 62 | 94 | 3124 | 0,07 | P - PASUNI | Lanul lui Onut |
| | Total tarla 94 | | 0,25 | | |
| 63 | 95 | 3139 | 0,15 | P - PASUNI | Capul Barcului |
| | Total tarla 95 | | 0,15 | | |
| 64 | 98 | 3196 | 0,56 | P - PASUNI | Valea Puntii |
| | Total tarla 98 | | 0,56 | | |
| 65 | 105 | 3307 | 0,22 | P - PASUNI | Valea Mighindoalei |
| | Total tarla 105 | | 0,22 | | |
| 66 | 106 | 3389 | 3,02 | P - PASUNI | Sub Cearman |
| | Total tarla 106 | | 3,02 | | |
| 67 | 113 | 3550 | 1,38 | P - PASUNI | Zapodea cu Rapi |
| | Total tarla 113 | | 1,38 | | |
| 68 | 114 | 3653 | 0,27 | P - PASUNI | Zapodea Morii |
| | Total tarla 114 | | 0,27 | | |

| | | | | | |
|----|--------------------|------|------|------------|---------------------|
| 69 | 115 | 3676 | 0,07 | P - PASUNI | Zapodea Domnului |
| 70 | 115 | 3680 | 1,36 | P - PASUNI | Zapodea Domnului |
| | Total tarla 115 | | 1,43 | | |
| 71 | 116 | 3732 | 0,02 | P - PASUNI | Coasta Hampului |
| 72 | 116 | 3735 | 0,11 | P - PASUNI | Coasta Hampului |
| 73 | 116 | 3752 | 1,80 | P - PASUNI | Coasta Hampului |
| 74 | 116 | 3785 | 0,07 | P - PASUNI | Coasta Hampului |
| | Total tarla 116 | | 2,00 | | |
| 75 | 119 | 4023 | 0,17 | P - PASUNI | Dealul Mighindoalei |
| 76 | 119 | 4026 | 4,11 | P - PASUNI | Dealul Mighindoalei |
| 77 | 119 | 4028 | 0,26 | P - PASUNI | Dealul Mighindoalei |
| | Total tarla 119 | | 4,54 | | |
| 78 | 120 | 4113 | 0,04 | P - PASUNI | Nisindoala |
| 79 | 120 | 4140 | 0,74 | P - PASUNI | Nisindoala |
| 80 | 120 | 4142 | 0,12 | P - PASUNI | Nisindoala |
| | Total tarla 120 | | 0,90 | | |
| 81 | 122 | 4174 | 0,44 | P - PASUNI | Nucari |
| 82 | 122 | 4175 | 0,02 | P - PASUNI | Nucari |
| 83 | 122 | 4176 | 0,05 | P - PASUNI | Nucari |
| 84 | 122 | 4177 | 7,03 | P - PASUNI | Nucari |
| 85 | 122 | 4178 | 0,09 | P - PASUNI | Nucari |
| 86 | 122 | 4180 | 0,08 | P - PASUNI | Nucari |
| 87 | 122 | 4182 | 0,09 | P - PASUNI | Nucari |
| | Total tarla 122 | | 7,80 | | |
| 87 | 124 | 4321 | 0,18 | P - PASUNI | Valea Viilor |
| | Total tarla 124 | | 0,18 | | |
| 88 | 128 | 4397 | 2,40 | P - PASUNI | Sesul Stenii |

| | | | | | |
|-----|--------------------|---------|------|------------|--------------|
| 89 | 128 | 4409 | 0,41 | P - PASUNI | Sesul Stenii |
| | Total tarla 128 | | 2,81 | | |
| 90 | 130 | 4450 | 0,11 | P - PASUNI | Sesul Stenii |
| 91 | 130 | 4453 | 0,07 | P - PASUNI | Sesul Stenii |
| 92 | 130 | 4457 | 0,1 | P - PASUNI | Sesul Stenii |
| | Total tarla 130 | | 0,28 | | |
| 93 | 131 | 4480 | 1,55 | P - PASUNI | Sesul Stenii |
| 94 | 131 | 4481 | 0,13 | P - PASUNI | Sesul Stenii |
| 95 | 131 | 4506/02 | 1,43 | P - PASUNI | Sesul Stenii |
| | Total tarla 131 | | 3,11 | | |
| 96 | 132 | 4527 | 0,20 | P - PASUNI | Sesul Stenii |
| 97 | 132 | 4542 | 0,26 | P - PASUNI | Sesul Stenii |
| 98 | 132 | 4543 | 0,05 | P - PASUNI | Sesul Stenii |
| 99 | 132 | 4545 | 0,19 | P - PASUNI | Sesul Stenii |
| 100 | 132 | 4548 | 0,09 | P - PASUNI | Sesul Stenii |
| 101 | 132 | 4559 | 1,49 | P - PASUNI | Sesul Stenii |
| | Total tarla 132 | | 2,28 | | |
| 102 | 133 | 4582 | 7,42 | P - PASUNI | Sesul Stenii |
| 103 | 133 | 4588 | 0,62 | P - PASUNI | Sesul Stenii |
| 104 | 133 | 4591 | 0,09 | P - PASUNI | Sesul Stenii |
| | Total tarla 133 | | 8,13 | | |
| 105 | 134 | 4669 | 0,53 | P - PASUNI | Sesul Stenii |
| 106 | 134 | 4683 | 0,15 | P - PASUNI | Sesul Stenii |
| 107 | 134 | 4691 | 1,33 | P - PASUNI | Sesul Stenii |
| | Total tarla 134 | | 2,01 | | |
| 108 | 135 | 4722 | 0,16 | P - PASUNI | Inuri |
| 109 | 135 | 4731 | 0,89 | P - PASUNI | Inuri |

| | | | | | |
|-----|--------------------|------|------|------------|------------------|
| 110 | 135 | 4756 | 0,06 | P - PASUNI | Inuri |
| 111 | 135 | 4757 | 0,50 | P - PASUNI | Inuri |
| 112 | 135 | 4769 | 0,20 | P - PASUNI | Inuri |
| 113 | 135 | 4771 | 0,11 | P - PASUNI | Inuri |
| | Total tarla 135 | | 1,92 | | |
| 114 | 138 | 4906 | 0,08 | P - PASUNI | Sesul Buii |
| | Total tarla 138 | | 0,08 | | |
| 115 | 139 | 4923 | 0,11 | P - PASUNI | Sesul Buii |
| 116 | 139 | 4947 | 0,21 | P - PASUNI | Sesul Buii |
| 117 | 139 | 4949 | 0,09 | P - PASUNI | Sesul Buii |
| | Total tarla 139 | | 0,41 | | |
| 118 | 140 | 4967 | 0,07 | P - PASUNI | Dealul Sibiului |
| 119 | 140 | 4969 | 0,03 | P - PASUNI | Dealul Sibiului |
| 120 | 140 | 4978 | 1,30 | P - PASUNI | Dealul Sibiului |
| 121 | 140 | 5008 | 0,25 | P - PASUNI | Dealul Sibiului |
| 122 | 140 | 5009 | 0,04 | P - PASUNI | Dealul Sibiului |
| | Total tarla 140 | | 1,69 | | |
| 123 | 146 | 5195 | 1,10 | P - PASUNI | Fagetul lui Bela |
| | Total tarla 146 | | 1,10 | | |
| 124 | 147 | 5317 | 6,99 | P - PASUNI | Gruul morii |
| | Total tarla 147 | | 6,99 | | |
| 125 | 148 | 5330 | 2,52 | P - PASUNI | Faget |
| | Total tarla 148 | | 2,52 | | |
| 126 | 149 | 5374 | 0,28 | P - PASUNI | Zapodia Nucilor |
| 127 | 149 | 5390 | 0,11 | P - PASUNI | Zapodia Nucilor |
| | Total tarla 149 | | 0,39 | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------|---------|-------|------------|---------------|
| 128 | 152 | 5469 | 0,55 | P - PASUNI | Cioara |
| 129 | 152 | 5471 | 0,40 | P - PASUNI | Cioara |
| | Total tarla 152 | | 0,95 | | |
| 130 | 153 | 5476 | 0,31 | P - PASUNI | Ograda |
| 131 | 153 | 5479 | 0,54 | P - PASUNI | Ograda |
| 132 | 153 | 5484/02 | 0,02 | P - PASUNI | Ograda |
| | Total tarla 153 | | 0,87 | | |
| 133 | 154 | 5497/02 | 0,37 | P - PASUNI | Pisc |
| | Total tarla 154 | | 0,37 | | |
| 134 | 156 | 5534 | 0,05 | P - PASUNI | Pisc |
| | Total tarla 156 | | 0,05 | | |
| 135 | 158 | 5582 | 7,93 | P - PASUNI | Dumbrava |
| 136 | 158 | 5586 | 0,97 | P - PASUNI | Dumbrava |
| 137 | 158 | 5588 | 1,67 | P - PASUNI | Dumbrava |
| | Total tarla 158 | | 10,57 | | |
| 138 | 159 | 5635 | 0,54 | P - PASUNI | Dealul Viilor |
| 139 | 159 | 5640 | 0,31 | P - PASUNI | Dealul Viilor |
| 140 | 159 | 5657 | 0,30 | P - PASUNI | Dealul Viilor |
| 141 | 159 | 5658 | 2,11 | P - PASUNI | Dealul Viilor |
| | Total tarla 159 | | 3,26 | | |
| 142 | 161 | 5681 | 5,16 | P - PASUNI | Dealul Viilor |
| | Total tarla 161 | | 5,16 | | |
| 143 | 162 | 5709 | 0,21 | P - PASUNI | Dealul Viilor |
| 144 | 162 | 5733 | 45,39 | P - PASUNI | Dealul Viilor |
| | Total tarla 162 | | 45,60 | | |
| 145 | 163 | 5753 | 0,01 | P - PASUNI | Dealul Viilor |


| | | | | | |
|-----|--------------------|------|------|------------|-----------------|
| | Total tarla 163 | | 0,01 | | |
| 146 | 165 | 5826 | 0,06 | P - PASUNI | Dealul ciorii |
| 147 | 165 | 5830 | 1,92 | P - PASUNI | Dealul ciorii |
| | Total tarla 165 | | 1,98 | | |
| 148 | 168 | 5878 | 0,61 | P - PASUNI | Dealul ciorii |
| 149 | 168 | 5890 | 0,18 | P - PASUNI | Dealul ciorii |
| 150 | 168 | 5896 | 3,67 | P - PASUNI | Dealul ciorii |
| 151 | 168 | 5907 | 0,38 | P - PASUNI | Dealul ciorii |
| | Total tarla 168 | | 4,84 | | |
| 152 | 173 | 6128 | 0,11 | P - PASUNI | Pasunea Sasilor |
| | Total tarla 173 | | 0,11 | | |
| 153 | 174 | 6179 | 1,86 | P - PASUNI | Zapodea Cetatii |
| 154 | 174 | 6185 | 1,14 | P - PASUNI | Zapodea Cetatii |
| 155 | 174 | 6202 | 1,08 | P - PASUNI | Zapodea Cetatii |
| | Total tarla 174 | | 4,08 | | |

| | |
|---------------------|------------------|
| Total pasuni | 246,59 ha |
|---------------------|------------------|

Mentionam ca in tabel sunt trecute parcelele cu suprafata totala inregistrata in registrul cadastral, parcele care se regasesc in Titlurile de proprietate emise.

Primar,

Șușa Nicolae



Secretar,

Coman Vasile

Intocmit,

Menchiu Florin Andrei

PRIMARIA COMUNEI SEICA MARE

JUDETUL SIBIU

2.3 TABEL CENTRALIZATOR- FANETE

UAT Seica Mare

| Nr. crt. | Nr. Tarla | Parcela | Suprafata din Registrul cadastral | Categoria de folosinta | Denumire populara |
|-----------------|----------------------|----------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 13 | 0,23 | F - FANETE | Deal in vale |
| 2 | 2 | 16 | 0,74 | F - FANETE | Deal in vale |
| 3 | 2 | 17 | 1,02 | F - FANETE | Deal in vale |
| 4 | 2 | 23 | 10,30 | F - FANETE | Deal in vale |
| 5 | 2 | 25 | 0,42 | F - FANETE | Deal in vale |
| 6 | 2 | 30/01. | 36,77 | F - FANETE | Deal in vale |
| 7 | 2 | 30/02 | 6,04 | F - FANETE | Deal in vale |
| 8 | 2 | 4 | 1,86 | F - FANETE | Deal in vale |
| | Total tarla 2 | | 57,38 | | |
| 9 | 3 | 38-2 | 1,69 | F - FANETE | La gara Seica Mare |
| 10 | 3 | 43 | 0,45 | F - FANETE | La gara Seica Mare |
| 11 | 3 | 44 | 0,13 | F - FANETE | La gara Seica Mare |
| 12 | 3 | 46 | 0,18 | F - FANETE | La gara Seica Mare |
| 13 | 3 | 48 | 0,18 | F - FANETE | La gara Seica Mare |
| 14 | 3 | 49 | 3,80 | F - FANETE | La gara Seica Mare |
| 15 | 3 | 53 | 0,34 | F - FANETE | La gara Seica Mare |

| | | | | | |
|----|---------------|------|-------|------------|--------------------|
| 16 | 3 | 54 | 0,14 | F - FANETE | La gara Seica Mare |
| 17 | 3 | 56 | 0,51 | F - FANETE | La gara Seica Mare |
| 18 | 3 | 57-1 | 5,83 | F - FANETE | La gara Seica Mare |
| 19 | 3 | 58 | 2,45 | F - FANETE | La gara Seica Mare |
| 20 | 3 | 59 | 0,53 | F - FANETE | La gara Seica Mare |
| 21 | 3 | 60 | 1,11 | F - FANETE | La gara Seica Mare |
| 22 | 3 | 61 | 0,30 | F - FANETE | La gara Seica Mare |
| | Total tarla 3 | | 17,64 | | |
| 23 | 4 | 64 | 0,19 | F - FANETE | La stramturi |
| 24 | 4 | 67 | 1,91 | F - FANETE | La stramturi |
| 25 | 4 | 74 | 0,93 | F - FANETE | La stramturi |
| 26 | 4 | 76 | 0,85 | F - FANETE | La stramturi |
| 27 | 4 | 79 | 0,13 | F - FANETE | La stramturi |
| | Total tarla 4 | | 4,01 | | |
| 28 | 6 | 92 | 0,10 | F - FANETE | Lunci |
| 29 | 6 | 95 | 0,01 | F - FANETE | Lunci |
| | Total tarla 6 | | 0,11 | | |
| 30 | 7 | 101 | 0,44 | F - FANETE | La Seica |
| 31 | 7 | 107 | 0,22 | F - FANETE | La Seica |
| 32 | 7 | 111 | 0,03 | F - FANETE | La Seica |
| 33 | 7 | 112 | 8,49 | F - FANETE | La Seica |
| 34 | 7 | 116 | 0,35 | F - FANETE | La Seica |
| 35 | 7 | 118 | 11,20 | F - FANETE | La Seica |
| 36 | 7 | 119 | 0,20 | F - FANETE | La Seica |
| 37 | 7 | 124 | 0,86 | F - FANETE | La Seica |
| 38 | 7 | 128 | 0,10 | F - FANETE | La Seica |
| 39 | 7 | 134 | 0,34 | F - FANETE | La Seica |
| 40 | 7 | 138 | 1,11 | F - FANETE | La Seica |
| 41 | 7 | 139 | 0,86 | F - FANETE | La Seica |
| | Total tarla 7 | | 24,20 | | |

| | | | | | |
|----|---------------|--------|-------|------------|----------------|
| 42 | 8 | 152 | 0,45 | F - FANETE | Paraul ursului |
| 43 | 8 | 159 | 0,78 | F - FANETE | Paraul ursului |
| 44 | 8 | 160 | 15,92 | F - FANETE | Paraul ursului |
| 45 | 8 | 161-4 | 0,74 | F - FANETE | Paraul ursului |
| 46 | 8 | 165 | 0,05 | F - FANETE | Paraul ursului |
| | Total tarla 8 | | 17,94 | | |
| 47 | 9 | 169 | 0,09 | F - FANETE | Paraul ursului |
| 48 | 9 | 185-1 | 3,47 | F - FANETE | Paraul ursului |
| 49 | 9 | 185-11 | 1,07 | F - FANETE | Paraul ursului |
| 50 | 9 | 185-3 | 0,82 | F - FANETE | Paraul ursului |
| 51 | 9 | 185-7 | 6,30 | F - FANETE | Paraul ursului |
| 52 | 9 | 185-9 | 0,34 | F - FANETE | Paraul ursului |
| | Total tarla 9 | | 12,09 | | |
| 53 | 10 | 192 | 4,09 | F - FANETE | La Seica |
| 54 | 10 | 195 | 4,49 | F - FANETE | La Seica |
| 55 | 10 | 208 | 0,15 | F - FANETE | La Seica |
| 56 | 10 | 211 | 0,05 | F - FANETE | La Seica |
| 57 | 10 | 214 | 0,07 | F - FANETE | La Seica |
| 58 | 10 | 215 | 0,18 | F - FANETE | La Seica |
| 59 | 10 | 222 | 0,17 | F - FANETE | La Seica |
| 60 | 10 | 226 | 0,07 | F - FANETE | La Seica |
| 61 | 10 | 227 | 0,58 | F - FANETE | La Seica |
| 62 | 10 | 229 | 13,83 | F - FANETE | La Seica |
| 63 | 10 | 236 | 0,47 | F - FANETE | La Seica |
| 64 | 10 | 238-1 | 0,17 | F - FANETE | La Seica |
| 65 | 10 | 240 | 0,08 | F - FANETE | La Seica |
| 66 | 10 | 243-3 | 0,02 | F - FANETE | La Seica |
| 67 | 10 | 245 | 7,55 | F - FANETE | La Seica |
| 68 | 10 | 246 | 0,18 | F - FANETE | La Seica |
| 69 | 10 | 248-1 | 6,61 | F - FANETE | La Seica |

| | | | | | |
|----|----------------|-------|-------|------------|---------------|
| 70 | 10 | 248-2 | 1,15 | F - FANETE | La Seica |
| 71 | 10 | 252 | 1,00 | F - FANETE | La Seica |
| | Total tarla 10 | | 40,91 | | |
| 72 | 11 | 256 | 3,26 | F - FANETE | Sesul Rapii |
| 73 | 11 | 257-1 | 4,83 | F - FANETE | Sesul Rapii |
| 74 | 11 | 257-3 | 3,23 | F - FANETE | Sesul Rapii |
| 75 | 11 | 260 | 0,42 | F - FANETE | Sesul Rapii |
| 76 | 11 | 272 | 3,50 | F - FANETE | Sesul Rapii |
| 77 | 11 | 275 | 0,01 | F - FANETE | Sesul Rapii |
| 78 | 11 | 276 | 0,01 | F - FANETE | Sesul Rapii |
| | Total tarla 11 | | 15,26 | | |
| 79 | 12 | 279 | 0,71 | F - FANETE | Sesul Rapii |
| 80 | 12 | 283 | 0,22 | F - FANETE | Sesul Rapii |
| 81 | 12 | 286 | 0,08 | F - FANETE | Sesul Rapii |
| 82 | 12 | 287 | 0,76 | F - FANETE | Sesul Rapii |
| 83 | 12 | 289 | 0,26 | F - FANETE | Sesul Rapii |
| 84 | 12 | 291 | 0,10 | F - FANETE | Sesul Rapii |
| 85 | 12 | 293 | 0,65 | F - FANETE | Sesul Rapii |
| 86 | 12 | 295 | 0,23 | F - FANETE | Sesul Rapii |
| 87 | 12 | 297 | 0,03 | F - FANETE | Sesul Rapii |
| 88 | 12 | 298 | 0,84 | F - FANETE | Sesul Rapii |
| 89 | 12 | 299 | 0,13 | F - FANETE | Sesul Rapii |
| | Total tarla 12 | | 4,01 | | |
| 90 | 13 | 306 | 0,59 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 91 | 13 | 311 | 0,23 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 92 | 13 | 312 | 0,14 | F - FANETE | Valea Lupului |
| | Total tarla 13 | | 0,96 | | |
| 93 | 14 | 318 | 0,91 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 94 | 14 | 327 | 1,12 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 95 | 14 | 331 | 0,22 | F - FANETE | Valea Lupului |

| | | | | | |
|-----|----------------|-----|-------|------------|-------------------|
| 96 | 14 | 335 | 1,08 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 97 | 14 | 337 | 1,55 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 98 | 14 | 341 | 2,64 | F - FANETE | Valea Lupului |
| | Total tarla 14 | | 7,52 | | |
| 99 | 15 | 346 | 0,82 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 100 | 15 | 347 | 0,48 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 101 | 15 | 353 | 1,32 | F - FANETE | Valea Lupului |
| | | | 2,62 | | |
| 102 | 16 | 391 | 0,67 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 103 | 16 | 395 | 0,23 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 104 | 16 | 408 | 2,50 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 105 | 16 | 427 | 0,06 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| | Total tarla 16 | | 3,46 | | |
| 106 | 18 | 435 | 6,04 | F - FANETE | Sub vii |
| 107 | 18 | 437 | 0,14 | F - FANETE | Sub vii |
| 108 | 18 | 443 | 0,07 | F - FANETE | Sub vii |
| 109 | 18 | 444 | 0,09 | F - FANETE | Sub vii |
| 110 | 18 | 445 | 0,14 | F - FANETE | Sub vii |
| 111 | 18 | 446 | 1,86 | F - FANETE | Sub vii |
| 112 | 18 | 452 | 2,50 | F - FANETE | Sub vii |
| 113 | 18 | 455 | 0,29 | F - FANETE | Sub vii |
| 114 | 18 | 457 | 12,47 | F - FANETE | Sub vii |
| 115 | 18 | 461 | 0,07 | F - FANETE | Sub vii |
| 116 | 18 | 463 | 5,95 | F - FANETE | Sub vii |
| 117 | 18 | 466 | 0,36 | F - FANETE | Sub vii |
| 118 | 18 | 468 | 0,41 | F - FANETE | Sub vii |
| 119 | 18 | 470 | 0,09 | F - FANETE | Sub vii |
| 120 | 18 | 472 | 0,84 | F - FANETE | Sub vii |
| 121 | 18 | 475 | 0,11 | F - FANETE | Sub vii |
| 122 | 18 | 476 | 0,80 | F - FANETE | Sub vii |

| | | | | | |
|-----|----------------|-------|-------|------------|---------|
| 123 | 18 | 478 | 0,44 | F - FANETE | Sub vii |
| 124 | 18 | 480 | 0,09 | F - FANETE | Sub vii |
| | Total tarla 18 | | 32,76 | | |
| 125 | 19 | 487 | 1,94 | F - FANETE | Balcau |
| 126 | 19 | 492 | 0,09 | F - FANETE | Balcau |
| 127 | 19 | 493 | 0,24 | F - FANETE | Balcau |
| 128 | 19 | 495 | 0,67 | F - FANETE | Balcau |
| 129 | 19 | 497 | 0,27 | F - FANETE | Balcau |
| 130 | 19 | 499 | 0,02 | F - FANETE | Balcau |
| 131 | 19 | 502 | 4,73 | F - FANETE | Balcau |
| 132 | 19 | 505 | 6,55 | F - FANETE | Balcau |
| 133 | 19 | 506 | 0,10 | F - FANETE | Balcau |
| 134 | 19 | 508 | 0,14 | F - FANETE | Balcau |
| 135 | 19 | 510 | 0,16 | F - FANETE | Balcau |
| 136 | 19 | 525 | 0,84 | F - FANETE | Balcau |
| 137 | 19 | 527 | 0,29 | F - FANETE | Balcau |
| 138 | 19 | 529 | 0,09 | F - FANETE | Balcau |
| 139 | 19 | 534 | 0,44 | F - FANETE | Balcau |
| 140 | 19 | 536 | 0,01 | F - FANETE | Balcau |
| 141 | 19 | 540 | 0,03 | F - FANETE | Balcau |
| 142 | 19 | 542 | 0,50 | F - FANETE | Balcau |
| 143 | 19 | 543 | 0,64 | F - FANETE | Balcau |
| 144 | 19 | 545-1 | 5,23 | F - FANETE | Balcau |
| 145 | 19 | 545-2 | 0,21 | F - FANETE | Balcau |
| 146 | 19 | 545-3 | 0,51 | F - FANETE | Balcau |
| 147 | 19 | 552-1 | 1,63 | F - FANETE | Balcau |
| | Total tarla 19 | | 25,33 | | |
| 148 | 20 | 567 | 9,43 | F - FANETE | Balcau |
| 149 | 20 | 570 | 1,27 | F - FANETE | Balcau |
| 150 | 20 | 576 | 1,51 | F - FANETE | Balcau |

| | | | | | |
|-----|----------------|-------|-------|------------|---------------|
| | Total tarla 20 | | 12,21 | | |
| 151 | 21 | 587-1 | 6,07 | F - FANETE | Balcau |
| 152 | 21 | 587-2 | 3,87 | F - FANETE | Balcau |
| 153 | 21 | 591 | 1,48 | F - FANETE | Balcau |
| 154 | 21 | 593 | 3,41 | F - FANETE | Balcau |
| 155 | 21 | 594 | 0,22 | F - FANETE | Balcau |
| 156 | 21 | 598 | 0,22 | F - FANETE | Balcau |
| 157 | 21 | 603 | 0,03 | F - FANETE | Balcau |
| 158 | 21 | 607 | 2,81 | F - FANETE | Balcau |
| 159 | 21 | 610 | 2,68 | F - FANETE | Balcau |
| 160 | 21 | 611 | 1,29 | F - FANETE | Balcau |
| 161 | 21 | 612 | 1,68 | F - FANETE | Balcau |
| 162 | 21 | 614 | 0,52 | F - FANETE | Balcau |
| 163 | 21 | 615 | 0,09 | F - FANETE | Balcau |
| 164 | 21 | 616 | 0,47 | F - FANETE | Balcau |
| 165 | 21 | 617 | 2,07 | F - FANETE | Balcau |
| 166 | 21 | 618 | 1,33 | F - FANETE | Balcau |
| 167 | 21 | 621 | 0,47 | F - FANETE | Balcau |
| | Total tarla 21 | | 28,71 | | |
| 168 | 22 | 624 | 0,71 | F - FANETE | Roaba |
| 169 | 22 | 626 | 0,95 | F - FANETE | Roaba |
| 170 | 22 | 629 | 0,56 | F - FANETE | Roaba |
| 171 | 22 | 632 | 1,55 | F - FANETE | Roaba |
| 172 | 22 | 633 | 0,08 | F - FANETE | Roaba |
| 173 | 22 | 634 | 0,35 | F - FANETE | Roaba |
| 174 | 22 | 636 | 1,19 | F - FANETE | Roaba |
| 175 | 22 | 639 | 0,06 | F - FANETE | Roaba |
| 176 | 22 | 669 | 2,46 | F - FANETE | Roaba |
| | Total tarla 22 | | 7,91 | | |
| 177 | 25 | 714 | 2,62 | F - FANETE | Pasunea Roaba |

| | | | | | |
|-----|----------------|-------|-------|------------|---------------------|
| 178 | 25 | 718 | 0,12 | F - FANETE | Pasunea Roaba |
| | Total tarla 25 | | 2,74 | | |
| 179 | 26 | 726 | 1,32 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 180 | 26 | 732 | 0,08 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 181 | 26 | 734 | 0,08 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 182 | 26 | 738 | 0,06 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 183 | 26 | 739 | 0,04 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 184 | 26 | 740 | 1,91 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 185 | 26 | 744 | 0,42 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 186 | 26 | 746 | 0,15 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 187 | 26 | 747 | 0,53 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 188 | 26 | 750 | 3,57 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 189 | 26 | 753 | 0,06 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 190 | 26 | 754 | 0,07 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 191 | 26 | 757 | 1,00 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 192 | 26 | 763 | 0,67 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 193 | 26 | 767 | 3,97 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 194 | 26 | 779 | 0,02 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 195 | 26 | 783 | 0,07 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 196 | 26 | 785 | 0,04 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 197 | 26 | 786 | 0,32 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 198 | 26 | 787 | 0,22 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 199 | 26 | 788 | 0,11 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 200 | 26 | 792 | 0,31 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 201 | 26 | 802 | 5,61 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| 202 | 26 | 811 | 9,77 | F - FANETE | Dealul furnicilor |
| | Total tarla 26 | | 30,40 | | |
| 203 | 27 | 818 | 4,89 | F - FANETE | Malai si vidigrenci |
| 204 | 27 | 819-1 | 0,15 | F - FANETE | Malai si vidigrenci |
| 205 | 27 | 819-2 | 0,39 | F - FANETE | Malai si vidigrenci |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------|-------|------------|---------------------|
| 206 | 27 | 823 | 15,39 | F - FANETE | Malai si vidigrenci |
| 207 | 27 | 825-1 | 0,44 | F - FANETE | Malai si vidigrenci |
| 208 | 27 | 826 | 0,07 | F - FANETE | Malai si vidigrenci |
| 209 | 27 | 827 | 0,10 | F - FANETE | Malai si vidigrenci |
| 210 | 27 | 831 | 1,12 | F - FANETE | Malai si vidigrenci |
| 211 | 27 | 833 | 0,41 | F - FANETE | Malai si vidigrenci |
| 212 | 27 | 839 | 27,70 | F - FANETE | Malai si vidigrenci |
| 213 | 27 | 849 | 0,41 | F - FANETE | Malai si vidigrenci |
| | Total tarla 27 | | 51,07 | | |
| 214 | 28 | 855 | 0,26 | F - FANETE | Gaura portii |
| 215 | 28 | 861 | 0,51 | F - FANETE | Gaura portii |
| 216 | 28 | 862 | 0,15 | F - FANETE | Gaura portii |
| 217 | 28 | 867 | 0,51 | F - FANETE | Gaura portii |
| 218 | 28 | 868 | 1,32 | F - FANETE | Gaura portii |
| 219 | 28 | 869 | 8,25 | F - FANETE | Gaura portii |
| 220 | 28 | 878 | 0,15 | F - FANETE | Gaura portii |
| 221 | 28 | 879/02 | 0,72 | F - FANETE | Gaura portii |
| 222 | 28 | 879-1 | 1,32 | F - FANETE | Gaura portii |
| 223 | 28 | 879-3 | 0,30 | F - FANETE | Gaura portii |
| 224 | 28 | 882 | 0,27 | F - FANETE | Gaura portii |
| | Total tarla 28 | | 13,76 | | |
| 225 | 29 | 887 | 0,16 | F - FANETE | Malai |
| 226 | 29 | 889 | 0,06 | F - FANETE | Malai |
| 227 | 29 | 890 | 0,04 | F - FANETE | Malai |
| 228 | 29 | 893 | 0,29 | F - FANETE | Malai |
| 229 | 29 | 899 | 0,08 | F - FANETE | Malai |
| 230 | 29 | 901 | 0,20 | F - FANETE | Malai |
| 231 | 29 | 905 | 0,08 | F - FANETE | Malai |
| 232 | 29 | 910 | 1,96 | F - FANETE | Malai |
| 233 | 29 | 911 | 0,03 | F - FANETE | Malai |

| | | | | | |
|-----|----------------|-------|-------|------------|-------|
| 234 | 29 | 912 | 0,21 | F - FANETE | Malai |
| 235 | 29 | 913 | 3,68 | F - FANETE | Malai |
| 236 | 29 | 914 | 0,03 | F - FANETE | Malai |
| 237 | 29 | 916 | 1,06 | F - FANETE | Malai |
| 238 | 29 | 926 | 2,33 | F - FANETE | Malai |
| 239 | 29 | 929 | 0,05 | F - FANETE | Malai |
| 240 | 29 | 936 | 5,55 | F - FANETE | Malai |
| 241 | 29 | 937 | 1,77 | F - FANETE | Malai |
| 242 | 29 | 943 | 0,24 | F - FANETE | Malai |
| 243 | 29 | 947 | 0,06 | F - FANETE | Malai |
| 244 | 29 | 949 | 1,58 | F - FANETE | Malai |
| 245 | 29 | 951 | 0,40 | F - FANETE | Malai |
| 246 | 29 | 953 | 0,08 | F - FANETE | Malai |
| 247 | 29 | 960 | 0,77 | F - FANETE | Malai |
| 248 | 29 | 969 | 3,41 | F - FANETE | Malai |
| 249 | 29 | 970-2 | 0,57 | F - FANETE | Malai |
| | Total tarla 29 | | 24,69 | | |
| 250 | 31 | 1003 | 0,42 | F - FANETE | Malai |
| 251 | 31 | 1004 | 0,25 | F - FANETE | Malai |
| 252 | 31 | 1006 | 0,41 | F - FANETE | Malai |
| 253 | 31 | 1016 | 1,90 | F - FANETE | Malai |
| 254 | 31 | 1019 | 15,86 | F - FANETE | Malai |
| 255 | 31 | 1021 | 2,44 | F - FANETE | Malai |
| 256 | 31 | 1025 | 0,23 | F - FANETE | Malai |
| 257 | 31 | 1027 | 0,32 | F - FANETE | Malai |
| 258 | 31 | 1030 | 4,30 | F - FANETE | Malai |
| 259 | 31 | 1039 | 1,36 | F - FANETE | Malai |
| 260 | 31 | 977 | 0,42 | F - FANETE | Malai |
| 261 | 31 | 979 | 0,13 | F - FANETE | Malai |
| 262 | 31 | 981 | 0,09 | F - FANETE | Malai |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------|-------|------------|---------------|
| 263 | 31 | 983 | 3,09 | F - FANETE | Malai |
| 264 | 31 | 988 | 1,11 | F - FANETE | Malai |
| 265 | 31 | 989 | 0,53 | F - FANETE | Malai |
| 266 | 31 | 993 | 0,43 | F - FANETE | Malai |
| 267 | 31 | 995 | 1,24 | F - FANETE | Malai |
| 268 | 31 | 999 | 1,72 | F - FANETE | Malai |
| | Total tarla 31 | | 36,25 | | |
| 269 | 32 | 1044 | 0,84 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 270 | 32 | 1047 | 0,72 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 271 | 32 | 1051 | 0,14 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 272 | 32 | 1054 | 0,09 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 273 | 32 | 1057 | 0,49 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 274 | 32 | 1059 | 2,54 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 275 | 32 | 1063 | 4,95 | F - FANETE | Valea Lupului |
| | Total tarla 32 | | 9,77 | | |
| 276 | 34 | 1084 | 7,84 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 277 | 34 | 1085 | 0,09 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 278 | 34 | 1089-1 | 18,98 | F - FANETE | Valea Lupului |
| | Total tarla 34 | | 26,91 | | |
| 279 | 35 | 1094 | 0,24 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 280 | 35 | 1100 | 0,24 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 281 | 35 | 1102 | 0,66 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 282 | 35 | 1103 | 0,58 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 283 | 35 | 1106 | 1,63 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 284 | 35 | 1108 | 0,63 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 285 | 35 | 1110 | 0,11 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 286 | 35 | 1111 | 0,07 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 287 | 35 | 1113 | 0,12 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 288 | 35 | 1128 | 11,49 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 289 | 35 | 1132 | 0,26 | F - FANETE | Valea Lupului |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------|-------|------------|------------------|
| 290 | 35 | 1135 | 1,06 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 291 | 35 | 1138 | 1,13 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 292 | 35 | 1148 | 7,57 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 293 | 35 | 1152-3 | 0,02 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 294 | 35 | 1153 | 0,02 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 295 | 35 | 1155 | 0,74 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 296 | 35 | 1157 | 0,74 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 297 | 35 | 1158-1 | 1,97 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 298 | 35 | 1158-2 | 0,02 | F - FANETE | Valea Lupului |
| 299 | 35 | 1158-3 | 1,10 | F - FANETE | Valea Lupului |
| | Total tarla 35 | | 30,40 | | |
| 300 | 36 | 1163 | 0,29 | F - FANETE | Fantana maigului |
| 301 | 36 | 1171 | 0,06 | F - FANETE | Fantana maigului |
| 302 | 36 | 1173 | 0,43 | F - FANETE | Fantana maigului |
| 303 | 36 | 1176-1 | 0,64 | F - FANETE | Fantana maigului |
| 304 | 36 | 1177 | 0,22 | F - FANETE | Fantana maigului |
| | Total tarla 36 | | 1,64 | | |
| 305 | 39 | 1383 | 1,99 | F - FANETE | Gaunoasa |
| | Total tarla 39 | | 1,99 | | |
| 306 | 40 | 1405 | 0,06 | F - FANETE | Valea Petisului |
| 307 | 40 | 1409 | 0,34 | F - FANETE | Valea Petisului |
| 308 | 40 | 1413 | 0,23 | F - FANETE | Valea Petisului |
| | Total tarla 40 | | 0,63 | | |
| 309 | 41 | 1423 | 0,07 | F - FANETE | Coasta rapii |
| 310 | 41 | 1426 | 0,06 | F - FANETE | Coasta rapii |
| 311 | 41 | 1430 | 0,06 | F - FANETE | Coasta rapii |
| 312 | 41 | 1433 | 52,56 | F - FANETE | Coasta rapii |
| 313 | 41 | 1438 | 0,21 | F - FANETE | Coasta rapii |
| 314 | 41 | 1440 | 0,06 | F - FANETE | Coasta rapii |
| | Total tarla 41 | | 53,02 | | |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------|-------|------------|------------------|
| 315 | 42 | 1446 | 0,20 | F - FANETE | Sesul rapii |
| 316 | 42 | 1461 | 0,18 | F - FANETE | Sesul rapii |
| 317 | 42 | 1471 | 0,28 | F - FANETE | Sesul rapii |
| 318 | 42 | 1473 | 0,16 | F - FANETE | Sesul rapii |
| 319 | 42 | 1475 | 0,20 | F - FANETE | Sesul rapii |
| 320 | 42 | 1490 | 0,13 | F - FANETE | Sesul rapii |
| 321 | 42 | 1497 | 0,50 | F - FANETE | Sesul rapii |
| 322 | 42 | 1518 | 0,34 | F - FANETE | Sesul rapii |
| | Total tarla 42 | | 1,99 | | |
| 323 | 43 | 1522 | 0,32 | F - FANETE | Dealul teii |
| 324 | 43 | 1529-1 | 0,16 | F - FANETE | Dealul teii |
| 325 | 43 | 1529-3 | 0,08 | F - FANETE | Dealul teii |
| 326 | 43 | 1529-2 | 0,33 | F - FANETE | Dealul teii |
| 327 | 43 | 1538 | 0,09 | F - FANETE | Dealul teii |
| 328 | 43 | 1542 | 6,85 | F - FANETE | Dealul teii |
| 329 | 43 | 1547 | 0,81 | F - FANETE | Dealul teii |
| 330 | 43 | 1549 | 0,28 | F - FANETE | Dealul teii |
| | Total tarla 43 | | 8,92 | | |
| 331 | 44 | 1551 | 0,40 | F - FANETE | Dealul jivodului |
| 332 | 44 | 1565 | 0,65 | F - FANETE | Dealul jivodului |
| 333 | 44 | 1566 | 0,97 | F - FANETE | Dealul jivodului |
| 334 | 44 | 1568 | 0,50 | F - FANETE | Dealul jivodului |
| 335 | 44 | 1585 | 2,49 | F - FANETE | Dealul jivodului |
| 336 | 44 | 1596 | 0,09 | F - FANETE | Dealul jivodului |
| 337 | 44 | 1602 | 0,26 | F - FANETE | Dealul jivodului |
| 338 | 44 | 1603 | 0,18 | F - FANETE | Dealul jivodului |
| 339 | 44 | 1604 | 4,55 | F - FANETE | Dealul jivodului |
| | Total tarla 44 | | 10,09 | | |
| 340 | 45 | 1613 | 3,79 | F - FANETE | Coasta marului |
| 341 | 45 | 1639 | 0,16 | F - FANETE | Coasta marului |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------|-------|------------|----------------|
| 342 | 45 | 1640 | 0,65 | F - FANETE | Coasta marului |
| 343 | 45 | 1654 | 41,97 | F - FANETE | Coasta marului |
| 344 | 45 | 1668 | 0,03 | F - FANETE | Coasta marului |
| 345 | 45 | 1676 | 0,07 | F - FANETE | Coasta marului |
| 346 | 45 | 1681 | 0,29 | F - FANETE | Coasta marului |
| 347 | 45 | 1682 | 2,23 | F - FANETE | Coasta marului |
| 348 | 45 | 1689 | 0,14 | F - FANETE | Coasta marului |
| 349 | 45 | 1695 | 0,02 | F - FANETE | Coasta marului |
| 350 | 45 | 1696 | 0,03 | F - FANETE | Coasta marului |
| | Total tarla 45 | | 49,38 | | |
| 351 | 46 | 1721 | 0,02 | F - FANETE | Coasta marului |
| 352 | 46 | 1726 | 0,19 | F - FANETE | Coasta marului |
| 353 | 46 | 1728 | 0,44 | F - FANETE | Coasta marului |
| 354 | 46 | 1731 | 0,08 | F - FANETE | Coasta marului |
| 355 | 46 | 1740 | 0,04 | F - FANETE | Coasta marului |
| | Total tarla 46 | | 0,77 | | |
| 356 | 47 | 1753 | 1,69 | F - FANETE | Baza sportiva |
| 357 | 47 | 1759 | 0,09 | F - FANETE | Baza sportiva |
| 358 | 47 | 1772 | 2,89 | F - FANETE | Baza sportiva |
| | Total tarla 47 | | 4,67 | | |
| 359 | 48 | 1779 | 1,69 | F - FANETE | Coasta furcii |
| 360 | 48 | 1782 | 0,22 | F - FANETE | Coasta furcii |
| 361 | 48 | 1783 | 0,48 | F - FANETE | Coasta furcii |
| 362 | 48 | 1787-1 | 6,14 | F - FANETE | Coasta furcii |
| 363 | 48 | 1787-2 | 0,19 | F - FANETE | Coasta furcii |
| 364 | 48 | 1789 | 0,24 | F - FANETE | Coasta furcii |
| 365 | 48 | 1791 | 0,54 | F - FANETE | Coasta furcii |
| 366 | 48 | 1792 | 0,60 | F - FANETE | Coasta furcii |
| 367 | 48 | 1793-1 | 4,06 | F - FANETE | Coasta furcii |
| 368 | 48 | 1793-2 | 0,22 | F - FANETE | Coasta furcii |

| | | | | | |
|-----|----------------|---------|-------|------------|---------------|
| 369 | 48 | 1804 | 0,64 | F - FANETE | Coasta furcii |
| 370 | 48 | 1805 | 0,06 | F - FANETE | Coasta furcii |
| | Total tarla 48 | | 15,08 | | |
| 371 | 49 | 1823 | 0,31 | F - FANETE | In carari |
| 372 | 49 | 1840 | 1,58 | F - FANETE | In carari |
| | Total tarla 49 | | 1,89 | | |
| 373 | 50 | 1844 | 10,10 | F - FANETE | Paraul bodi |
| 374 | 50 | 1846 | 7,64 | F - FANETE | Paraul bodi |
| 375 | 50 | 1848 | 0,50 | F - FANETE | Paraul bodi |
| 376 | 50 | 1853 | 0,11 | F - FANETE | Paraul bodi |
| 377 | 50 | 1854 | 3,61 | F - FANETE | Paraul bodi |
| 378 | 50 | 1857 | 0,16 | F - FANETE | Paraul bodi |
| 379 | 50 | 1859 | 0,25 | F - FANETE | Paraul bodi |
| 380 | 50 | 1864 | 2,10 | F - FANETE | Paraul bodi |
| 381 | 50 | 1867 | 0,13 | F - FANETE | Paraul bodi |
| 382 | 50 | 1869 | 0,01 | F - FANETE | Paraul bodi |
| 383 | 50 | 1870 | 0,91 | F - FANETE | Paraul bodi |
| | Total tarla 50 | | 25,52 | | |
| 384 | 51 | 1879 | 0,76 | F - FANETE | Valea Mare |
| 385 | 51 | 1896 | 3,64 | F - FANETE | Valea Mare |
| | Total tarla 51 | | 4,40 | | |
| 386 | 53 | 1902-1 | 1,22 | F - FANETE | Dupa deal |
| 387 | 53 | 1902/02 | 0,94 | F - FANETE | Dupa deal |
| 388 | 53 | 1905 | 0,16 | F - FANETE | Dupa deal |
| 389 | 53 | 1907 | 0,03 | F - FANETE | Dupa deal |
| 390 | 53 | 1911 | 0,05 | F - FANETE | Dupa deal |
| 391 | 53 | 1914 | 0,11 | F - FANETE | Dupa deal |
| 392 | 53 | 1916 | 0,11 | F - FANETE | Dupa deal |
| 393 | 53 | 1918 | 0,12 | F - FANETE | Dupa deal |
| 394 | 53 | 1920 | 0,12 | F - FANETE | Dupa deal |

| | | | | | |
|-----|----------------|------|-------|------------|------------|
| 395 | 53 | 1922 | 0,31 | F - FANETE | Dupa deal |
| | Total tarla 53 | | 3,17 | | |
| 396 | 60 | 1950 | 0,32 | F - FANETE | Valea Mare |
| 397 | 60 | 1953 | 7,31 | F - FANETE | Valea Mare |
| 398 | 60 | 1955 | 1,08 | F - FANETE | Valea Mare |
| 399 | 60 | 1958 | 2,05 | F - FANETE | Valea Mare |
| 400 | 60 | 1959 | 1,24 | F - FANETE | Valea Mare |
| 401 | 60 | 1962 | 3,76 | F - FANETE | Valea Mare |
| 402 | 60 | 1966 | 16,71 | F - FANETE | Valea Mare |
| 403 | 60 | 1969 | 26,54 | F - FANETE | Valea Mare |
| 404 | 60 | 1975 | 0,13 | F - FANETE | Valea Mare |
| 405 | 60 | 1982 | 0,49 | F - FANETE | Valea Mare |
| 406 | 60 | 1987 | 0,60 | F - FANETE | Valea Mare |
| 407 | 60 | 1988 | 0,32 | F - FANETE | Valea Mare |
| 408 | 60 | 1992 | 0,33 | F - FANETE | Valea Mare |
| | Total tarla 60 | | 60,88 | | |
| 409 | 61 | 2002 | 0,88 | F - FANETE | Valea Mare |
| 410 | 61 | 2008 | 3,93 | F - FANETE | Valea Mare |
| 411 | 61 | 2015 | 27,02 | F - FANETE | Valea Mare |
| | Total tarla 61 | | 31,83 | | |
| 412 | 63 | 2035 | 0,06 | F - FANETE | Valea Mare |
| 413 | 63 | 2038 | 2,77 | F - FANETE | Valea Mare |
| 414 | 63 | 2052 | 0,06 | F - FANETE | Valea Mare |
| 415 | 63 | 2054 | 3,16 | F - FANETE | Valea Mare |
| 416 | 63 | 2058 | 23,54 | F - FANETE | Valea Mare |
| 417 | 63 | 2064 | 1,68 | F - FANETE | Valea Mare |
| 418 | 63 | 2067 | 0,16 | F - FANETE | Valea Mare |
| 419 | 63 | 2069 | 0,15 | F - FANETE | Valea Mare |
| 420 | 63 | 2070 | 0,66 | F - FANETE | Valea Mare |
| 421 | 63 | 2072 | 0,19 | F - FANETE | Valea Mare |

| | | | | | |
|-----|----------------|---------|-------|------------|-------------------|
| 422 | 63 | 2074 | 1,75 | F - FANETE | Valea Mare |
| 423 | 63 | 2076 | 1,26 | F - FANETE | Valea Mare |
| | Total tarla 63 | | 35,44 | | |
| 424 | 64 | 2088 | 0,29 | F - FANETE | Dealul Sigherului |
| 425 | 64 | 2089 | 0,40 | F - FANETE | Dealul Sigherului |
| 426 | 64 | 2092 | 12,61 | F - FANETE | Dealul Sigherului |
| | Total tarla 64 | | 13,30 | | |
| 427 | 69 | 2189-2 | 0,23 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 428 | 69 | 2189-3 | 0,33 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 429 | 69 | 2190-2 | 2,76 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 430 | 69 | 2190-10 | 1,17 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 431 | 69 | 2190-3 | 0,02 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 432 | 69 | 2190-4 | 1,49 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 433 | 69 | 2190-5 | 1,22 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 434 | 69 | 2190-6 | 1,27 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 435 | 69 | 2190-7 | 0,68 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 436 | 69 | 2190-8 | 1,04 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 437 | 69 | 2190-9 | 0,72 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 438 | 69 | 2191 | 0,32 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 439 | 69 | 2194-1 | 0,56 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 440 | 69 | 2194-11 | 0,67 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 441 | 69 | 2194-2 | 0,21 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 442 | 69 | 2194-3 | 0,39 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 443 | 69 | 2194-9 | 0,95 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 444 | 69 | 2194-10 | 0,59 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 445 | 69 | 2194-4 | 0,78 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 446 | 69 | 2194-7 | 0,61 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 447 | 69 | 2194-8 | 0,12 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 448 | 69 | 2197 | 0,49 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 449 | 69 | 2198 | 0,50 | F - FANETE | Viile Istioanului |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------|-------|------------|--------------------|
| 450 | 69 | 2200 | 0,28 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 451 | 69 | 2201 | 0,21 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 452 | 69 | 2202 | 0,04 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 453 | 69 | 2207-1 | 3,02 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 454 | 69 | 2207-2 | 3,19 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| 455 | 69 | 2207-3 | 1,29 | F - FANETE | Viile Istioanului |
| | Total tarla 69 | | 25,15 | | |
| 456 | 70 | 2214 | 0,80 | F - FANETE | Intre Lacuri |
| 457 | 70 | 2215 | 2,25 | F - FANETE | Intre Lacuri |
| 458 | 70 | 2221 | 0,72 | F - FANETE | Intre Lacuri |
| 459 | 70 | 2224-1 | 18,03 | F - FANETE | Intre Lacuri |
| 460 | 70 | 2224-2 | 0,23 | F - FANETE | Intre Lacuri |
| 461 | 70 | 2224-3 | 0,33 | F - FANETE | Intre Lacuri |
| 462 | 70 | 2224-4 | 0,03 | F - FANETE | Intre Lacuri |
| 463 | 70 | 2224-6 | 0,03 | F - FANETE | Intre Lacuri |
| 464 | 70 | 2225 | 0,15 | F - FANETE | Intre Lacuri |
| 465 | 70 | 2229 | 0,10 | F - FANETE | Intre Lacuri |
| 466 | 70 | 2235-1 | 6,80 | F - FANETE | Intre Lacuri |
| 467 | 70 | 2235-2 | 0,80 | F - FANETE | Intre Lacuri |
| 468 | 70 | 2235-3 | 0,01 | F - FANETE | Intre Lacuri |
| 469 | 70 | 2243-2 | 2,24 | F - FANETE | Intre Lacuri |
| 470 | 70 | 2246-4 | 0,03 | F - FANETE | Intre Lacuri |
| 471 | 70 | 2246-2 | 0,02 | F - FANETE | Intre Lacuri |
| 472 | 70 | 2250-2 | 0,10 | F - FANETE | Intre Lacuri |
| | Total tarla 70 | | 32,67 | | |
| 473 | 71 | 2252 | 1,12 | F - FANETE | La moara lui Culae |
| 474 | 71 | 2256 | 0,05 | F - FANETE | La moara lui Culae |
| 475 | 71 | 2266 | 0,19 | F - FANETE | La moara lui Culae |
| 476 | 71 | 2268 | 0,12 | F - FANETE | La moara lui Culae |
| 477 | 71 | 2279 | 0,19 | F - FANETE | La moara lui Culae |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------|-------|------------|--------------------|
| 478 | 71 | 2286 | 1,36 | F - FANETE | La moara lui Culae |
| | Total tarla 71 | | 3,03 | | |
| 479 | 72 | 2290 | 0,46 | F - FANETE | Dosul Istioanului |
| 480 | 72 | 2292-2 | 4,39 | F - FANETE | Dosul Istioanului |
| 481 | 72 | 2296 | 0,68 | F - FANETE | Dosul Istioanului |
| 482 | 72 | 2302 | 15,55 | F - FANETE | Dosul Istioanului |
| 483 | 72 | 2304 | 2,20 | F - FANETE | Dosul Istioanului |
| 484 | 72 | 2310 | 0,41 | F - FANETE | Dosul Istioanului |
| 485 | 72 | 2313 | 4,69 | F - FANETE | Dosul Istioanului |
| 486 | 72 | 2315 | 10,92 | F - FANETE | Dosul Istioanului |
| 487 | 72 | 2319 | 0,25 | F - FANETE | Dosul Istioanului |
| 488 | 72 | 2321 | 0,51 | F - FANETE | Dosul Istioanului |
| 489 | 72 | 2323 | 0,82 | F - FANETE | Dosul Istioanului |
| | Total tarla 72 | | 40,88 | | |
| 490 | 75 | 2340 | 73,39 | F - FANETE | In Hedel |
| 491 | 75 | 2342 | 0,14 | F - FANETE | In Hedel |
| 492 | 75 | 2344 | 0,08 | F - FANETE | In Hedel |
| 493 | 75 | 2349 | 0,09 | F - FANETE | In Hedel |
| 494 | 75 | 2352 | 1,36 | F - FANETE | In Hedel |
| 495 | 75 | 2356 | 0,51 | F - FANETE | In Hedel |
| 496 | 75 | 2358 | 3,68 | F - FANETE | In Hedel |
| 497 | 75 | 2363 | 2,20 | F - FANETE | In Hedel |
| | Total tarla 75 | | 81,45 | | |
| 498 | 76 | 2370 | 1,15 | F - FANETE | In Hedel |
| 499 | 76 | 2371 | 1,80 | F - FANETE | In Hedel |
| 500 | 76 | 2373 | 0,40 | F - FANETE | In Hedel |
| 501 | 76 | 2376 | 8,93 | F - FANETE | In Hedel |
| 502 | 76 | 2380 | 0,68 | F - FANETE | In Hedel |
| 503 | 76 | 2382 | 25,47 | F - FANETE | In Hedel |
| 504 | 76 | 2385 | 0,72 | F - FANETE | In Hedel |

| | | | | | |
|-----|----------------|------|-------|------------|----------|
| 505 | 76 | 2389 | 0,04 | F - FANETE | In Hedel |
| 506 | 76 | 2391 | 0,19 | F - FANETE | In Hedel |
| 507 | 76 | 2398 | 0,80 | F - FANETE | In Hedel |
| 508 | 76 | 2399 | 0,10 | F - FANETE | In Hedel |
| 509 | 76 | 2400 | 0,08 | F - FANETE | In Hedel |
| 510 | 76 | 2405 | 5,76 | F - FANETE | In Hedel |
| 511 | 76 | 2409 | 20,00 | F - FANETE | In Hedel |
| 512 | 76 | 2417 | 0,12 | F - FANETE | In Hedel |
| 513 | 76 | 2419 | 0,22 | F - FANETE | In Hedel |
| | Total tarla 76 | | 66,46 | | |
| 514 | 77 | 2428 | 3,12 | F - FANETE | Pe Visa |
| 515 | 77 | 2437 | 0,20 | F - FANETE | Pe Visa |
| 516 | 77 | 2440 | 0,24 | F - FANETE | Pe Visa |
| 517 | 77 | 2441 | 0,03 | F - FANETE | Pe Visa |
| 518 | 77 | 2444 | 0,45 | F - FANETE | Pe Visa |
| 519 | 77 | 2446 | 1,85 | F - FANETE | Pe Visa |
| 520 | 77 | 2448 | 0,26 | F - FANETE | Pe Visa |
| 521 | 77 | 2451 | 0,72 | F - FANETE | Pe Visa |
| 522 | 77 | 2453 | 0,45 | F - FANETE | Pe Visa |
| 523 | 77 | 2460 | 0,48 | F - FANETE | Pe Visa |
| 524 | 77 | 2462 | 0,13 | F - FANETE | Pe Visa |
| | Total tarla 77 | | 7,93 | | |
| 525 | 79 | 2517 | 10,42 | F - FANETE | In balta |
| 526 | 79 | 2488 | 0,30 | F - FANETE | In balta |
| 527 | 79 | 2497 | 0,08 | F - FANETE | In balta |
| 528 | 79 | 2498 | 0,35 | F - FANETE | In balta |
| 529 | 79 | 2512 | 0,05 | F - FANETE | In balta |
| 530 | 79 | 2515 | 0,25 | F - FANETE | In balta |
| 531 | 79 | 2520 | 0,47 | F - FANETE | In balta |
| 532 | 79 | 2524 | 0,66 | F - FANETE | In balta |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------|-------|------------|----------------|
| 533 | 79 | 2525 | 0,06 | F - FANETE | In balta |
| 534 | 79 | 2537 | 0,42 | F - FANETE | In balta |
| 535 | 79 | 2541 | 3,61 | F - FANETE | In balta |
| 536 | 79 | 2546 | 0,14 | F - FANETE | In balta |
| 537 | 79 | 2552 | 12,20 | F - FANETE | In balta |
| 538 | 79 | 2555 | 0,81 | F - FANETE | In balta |
| | Total tarla 79 | | 29,82 | | |
| 539 | 80 | 2562 | 2,64 | F - FANETE | Valea putului |
| 540 | 80 | 2566 | 0,32 | F - FANETE | Valea putului |
| 541 | 80 | 2567 | 37,81 | F - FANETE | Valea putului |
| 542 | 80 | 2571 | 0,47 | F - FANETE | Valea putului |
| 543 | 80 | 2573 | 1,19 | F - FANETE | Valea putului |
| 544 | 80 | 2576 | 0,07 | F - FANETE | Valea putului |
| 545 | 80 | 2578 | 0,15 | F - FANETE | Valea putului |
| 546 | 80 | 2579 | 0,12 | F - FANETE | Valea putului |
| 547 | 80 | 2580 | 0,07 | F - FANETE | Valea putului |
| 548 | 80 | 2581 | 11,41 | F - FANETE | Valea putului |
| 549 | 80 | 2587 | 5,26 | F - FANETE | Valea putului |
| 550 | 80 | 2593 | 0,09 | F - FANETE | Valea putului |
| 551 | 80 | 2596 | 0,24 | F - FANETE | Valea putului |
| 552 | 80 | 2597 | 0,09 | F - FANETE | Valea putului |
| | Total tarla 80 | | 59,93 | | |
| 553 | 81 | 2602 | 2,98 | F - FANETE | Pipirige |
| 554 | 81 | 2607-2 | 1,64 | F - FANETE | Pipirige |
| 555 | 81 | 2615 | 0,04 | F - FANETE | Pipirige |
| 556 | 81 | 2618 | 0,06 | F - FANETE | Pipirige |
| | Total tarla 81 | | 4,72 | | |
| 557 | 82 | 2625 | 0,11 | F - FANETE | Dealul chiliei |
| 558 | 82 | 2628 | 0,20 | F - FANETE | Dealul chiliei |
| 559 | 82 | 2630 | 0,07 | F - FANETE | Dealul chiliei |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------|-------|------------|----------------|
| 560 | 82 | 2635 | 0,29 | F - FANETE | Dealul chiliei |
| 561 | 82 | 2636 | 0,14 | F - FANETE | Dealul chiliei |
| 562 | 82 | 2642 | 0,13 | F - FANETE | Dealul chiliei |
| 563 | 82 | 2647 | 2,65 | F - FANETE | Dealul chiliei |
| | Total tarla 82 | | 3,59 | | |
| 564 | 83 | 2648 | 0,37 | F - FANETE | Lacut |
| 565 | 83 | 2649 | 0,74 | F - FANETE | Lacut |
| 566 | 83 | 2655-1 | 5,72 | F - FANETE | Lacut |
| 567 | 83 | 2657-1 | 1,93 | F - FANETE | Lacut |
| 568 | 83 | 2660-1 | 12,64 | F - FANETE | Lacut |
| 569 | 83 | 2660-5 | 1,36 | F - FANETE | Lacut |
| 570 | 83 | 2665 | 0,16 | F - FANETE | Lacut |
| 571 | 83 | 2667 | 4,98 | F - FANETE | Lacut |
| 572 | 83 | 2676 | 0,24 | F - FANETE | Lacut |
| 573 | 83 | 2681 | 0,11 | F - FANETE | Lacut |
| 574 | 83 | 2682 | 1,33 | F - FANETE | Lacut |
| 575 | 83 | 2685 | 0,87 | F - FANETE | Lacut |
| | Total tarla 83 | | 30,45 | | |
| 576 | 84 | 2687 | 1,08 | F - FANETE | Molda |
| 577 | 84 | 2688 | 1,99 | F - FANETE | Molda |
| 578 | 84 | 2689 | 0,28 | F - FANETE | Molda |
| 579 | 84 | 2691 | 0,93 | F - FANETE | Molda |
| 580 | 84 | 2701 | 0,24 | F - FANETE | Molda |
| 581 | 84 | 2703 | 2,01 | F - FANETE | Molda |
| 582 | 84 | 2705 | 0,13 | F - FANETE | Molda |
| 583 | 84 | 2706 | 0,21 | F - FANETE | Molda |
| 584 | 84 | 2718 | 0,11 | F - FANETE | Molda |
| 585 | 84 | 2720 | 0,08 | F - FANETE | Molda |
| | Total tarla 84 | | 7,06 | | |
| 586 | 85 | 2724 | 0,77 | F - FANETE | Husulab |

| | | | | | |
|-----|----------------|------|------|------------|---------|
| 587 | 85 | 2727 | 0,55 | F - FANETE | Husulab |
| 588 | 85 | 2736 | 0,74 | F - FANETE | Husulab |
| 589 | 85 | 2738 | 0,56 | F - FANETE | Husulab |
| | Total tarla 85 | | 2,62 | | |
| 590 | 86 | 2747 | 0,18 | F - FANETE | Paraut |
| 591 | 86 | 2749 | 0,31 | F - FANETE | Paraut |
| 592 | 86 | 2751 | 1,66 | F - FANETE | Paraut |
| 593 | 86 | 2753 | 0,05 | F - FANETE | Paraut |
| 594 | 86 | 2756 | 0,21 | F - FANETE | Paraut |
| 595 | 86 | 2758 | 1,74 | F - FANETE | Paraut |
| | Total tarla 86 | | 4,15 | | |
| 596 | 87 | 2762 | 0,38 | F - FANETE | Molda |
| 597 | 87 | 2764 | 5,52 | F - FANETE | Molda |
| 598 | 87 | 2772 | 0,73 | F - FANETE | Molda |
| 599 | 87 | 2774 | 0,10 | F - FANETE | Molda |
| 600 | 87 | 2783 | 0,21 | F - FANETE | Molda |
| 601 | 87 | 2786 | 0,03 | F - FANETE | Molda |
| | Total tarla 87 | | 6,97 | | |
| 602 | 88 | 2805 | 0,26 | F - FANETE | Redea |
| 603 | 88 | 2810 | 1,51 | F - FANETE | Redea |
| 604 | 88 | 2812 | 0,37 | F - FANETE | Redea |
| 605 | 88 | 2817 | 2,26 | F - FANETE | Redea |
| 606 | 88 | 2823 | 0,23 | F - FANETE | Redea |
| 607 | 88 | 2827 | 0,73 | F - FANETE | Redea |
| 608 | 88 | 2834 | 0,09 | F - FANETE | Redea |
| 609 | 88 | 2836 | 1,09 | F - FANETE | Redea |
| 610 | 88 | 2841 | 0,07 | F - FANETE | Redea |
| 611 | 88 | 2847 | 0,14 | F - FANETE | Redea |
| 612 | 88 | 2850 | 0,53 | F - FANETE | Redea |
| 613 | 88 | 2851 | 0,12 | F - FANETE | Redea |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------|-------|------------|------------|
| 614 | 88 | 2854 | 0,34 | F - FANETE | Redea |
| | Total tarla 88 | | 7,74 | | |
| 615 | 90 | 2857 | 1,32 | F - FANETE | Redea |
| 616 | 90 | 2859 | 0,87 | F - FANETE | Redea |
| 617 | 90 | 2860 | 0,02 | F - FANETE | Redea |
| 618 | 90 | 2862 | 5,73 | F - FANETE | Redea |
| 619 | 90 | 2870 | 1,62 | F - FANETE | Redea |
| 620 | 90 | 2871 | 0,01 | F - FANETE | Redea |
| 621 | 90 | 2873 | 1,69 | F - FANETE | Redea |
| 622 | 90 | 2878 | 0,58 | F - FANETE | Redea |
| 623 | 90 | 2882 | 3,38 | F - FANETE | Redea |
| 624 | 90 | 2893 | 15,99 | F - FANETE | Redea |
| 625 | 90 | 2897 | 0,28 | F - FANETE | Redea |
| 626 | 90 | 2898 | 0,09 | F - FANETE | Redea |
| 627 | 90 | 2900 | 0,25 | F - FANETE | Redea |
| 628 | 90 | 2907 | 0,25 | F - FANETE | Redea |
| 629 | 90 | 2910 | 1,44 | F - FANETE | Redea |
| 630 | 90 | 2914 | 0,44 | F - FANETE | Redea |
| 631 | 90 | 2915 | 0,04 | F - FANETE | Redea |
| 632 | 90 | 2921-1 | 0,22 | F - FANETE | Redea |
| 633 | 90 | 2923 | 0,88 | F - FANETE | Redea |
| 634 | 90 | 2924 | 1,91 | F - FANETE | Redea |
| 635 | 90 | 2925 | 0,27 | F - FANETE | Redea |
| 636 | 90 | 2928 | 0,06 | F - FANETE | Redea |
| 637 | 90 | 2931 | 0,24 | F - FANETE | Redea |
| 638 | 90 | 2932 | 0,33 | F - FANETE | Redea |
| | Total tarla 90 | | 37,91 | | |
| 639 | 91 | 2955 | 1,56 | F - FANETE | La ochiuri |
| 640 | 91 | 2974 | 0,57 | F - FANETE | La ochiuri |
| 641 | 91 | 2980 | 0,46 | F - FANETE | La ochiuri |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------|-------|------------|------------|
| 642 | 91 | 2981 | 0,13 | F - FANETE | La ochiuri |
| 643 | 91 | 2982 | 0,16 | F - FANETE | La ochiuri |
| 644 | 91 | 2985 | 0,70 | F - FANETE | La ochiuri |
| 645 | 91 | 2987 | 0,36 | F - FANETE | La ochiuri |
| 646 | 91 | 2990 | 0,23 | F - FANETE | La ochiuri |
| 647 | 91 | 2999 | 0,73 | F - FANETE | La ochiuri |
| 648 | 91 | 3001 | 0,20 | F - FANETE | La ochiuri |
| 649 | 91 | 3004 | 0,76 | F - FANETE | La ochiuri |
| 650 | 91 | 3005 | 4,78 | F - FANETE | La ochiuri |
| 651 | 91 | 3008 | 6,28 | F - FANETE | La ochiuri |
| 652 | 91 | 3009 | 25,78 | F - FANETE | La ochiuri |
| | Total tarla 91 | | 42,70 | | |
| 653 | 92 | 3018 | 0,08 | F - FANETE | Grivoaia |
| 654 | 92 | 3026 | 0,32 | F - FANETE | Grivoaia |
| 655 | 92 | 3028-1 | 12,29 | F - FANETE | Grivoaia |
| 656 | 92 | 3028-2 | 0,96 | F - FANETE | Grivoaia |
| 657 | 92 | 3028-3 | 0,49 | F - FANETE | Grivoaia |
| 658 | 92 | 3033 | 0,10 | F - FANETE | Grivoaia |
| 659 | 92 | 3035 | 3,93 | F - FANETE | Grivoaia |
| 660 | 92 | 3040 | 1,32 | F - FANETE | Grivoaia |
| 661 | 92 | 3041 | 0,09 | F - FANETE | Grivoaia |
| 662 | 92 | 3042 | 0,08 | F - FANETE | Grivoaia |
| 663 | 92 | 3044 | 0,01 | F - FANETE | Grivoaia |
| 664 | 92 | 3050 | 0,41 | F - FANETE | Grivoaia |
| 665 | 92 | 3052 | 0,42 | F - FANETE | Grivoaia |
| 666 | 92 | 3056 | 0,32 | F - FANETE | Grivoaia |
| 667 | 92 | 3058 | 0,49 | F - FANETE | Grivoaia |
| 668 | 92 | 3062 | 0,61 | F - FANETE | Grivoaia |
| 669 | 92 | 3064 | 4,02 | F - FANETE | Grivoaia |
| 670 | 92 | 3069 | 4,35 | F - FANETE | Grivoaia |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------|-------|------------|--------------------|
| 671 | 92 | 3070 | 0,24 | F - FANETE | Grivoaia |
| 672 | 92 | 3075-2 | 0,28 | F - FANETE | Grivoaia |
| | Total tarla 92 | | 30,81 | | |
| 673 | 93 | 3077 | 0,66 | F - FANETE | Grivoaia |
| 674 | 93 | 3082 | 0,18 | F - FANETE | Grivoaia |
| 675 | 93 | 3084-1 | 13,40 | F - FANETE | Grivoaia |
| 676 | 93 | 3084-3 | 0,51 | F - FANETE | Grivoaia |
| 677 | 93 | 3084-4 | 0,25 | F - FANETE | Grivoaia |
| 678 | 93 | 3084-5 | 0,18 | F - FANETE | Grivoaia |
| 679 | 93 | 3084-6 | 0,04 | F - FANETE | Grivoaia |
| | Total tarla 93 | | 15,22 | | |
| 680 | 94 | 3096-1 | 16,18 | F - FANETE | Lanul lui Onut |
| 681 | 94 | 3096-2 | 0,46 | F - FANETE | Lanul lui Onut |
| 682 | 94 | 3096-3 | 0,53 | F - FANETE | Lanul lui Onut |
| 683 | 94 | 3096-4 | 0,03 | F - FANETE | Lanul lui Onut |
| 684 | 94 | 3096-5 | 0,88 | F - FANETE | Lanul lui Onut |
| 685 | 94 | 3105 | 0,64 | F - FANETE | Lanul lui Onut |
| 686 | 94 | 3106-2 | 0,05 | F - FANETE | Lanul lui Onut |
| 687 | 94 | 3106-3 | 0,89 | F - FANETE | Lanul lui Onut |
| 688 | 94 | 3122 | 0,37 | F - FANETE | Lanul lui Onut |
| 689 | 94 | 3129 | 0,69 | F - FANETE | Lanul lui Onut |
| | Total tarla 94 | | 20,72 | | |
| 690 | 95 | 3137 | 0,02 | F - FANETE | Capul barcului |
| 691 | 95 | 3147 | 0,07 | F - FANETE | Capul barcului |
| 692 | 95 | 3148 | 0,05 | F - FANETE | Capul barcului |
| 693 | 95 | 3151 | 0,36 | F - FANETE | Capul barcului |
| | Total tarla 95 | | 0,5 | | |
| 694 | 96 | 3160 | 0,76 | F - FANETE | Sesul Calvaserului |
| | Total tarla 96 | | 0,76 | | |
| 695 | 97 | 3164 | 0,15 | F - FANETE | Poiana |

| | | | | | |
|-----|----------------|------|-------|------------|--------------------|
| 696 | 97 | 3165 | 0,69 | F - FANETE | Poiana |
| 697 | 97 | 3170 | 1,00 | F - FANETE | Poiana |
| 698 | 97 | 3178 | 0,32 | F - FANETE | Poiana |
| 699 | 97 | 3182 | 0,26 | F - FANETE | Poiana |
| 700 | 97 | 3185 | 7,82 | F - FANETE | Poiana |
| 701 | 97 | 3189 | 1,21 | F - FANETE | Poiana |
| 702 | 97 | 3190 | 8,31 | F - FANETE | Poiana |
| 703 | 97 | 3192 | 1,17 | F - FANETE | Poiana |
| | Total tarla 97 | | 20,93 | | |
| 704 | 98 | 3198 | 1,11 | F - FANETE | Valea puntii |
| | Total tarla 98 | | 1,11 | | |
| 705 | 99 | 3208 | 1,41 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 706 | 99 | 3211 | 0,28 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 707 | 99 | 3215 | 0,27 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 708 | 99 | 3216 | 0,22 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 709 | 99 | 3218 | 0,23 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 710 | 99 | 3219 | 0,47 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 711 | 99 | 3220 | 0,20 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 712 | 99 | 3221 | 0,04 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 713 | 99 | 3223 | 0,25 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| | Total tarla 99 | | 3,37 | | |
| 714 | 101 | 3234 | 4,33 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 715 | 101 | 3239 | 0,19 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 716 | 101 | 3243 | 0,83 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 717 | 101 | 3244 | 0,35 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 718 | 101 | 3250 | 0,62 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 719 | 101 | 3252 | 1,00 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 720 | 101 | 3256 | 2,14 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 721 | 101 | 3258 | 1,88 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 722 | 101 | 3260 | 0,20 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |

| | | | | | |
|-----|-----------------|------|-------|------------|--------------------|
| | Total tarla 101 | | 11,54 | | |
| 723 | 102 | 3262 | 1,36 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 724 | 102 | 3265 | 0,93 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 725 | 102 | 3267 | 0,35 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 726 | 102 | 3271 | 6,30 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 727 | 102 | 3274 | 0,49 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 728 | 102 | 3280 | 0,34 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 729 | 102 | 3282 | 0,04 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 730 | 102 | 3284 | 0,70 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 731 | 102 | 3285 | 0,27 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 732 | 102 | 3290 | 1,97 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 733 | 102 | 3291 | 1,55 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 734 | 102 | 3296 | 12,82 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 735 | 102 | 3301 | 3,58 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| | Total tarla 102 | | 30,70 | | |
| 736 | 105 | 3309 | 0,11 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 737 | 105 | 3313 | 0,11 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 738 | 105 | 3315 | 0,28 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 739 | 105 | 3319 | 0,23 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 740 | 105 | 3320 | 0,50 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 741 | 105 | 3322 | 0,02 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 742 | 105 | 3328 | 9,45 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 743 | 105 | 3330 | 0,05 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 744 | 105 | 3333 | 0,17 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 745 | 105 | 3336 | 0,31 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 746 | 105 | 3340 | 2,97 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 747 | 105 | 3342 | 3,26 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 748 | 105 | 3344 | 0,03 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 749 | 105 | 3349 | 1,19 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 750 | 105 | 3352 | 1,11 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |

| | | | | | |
|-----|-----------------|---------|-------|------------|--------------------|
| 751 | 105 | 3357 | 0,21 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 752 | 105 | 3364 | 0,03 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 753 | 105 | 3372 | 5,14 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 754 | 105 | 3374 | 0,30 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| 755 | 105 | 3376 | 1,93 | F - FANETE | Valea Mighindoalei |
| | Total tarla 105 | | 27,40 | | |
| 756 | 106 | 3391 | 12,08 | F - FANETE | Sub cearman |
| 757 | 106 | 3399 | 0,60 | F - FANETE | Sub cearman |
| 758 | 106 | 3404 | 0,85 | F - FANETE | Sub cearman |
| 759 | 106 | 3411 | 7,63 | F - FANETE | Sub cearman |
| | Total tarla 106 | | 21,16 | | |
| 760 | 107 | 3416/03 | 0,09 | F - FANETE | Sub cearman |
| | Total tarla 107 | | 0,09 | | |
| 761 | 108 | 3417 | 3,75 | F - FANETE | In ses |
| 762 | 108 | 3421 | 0,01 | F - FANETE | In ses |
| 763 | 108 | 3422 | 0,05 | F - FANETE | In ses |
| 764 | 108 | 3433 | 0,67 | F - FANETE | In ses |
| 765 | 108 | 3436 | 0,74 | F - FANETE | In ses |
| 766 | 108 | 3438 | 0,03 | F - FANETE | In ses |
| 767 | 108 | 3443 | 0,15 | F - FANETE | In ses |
| 768 | 108 | 3449 | 2,20 | F - FANETE | In ses |
| 769 | 108 | 3450 | 0,22 | F - FANETE | In ses |
| | Total tarla 108 | | 7,82 | | |
| 770 | 109 | 3461 | 0,82 | F - FANETE | In ses |
| 771 | 109 | 3462 | 1,47 | F - FANETE | In ses |
| 772 | 109 | 3465 | 0,20 | F - FANETE | In ses |
| 773 | 109 | 3471 | 0,32 | F - FANETE | In ses |
| 774 | 109 | 3475 | 0,08 | F - FANETE | In ses |
| | Total tarla 109 | | 2,89 | | |
| 775 | 112 | 3505 | 0,35 | F - FANETE | Coasta mare |

| | | | | | |
|-----|-----------------|------|-------|------------|-----------------|
| 776 | 112 | 3509 | 0,18 | F - FANETE | Coasta mare |
| 777 | 112 | 3511 | 7,23 | F - FANETE | Coasta mare |
| 778 | 112 | 3520 | 2,67 | F - FANETE | Coasta mare |
| 779 | 112 | 3523 | 0,03 | F - FANETE | Coasta mare |
| 780 | 112 | 3524 | 0,07 | F - FANETE | Coasta mare |
| 781 | 112 | 3526 | 0,06 | F - FANETE | Coasta mare |
| | Total tarla 112 | | 10,59 | | |
| 782 | 113 | 3529 | 0,91 | F - FANETE | Zapodea cu rapi |
| 783 | 113 | 3533 | 1,29 | F - FANETE | Zapodea cu rapi |
| 784 | 113 | 3535 | 1,79 | F - FANETE | Zapodea cu rapi |
| 785 | 113 | 3536 | 0,12 | F - FANETE | Zapodea cu rapi |
| 786 | 113 | 3537 | 0,51 | F - FANETE | Zapodea cu rapi |
| 787 | 113 | 3539 | 0,07 | F - FANETE | Zapodea cu rapi |
| 788 | 113 | 3542 | 0,01 | F - FANETE | Zapodea cu rapi |
| 789 | 113 | 3544 | 0,50 | F - FANETE | Zapodea cu rapi |
| 790 | 113 | 3548 | 0,01 | F - FANETE | Zapodea cu rapi |
| 791 | 113 | 3551 | 5,47 | F - FANETE | Zapodea cu rapi |
| 792 | 113 | 3554 | 5,30 | F - FANETE | Zapodea cu rapi |
| | Total tarla 113 | | 15,98 | | |
| 793 | 114 | 3588 | 0,33 | F - FANETE | Zapodea morii |
| 794 | 114 | 3593 | 23,98 | F - FANETE | Zapodea morii |
| 795 | 114 | 3596 | 0,72 | F - FANETE | Zapodea morii |
| 796 | 114 | 3601 | 0,02 | F - FANETE | Zapodea morii |
| 797 | 114 | 3603 | 4,82 | F - FANETE | Zapodea morii |
| 798 | 114 | 3607 | 2,45 | F - FANETE | Zapodea morii |
| 799 | 114 | 3608 | 0,05 | F - FANETE | Zapodea morii |
| 800 | 114 | 3610 | 0,31 | F - FANETE | Zapodea morii |
| 801 | 114 | 3615 | 0,15 | F - FANETE | Zapodea morii |
| 802 | 114 | 3617 | 0,41 | F - FANETE | Zapodea morii |
| 803 | 114 | 3620 | 0,13 | F - FANETE | Zapodea morii |

| | | | | | |
|-----|-----------------|---------|-------|------------|------------------|
| 804 | 114 | 3624 | 0,12 | F - FANETE | Zapodea morii |
| 805 | 114 | 3625 | 0,07 | F - FANETE | Zapodea morii |
| 806 | 114 | 3631/02 | 0,31 | F - FANETE | Zapodea morii |
| 807 | 114 | 3631-4 | 0,75 | F - FANETE | Zapodea morii |
| 808 | 114 | 3631-5 | 0,04 | F - FANETE | Zapodea morii |
| 809 | 114 | 3631-7 | 1,20 | F - FANETE | Zapodea morii |
| 810 | 114 | 3631-8 | 0,22 | F - FANETE | Zapodea morii |
| 811 | 114 | 3636 | 0,87 | F - FANETE | Zapodea morii |
| 812 | 114 | 3639 | 0,34 | F - FANETE | Zapodea morii |
| 813 | 114 | 3642 | 0,02 | F - FANETE | Zapodea morii |
| 814 | 114 | 3645 | 0,02 | F - FANETE | Zapodea morii |
| 815 | 114 | 3655 | 0,22 | F - FANETE | Zapodea morii |
| | Total tarla 114 | | 37,55 | | |
| 816 | 115 | 3677 | 4,67 | F - FANETE | Zapodea domnului |
| 817 | 115 | 3678 | 0,54 | F - FANETE | Zapodea domnului |
| 818 | 115 | 3684 | 2,49 | F - FANETE | Zapodea domnului |
| 819 | 115 | 3688 | 0,68 | F - FANETE | Zapodea domnului |
| 820 | 115 | 3693 | 0,19 | F - FANETE | Zapodea domnului |
| 821 | 115 | 3695 | 0,65 | F - FANETE | Zapodea domnului |
| | Total tarla 115 | | 9,22 | | |
| 822 | 116 | 3721 | 4,17 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 823 | 116 | 3725 | 0,22 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 824 | 116 | 3728 | 0,65 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 825 | 116 | 3729 | 0,05 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 826 | 116 | 3733 | 11,67 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 827 | 116 | 3734 | 0,26 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 828 | 116 | 3736 | 1,37 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 829 | 116 | 3737 | 0,55 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 830 | 116 | 3738 | 0,30 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 831 | 116 | 3739 | 0,05 | F - FANETE | Coasta Hampului |

| | | | | | |
|-----|-----------------|------|-------|------------|-----------------|
| 832 | 116 | 3741 | 5,19 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 833 | 116 | 3743 | 0,08 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 834 | 116 | 3744 | 0,09 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 835 | 116 | 3754 | 0,08 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 836 | 116 | 3755 | 0,09 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 837 | 116 | 3756 | 0,09 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 838 | 116 | 3757 | 0,03 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 839 | 116 | 3762 | 0,55 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 840 | 116 | 3764 | 0,75 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 841 | 116 | 3765 | 0,09 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 842 | 116 | 3766 | 7,60 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 843 | 116 | 3768 | 1,15 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 844 | 116 | 3771 | 0,03 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 845 | 116 | 3776 | 0,08 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 846 | 116 | 3779 | 0,03 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 847 | 116 | 3787 | 2,86 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 848 | 116 | 3800 | 0,09 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 849 | 116 | 3805 | 8,89 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 850 | 116 | 3808 | 0,03 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| | Total tarla 116 | | 47,09 | | |
| 851 | 117 | 3823 | 0,20 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 852 | 117 | 3825 | 0,47 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 853 | 117 | 3826 | 0,10 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 854 | 117 | 3828 | 1,49 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 855 | 117 | 3830 | 0,38 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 856 | 117 | 3834 | 0,11 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 857 | 117 | 3835 | 0,09 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 858 | 117 | 3836 | 0,01 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 859 | 117 | 3841 | 0,17 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 860 | 117 | 3842 | 0,11 | F - FANETE | Coasta Hampului |

| | | | | | |
|-----|-----------------|------|-------|------------|---------------------|
| 861 | 117 | 3843 | 0,14 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 862 | 117 | 3846 | 0,24 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 863 | 117 | 3848 | 0,29 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| 864 | 117 | 3851 | 0,08 | F - FANETE | Coasta Hampului |
| | Total taria 117 | | 3,88 | | |
| 865 | 118 | 3854 | 1,29 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 866 | 118 | 3863 | 0,19 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 867 | 118 | 3865 | 0,29 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 868 | 118 | 3868 | 0,41 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 869 | 118 | 3870 | 0,12 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 870 | 118 | 3872 | 0,19 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 871 | 118 | 3881 | 0,32 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 872 | 118 | 3882 | 0,27 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 873 | 118 | 3883 | 0,36 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 874 | 118 | 3885 | 0,06 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 875 | 118 | 3887 | 0,28 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 876 | 118 | 3889 | 0,63 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 877 | 118 | 3890 | 0,08 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 878 | 118 | 3891 | 0,59 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 879 | 118 | 3897 | 1,40 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 880 | 118 | 3898 | 18,79 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 881 | 118 | 3901 | 0,79 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 882 | 118 | 3907 | 3,21 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 883 | 118 | 3913 | 0,27 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 884 | 118 | 3914 | 1,41 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 885 | 118 | 3924 | 8,11 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 886 | 118 | 3926 | 0,64 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 887 | 118 | 3931 | 10,37 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 888 | 118 | 3933 | 0,01 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 889 | 118 | 3935 | 0,06 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |

| | | | | | |
|-----|-----------------|---------|-------|------------|---------------------|
| 890 | 118 | 3940 | 1,06 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 891 | 118 | 3942 | 0,14 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 892 | 118 | 3943 | 0,13 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 893 | 118 | 3945 | 0,40 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 894 | 118 | 3949 | 8,66 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 895 | 118 | 3954 | 0,10 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 896 | 118 | 3962 | 0,01 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 897 | 118 | 3978 | 2,21 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 898 | 118 | 3982 | 10,01 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| 899 | 118 | 3990 | 4,42 | F - FANETE | Coasta Bulanestilor |
| | Total tarla 118 | | 77,28 | | |
| 900 | 119 | 4003 | 0,48 | F - FANETE | Nisindoala |
| 901 | 119 | 4007 | 0,05 | F - FANETE | Nisindoala |
| 902 | 119 | 4012 | 0,20 | F - FANETE | Nisindoala |
| 903 | 119 | 4017 | 0,02 | F - FANETE | Nisindoala |
| 904 | 119 | 4018 | 0,31 | F - FANETE | Nisindoala |
| 905 | 119 | 4020 | 0,13 | F - FANETE | Nisindoala |
| 906 | 119 | 4022 | 11,01 | F - FANETE | Nisindoala |
| 907 | 119 | 4038-2 | 0,18 | F - FANETE | Nisindoala |
| 908 | 119 | 4038/01 | 20,06 | F - FANETE | Nisindoala |
| 909 | 119 | 4043 | 1,80 | F - FANETE | Nisindoala |
| 910 | 119 | 4045 | 2,01 | F - FANETE | Nisindoala |
| | Total tarla 119 | | 36,25 | | |
| 911 | 120 | 4049 | 0,13 | F - FANETE | Nisindoala |
| 912 | 120 | 4058 | 0,65 | F - FANETE | Nisindoala |
| 913 | 120 | 4061 | 0,10 | F - FANETE | Nisindoala |
| 914 | 120 | 4074 | 0,20 | F - FANETE | Nisindoala |
| 915 | 120 | 4076 | 0,87 | F - FANETE | Nisindoala |
| 916 | 120 | 4077 | 0,30 | F - FANETE | Nisindoala |
| 917 | 120 | 4086 | 0,77 | F - FANETE | Nisindoala |

| | | | | | |
|-----|-----------------|--------|-------|------------|------------------|
| 918 | 120 | 4089 | 0,64 | F - FANETE | Nisindoala |
| 919 | 120 | 4104 | 0,77 | F - FANETE | Nisindoala |
| 920 | 120 | 4106 | 0,14 | F - FANETE | Nisindoala |
| 921 | 120 | 4107 | 50,45 | F - FANETE | Nisindoala |
| 922 | 120 | 4108 | 0,51 | F - FANETE | Nisindoala |
| 923 | 120 | 4109 | 17,41 | F - FANETE | Nisindoala |
| 924 | 120 | 4128 | 0,06 | F - FANETE | Nisindoala |
| 925 | 120 | 4130 | 0,01 | F - FANETE | Nisindoala |
| 926 | 120 | 4134 | 0,16 | F - FANETE | Nisindoala |
| | Total tarla 120 | | 73,17 | | |
| 927 | 121 | 4145 | 0,21 | F - FANETE | Molda Nisindoala |
| 928 | 121 | 4148 | 0,53 | F - FANETE | Molda Nisindoala |
| 929 | 121 | 4151 | 0,27 | F - FANETE | Molda Nisindoala |
| 930 | 121 | 4152 | 1,01 | F - FANETE | Molda Nisindoala |
| 931 | 121 | 4153 | 4,91 | F - FANETE | Molda Nisindoala |
| 932 | 121 | 4154 | 0,48 | F - FANETE | Molda Nisindoala |
| 933 | 121 | 4157 | 0,87 | F - FANETE | Molda Nisindoala |
| 934 | 121 | 4158 | 0,03 | F - FANETE | Molda Nisindoala |
| 935 | 121 | 4159 | 0,16 | F - FANETE | Molda Nisindoala |
| 936 | 121 | 4164 | 3,81 | F - FANETE | Molda Nisindoala |
| 937 | 121 | 4165 | 0,73 | F - FANETE | Molda Nisindoala |
| | Total tarla 121 | | 13,01 | | |
| 938 | 122 | 4168 | 0,12 | F - FANETE | Nucari |
| 939 | 122 | 4170 | 0,45 | F - FANETE | Nucari |
| 940 | 122 | 4171 | 0,32 | F - FANETE | Nucari |
| 941 | 122 | 4172 | 0,14 | F - FANETE | Nucari |
| 942 | 122 | 4173 | 0,10 | F - FANETE | Nucari |
| 943 | 122 | 4186-2 | 1,25 | F - FANETE | Nucari |
| 944 | 122 | 4186-3 | 0,07 | F - FANETE | Nucari |
| | Total tarla 122 | | 2,45 | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------|---------|-------|------------|--------------|
| 945 | 123 | 4188 | 0,40 | F - FANETE | Nucari |
| 946 | 123 | 4189 | 0,08 | F - FANETE | Nucari |
| 947 | 123 | 4193 | 13,15 | F - FANETE | Nucari |
| 948 | 123 | 4204 | 0,36 | F - FANETE | Nucari |
| 949 | 123 | 4208 | 0,60 | F - FANETE | Nucari |
| 950 | 123 | 4214 | 0,13 | F - FANETE | Nucari |
| 951 | 123 | 4215 | 0,03 | F - FANETE | Nucari |
| 952 | 123 | 4225 | 4,62 | F - FANETE | Nucari |
| 953 | 123 | 4240 | 0,03 | F - FANETE | Nucari |
| 954 | 123 | 4243 | 15,43 | F - FANETE | Nucari |
| 955 | 123 | 4244 | 0,17 | F - FANETE | Nucari |
| 956 | 123 | 4252 | 1,09 | F - FANETE | Nucari |
| 957 | 123 | 4255 | 0,50 | F - FANETE | Nucari |
| 958 | 123 | 4262 | 0,06 | F - FANETE | Nucari |
| 959 | 123 | 4265 | 0,08 | F - FANETE | Nucari |
| 960 | 123 | 4271 | 0,30 | F - FANETE | Nucari |
| | Total tarla 123 | | 37,03 | | |
| 961 | 124 | 4277 | 0,03 | F - FANETE | Valea Viilor |
| 962 | 124 | 4282 | 0,05 | F - FANETE | Valea Viilor |
| 963 | 124 | 4283/01 | 1,70 | F - FANETE | Valea Viilor |
| 964 | 124 | 4284 | 0,92 | F - FANETE | Valea Viilor |
| 965 | 124 | 4291 | 9,10 | F - FANETE | Valea Viilor |
| 966 | 124 | 4294 | 1,79 | F - FANETE | Valea Viilor |
| 967 | 124 | 4312 | 0,36 | F - FANETE | Valea Viilor |
| | Total tarla 124 | | 13,95 | | |
| 968 | 125 | 4327 | 0,91 | F - FANETE | Nisindoala |
| 969 | 125 | 4332 | 1,31 | F - FANETE | Nisindoala |
| 970 | 125 | 4337 | 0,03 | F - FANETE | Nisindoala |
| 971 | 125 | 4346/04 | 0,12 | F - FANETE | Nisindoala |
| 972 | 125 | 4346/01 | 13,24 | F - FANETE | Nisindoala |

| | | | | | |
|-----|-----------------|---------|-------|------------|-------------------|
| 973 | 125 | 4346/02 | 0,05 | F - FANETE | Nisindoala |
| 974 | 125 | 4346/06 | 0,05 | F - FANETE | Nisindoala |
| | Total tarla 125 | | 15,71 | | |
| 975 | 126 | 4375 | 1,22 | F - FANETE | Pasunatul vacilor |
| 976 | 126 | 4380 | 0,24 | F - FANETE | Pasunatul vacilor |
| 977 | 126 | 4382 | 0,01 | F - FANETE | Pasunatul vacilor |
| 978 | 126 | 4384 | 0,15 | F - FANETE | Pasunatul vacilor |
| 979 | 126 | 4386 | 0,18 | F - FANETE | Pasunatul vacilor |
| 980 | 126 | 4390 | 0,65 | F - FANETE | Pasunatul vacilor |
| | Total tarla 126 | | 2,45 | | |
| 980 | 128 | 4398 | 0,53 | F - FANETE | Pasunatul vacilor |
| 981 | 128 | 4406 | 2,49 | F - FANETE | Pasunatul vacilor |
| 982 | 128 | 4407 | 0,15 | F - FANETE | Pasunatul vacilor |
| 983 | 128 | 4414/01 | 16,13 | F - FANETE | Pasunatul vacilor |
| 984 | 128 | 4414/08 | 0,03 | F - FANETE | Pasunatul vacilor |
| 985 | 128 | 4414/09 | 1,02 | F - FANETE | Pasunatul vacilor |
| 986 | 128 | 4414/02 | 0,04 | F - FANETE | Pasunatul vacilor |
| 987 | 128 | 4414/05 | 0,45 | F - FANETE | Pasunatul vacilor |
| 988 | 128 | 4414/07 | 0,35 | F - FANETE | Pasunatul vacilor |
| 989 | 128 | 4414/12 | 0,46 | F - FANETE | Pasunatul vacilor |
| 990 | 128 | 4414/10 | 0,01 | F - FANETE | Pasunatul vacilor |
| 991 | 128 | 4414/15 | 1,93 | F - FANETE | Pasunatul vacilor |
| 992 | 128 | 4414/11 | 0,20 | F - FANETE | Pasunatul vacilor |
| 993 | 128 | 4417 | 0,21 | F - FANETE | Pasunatul vacilor |
| 994 | 128 | 4423 | 3,87 | F - FANETE | Pasunatul vacilor |
| | Total tarla 128 | | 27,87 | | |
| 995 | 131 | 4477 | 9,98 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 996 | 131 | 4483 | 5,61 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 997 | 131 | 4501 | 0,38 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| | Total tarla 131 | | 15,97 | | |

| | | | | | |
|------|-----------------|------|-------|------------|--------------|
| 998 | 132 | 4521 | 0,09 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 999 | 132 | 4522 | 0,25 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1000 | 132 | 4524 | 0,08 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1001 | 132 | 4525 | 0,06 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1002 | 132 | 4531 | 2,79 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1003 | 132 | 4547 | 11,83 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1004 | 132 | 4551 | 3,55 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| | Total tarla 132 | | 18,65 | | |
| 1005 | 133 | 4565 | 0,10 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1006 | 133 | 4569 | 0,76 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1007 | 133 | 4581 | 0,09 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1008 | 133 | 4611 | 1,33 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1009 | 133 | 4612 | 0,27 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1010 | 133 | 4613 | 0,70 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1011 | 133 | 4618 | 0,12 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1012 | 133 | 4621 | 7,74 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1013 | 133 | 4628 | 1,24 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1014 | 133 | 4629 | 0,08 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1015 | 133 | 4630 | 0,28 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1016 | 133 | 4631 | 0,01 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1017 | 133 | 4640 | 2,44 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1018 | 133 | 4641 | 0,24 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1019 | 133 | 4651 | 0,11 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1020 | 133 | 4658 | 0,05 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| | Total tarla 133 | | 15,56 | | |
| 1021 | 134 | 4681 | 18,59 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1022 | 134 | 4684 | 0,17 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1023 | 134 | 4685 | 1,56 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1024 | 134 | 4688 | 2,47 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1025 | 134 | 4697 | 0,93 | F - FANETE | Sesul Stenii |

| | | | | | |
|------|-----------------|------|-------|------------|--------------|
| 1026 | 134 | 4708 | 0,11 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| 1027 | 134 | 4709 | 0,17 | F - FANETE | Sesul Stenii |
| | Total tarla 134 | | 24,00 | | |
| 1028 | 135 | 4715 | 0,76 | F - FANETE | Inuri |
| 1029 | 135 | 4743 | 0,13 | F - FANETE | Inuri |
| 1030 | 135 | 4748 | 0,20 | F - FANETE | Inuri |
| 1031 | 135 | 4752 | 1,85 | F - FANETE | Inuri |
| 1032 | 135 | 4753 | 0,72 | F - FANETE | Inuri |
| 1033 | 135 | 4758 | 3,00 | F - FANETE | Inuri |
| 1034 | 135 | 4772 | 0,17 | F - FANETE | Inuri |
| 1035 | 135 | 4781 | 0,60 | F - FANETE | Inuri |
| | Total tarla 135 | | 7,43 | | |
| 1036 | 136 | 4802 | 0,16 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1037 | 136 | 4807 | 0,33 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1038 | 136 | 4811 | 0,59 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1039 | 136 | 4817 | 0,43 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1040 | 136 | 4818 | 3,00 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1041 | 136 | 4822 | 3,02 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1042 | 136 | 4827 | 1,15 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1043 | 136 | 4832 | 2,00 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1044 | 136 | 4834 | 0,13 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1045 | 136 | 4836 | 0,10 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1046 | 136 | 4838 | 17,23 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1047 | 136 | 4845 | 0,08 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1048 | 136 | 4847 | 0,18 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1049 | 136 | 4848 | 0,05 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1050 | 136 | 4850 | 0,27 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1051 | 136 | 4851 | 0,15 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1052 | 136 | 4855 | 4,97 | F - FANETE | Lunca de jos |
| | Total tarla 136 | | 33,84 | | |

| | | | | | |
|------|-----------------|--------|-------|------------|-----------------|
| 1053 | 137 | 4857 | 0,73 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1054 | 137 | 4859 | 1,06 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1055 | 137 | 4873 | 0,33 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1056 | 137 | 4876 | 0,17 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1057 | 137 | 4878 | 1,05 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1058 | 137 | 4880 | 0,31 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1059 | 137 | 4882 | 0,71 | F - FANETE | Lunca de jos |
| 1060 | 137 | 4884 | 0,47 | F - FANETE | Lunca de jos |
| | Total tarla 137 | | 4,83 | | |
| 1061 | 138 | 4887 | 0,25 | F - FANETE | Sesul Buii |
| 1062 | 138 | 4890 | 0,04 | F - FANETE | Sesul Buii |
| 1063 | 138 | 4905 | 0,07 | F - FANETE | Sesul Buii |
| 1064 | 138 | 4907 | 5,31 | F - FANETE | Sesul Buii |
| | Total tarla 138 | | 5,67 | | |
| 1065 | 139 | 4922 | 1,80 | F - FANETE | Sesul Buii |
| 1066 | 139 | 4937 | 0,24 | F - FANETE | Sesul Buii |
| 1067 | 139 | 4941 | 0,25 | F - FANETE | Sesul Buii |
| 1068 | 139 | 4954 | 14,16 | F - FANETE | Sesul Buii |
| 1069 | 139 | 4958 | 0,06 | F - FANETE | Sesul Buii |
| 1070 | 139 | 4960 | 0,09 | F - FANETE | Sesul Buii |
| | Total tarla 139 | | 16,60 | | |
| 1071 | 140 | 4968 | 2,48 | F - FANETE | Dealul Sibiului |
| 1072 | 140 | 4971 | 9,55 | F - FANETE | Dealul Sibiului |
| 1073 | 140 | 4974 | 3,68 | F - FANETE | Dealul Sibiului |
| 1074 | 140 | 4983 | 0,22 | F - FANETE | Dealul Sibiului |
| 1075 | 140 | 4987 | 0,19 | F - FANETE | Dealul Sibiului |
| 1076 | 140 | 4990 | 0,77 | F - FANETE | Dealul Sibiului |
| 1077 | 140 | 4993-1 | 10,31 | F - FANETE | Dealul Sibiului |
| 1078 | 140 | 4993-3 | 0,65 | F - FANETE | Dealul Sibiului |
| 1079 | 140 | 5006 | 0,49 | F - FANETE | Dealul Sibiului |

| | | | | | |
|------|-----------------|------|-------|------------|------------------|
| | Total tarla 140 | | 28,34 | | |
| 1080 | 141 | 5021 | 12,00 | F - FANETE | In carn |
| 1081 | 141 | 5022 | 4,07 | F - FANETE | In carn |
| 1082 | 141 | 5062 | 0,05 | F - FANETE | In carn |
| 1083 | 141 | 5070 | 1,94 | F - FANETE | In carn |
| 1084 | 141 | 5071 | 2,73 | F - FANETE | In carn |
| | Total tarla 141 | | 20,79 | | |
| 1085 | 142 | 5084 | 0,06 | F - FANETE | Lacuri |
| 1086 | 142 | 5085 | 0,10 | F - FANETE | Lacuri |
| 1087 | 142 | 5091 | 4,95 | F - FANETE | Lacuri |
| 1088 | 142 | 5098 | 0,15 | F - FANETE | Lacuri |
| 1089 | 142 | 5103 | 0,14 | F - FANETE | Lacuri |
| 1090 | 142 | 5105 | 0,16 | F - FANETE | Lacuri |
| 1091 | 142 | 5110 | 0,11 | F - FANETE | Lacuri |
| 1092 | 142 | 5112 | 0,02 | F - FANETE | Lacuri |
| 1093 | 142 | 5113 | 0,04 | F - FANETE | Lacuri |
| | Total tarla 142 | | 5,73 | | |
| 1094 | 143 | 5122 | 0,15 | F - FANETE | Lacuri |
| 1095 | 143 | 5125 | 1,49 | F - FANETE | Lacuri |
| 1096 | 143 | 5129 | 0,02 | F - FANETE | Lacuri |
| 1097 | 143 | 5130 | 0,02 | F - FANETE | Lacuri |
| 1098 | 143 | 5132 | 0,03 | F - FANETE | Lacuri |
| 1099 | 143 | 5136 | 0,14 | F - FANETE | Lacuri |
| | Total tarla 143 | | 1,85 | | |
| 1100 | 144 | 5146 | 0,52 | F - FANETE | Lacuri |
| 1101 | 144 | 5157 | 2,41 | F - FANETE | Lacuri |
| | Total tarla 144 | | 2,93 | | |
| 1102 | 145 | 5167 | 0,05 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |
| 1103 | 145 | 5168 | 0,17 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |
| 1104 | 145 | 5169 | 0,03 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |

| | | | | | |
|------|-----------------|--------|-------|------------|------------------|
| 1105 | 145 | 5175 | 0,65 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |
| 1106 | 145 | 5176 | 0,07 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |
| 1107 | 145 | 5179-1 | 8,61 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |
| 1108 | 145 | 5183 | 1,47 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |
| 1109 | 145 | 5185 | 0,30 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |
| 1110 | 145 | 5187 | 3,90 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |
| | Total tarla 145 | | 15,25 | | |
| 1111 | 146 | 5193 | 0,20 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |
| 1112 | 146 | 5204 | 0,28 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |
| 1113 | 146 | 5219 | 4,11 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |
| 1114 | 146 | 5223 | 3,69 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |
| 1115 | 146 | 5225 | 0,06 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |
| 1116 | 146 | 5230 | 2,00 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |
| 1117 | 146 | 5231 | 0,68 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |
| 1118 | 146 | 5236 | 0,24 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |
| 1119 | 146 | 5237 | 0,18 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |
| 1120 | 146 | 5243 | 0,16 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |
| 1121 | 146 | 5245 | 0,15 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |
| 1122 | 146 | 5247 | 2,71 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |
| 1123 | 146 | 5251 | 0,10 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |
| 1124 | 146 | 5260 | 0,10 | F - FANETE | Fagetul lui Bela |
| | Total tarla 146 | | 14,66 | | |
| 1125 | 147 | 5264 | 1,11 | F - FANETE | Gruicul morii |
| 1126 | 147 | 5265 | 3,46 | F - FANETE | Gruicul morii |
| 1127 | 147 | 5270 | 1,61 | F - FANETE | Gruicul morii |
| 1128 | 147 | 5271 | 0,31 | F - FANETE | Gruicul morii |
| 1129 | 147 | 5275 | 0,80 | F - FANETE | Gruicul morii |
| 1130 | 147 | 5281 | 3,17 | F - FANETE | Gruicul morii |
| 1131 | 147 | 5282 | 1,68 | F - FANETE | Gruicul morii |
| 1132 | 147 | 5288 | 0,04 | F - FANETE | Gruicul morii |

| | | | | | |
|------|-----------------|---------|-------|------------|-----------------|
| 1133 | 147 | 5292/02 | 0,23 | F - FANETE | Grujul morii |
| 1134 | 147 | 5292-1 | 0,06 | F - FANETE | Grujul morii |
| 1135 | 147 | 5294 | 3,95 | F - FANETE | Grujul morii |
| 1136 | 147 | 5298-1 | 0,28 | F - FANETE | Grujul morii |
| 1137 | 147 | 5299 | 0,67 | F - FANETE | Grujul morii |
| 1138 | 147 | 5313 | 2,18 | F - FANETE | Grujul morii |
| 1139 | 147 | 5316 | 0,24 | F - FANETE | Grujul morii |
| | Total tarla 147 | | 19,79 | | |
| 1140 | 148 | 5332 | 0,85 | F - FANETE | Faget |
| | Total tarla 148 | | 0,85 | | |
| 1141 | 149 | 5343 | 0,11 | F - FANETE | Zapodea nucilor |
| 1142 | 149 | 5345 | 0,22 | F - FANETE | Zapodea nucilor |
| 1143 | 149 | 5349 | 0,17 | F - FANETE | Zapodea nucilor |
| 1144 | 149 | 5350 | 0,16 | F - FANETE | Zapodea nucilor |
| 1145 | 149 | 5353 | 0,18 | F - FANETE | Zapodea nucilor |
| 1146 | 149 | 5364 | 11,77 | F - FANETE | Zapodea nucilor |
| 1147 | 149 | 5370 | 25,13 | F - FANETE | Zapodea nucilor |
| 1148 | 149 | 5376 | 0,58 | F - FANETE | Zapodea nucilor |
| 1149 | 149 | 5379 | 0,71 | F - FANETE | Zapodea nucilor |
| 1150 | 149 | 5381 | 0,05 | F - FANETE | Zapodea nucilor |
| 1151 | 149 | 5384 | 0,25 | F - FANETE | Zapodea nucilor |
| 1152 | 149 | 5387 | 0,47 | F - FANETE | Zapodea nucilor |
| | Total tarla 149 | | 39,80 | | |
| 1053 | 150 | 5396 | 0,05 | F - FANETE | Sesul Buisoarei |
| 1054 | 150 | 5398 | 0,06 | F - FANETE | Sesul Buisoarei |
| 1055 | 150 | 5406 | 0,22 | F - FANETE | Sesul Buisoarei |
| 1056 | 150 | 5408 | 0,46 | F - FANETE | Sesul Buisoarei |
| 1057 | 150 | 5410 | 0,01 | F - FANETE | Sesul Buisoarei |
| | Total tarla 150 | | 0,80 | | |
| 1058 | 151 | 5418 | 6,85 | F - FANETE | Dealul ciorii |

| | | | | | |
|------|-----------------|--------|-------|------------|---------------|
| 1059 | 151 | 5430 | 0,03 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1060 | 151 | 5432 | 0,01 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1061 | 151 | 5435 | 0,25 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1062 | 151 | 5436 | 0,05 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1063 | 151 | 5441 | 3,37 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1064 | 151 | 5442 | 0,21 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1065 | 151 | 5446 | 0,07 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| | Total tarla 151 | | 10,84 | | |
| 1066 | 152 | 5448 | 0,04 | F - FANETE | Cioara |
| 1067 | 152 | 5449 | 0,13 | F - FANETE | Cioara |
| 1068 | 152 | 5450 | 5,23 | F - FANETE | Cioara |
| 1069 | 152 | 5457 | 0,44 | F - FANETE | Cioara |
| 1070 | 152 | 5459 | 2,13 | F - FANETE | Cioara |
| 1071 | 152 | 5464 | 0,71 | F - FANETE | Cioara |
| 1072 | 152 | 5467 | 1,51 | F - FANETE | Cioara |
| | Total tarla 152 | | 10,19 | | |
| 1073 | 153 | 5474 | 4,90 | F - FANETE | Ograda |
| 1074 | 153 | 5486-1 | 4,45 | F - FANETE | Ograda |
| | Total tarla 153 | | 9,35 | | |
| 1075 | 156 | 5517 | 1,12 | F - FANETE | Pisc |
| 1076 | 156 | 5522 | 0,40 | F - FANETE | Pisc |
| 1077 | 156 | 5524 | 0,28 | F - FANETE | Pisc |
| 1078 | 156 | 5525 | 0,36 | F - FANETE | Pisc |
| | Total tarla 156 | | 2,16 | | |
| 1079 | 158 | 5589 | 1,80 | F - FANETE | Dumbrava |
| 1080 | 158 | 5595 | 0,37 | F - FANETE | Dumbrava |
| 1081 | 158 | 5596 | 0,35 | F - FANETE | Dumbrava |
| 1082 | 158 | 5597 | 0,04 | F - FANETE | Dumbrava |
| 1083 | 158 | 5600 | 0,10 | F - FANETE | Dumbrava |
| 1084 | 158 | 5601 | 0,54 | F - FANETE | Dumbrava |

| | | | | | |
|------|-----------------|---------|-------|------------|---------------|
| 1085 | 158 | 5606 | 1,62 | F - FANETE | Dumbrava |
| 1086 | 158 | 5607 | 0,06 | F - FANETE | Dumbrava |
| 1087 | 158 | 5608 | 0,77 | F - FANETE | Dumbrava |
| 1088 | 158 | 5614 | 0,73 | F - FANETE | Dumbrava |
| 1089 | 158 | 5616 | 0,42 | F - FANETE | Dumbrava |
| 1090 | 158 | 5619 | 0,10 | F - FANETE | Dumbrava |
| 1091 | 158 | 5623 | 0,81 | F - FANETE | Dumbrava |
| 1092 | 158 | 5624 | 0,12 | F - FANETE | Dumbrava |
| | Total tarla 158 | | 7,83 | | |
| 1093 | 159 | 5641 | 0,29 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| | Total tarla 159 | | 0,29 | | |
| 1094 | 162 | 5687 | 0,08 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1095 | 162 | 5688 | 0,12 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1096 | 162 | 5691 | 0,04 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1097 | 162 | 5694-1 | 6,85 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1098 | 162 | 5694/02 | 0,41 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1099 | 162 | 5694/04 | 0,27 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1100 | 162 | 5694/03 | 0,63 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1101 | 162 | 5695 | 0,12 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1102 | 162 | 5699 | 0,04 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1103 | 162 | 5701 | 0,08 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1104 | 162 | 5703 | 0,06 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1105 | 162 | 5706 | 5,36 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1106 | 162 | 5710 | 0,69 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1107 | 162 | 5715 | 26,46 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1108 | 162 | 5716 | 0,58 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1109 | 162 | 5718 | 0,57 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1110 | 162 | 5726 | 0,03 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1111 | 162 | 5729 | 3,59 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1112 | 162 | 5741 | 0,51 | F - FANETE | Dealul Viilor |

| | | | | | |
|------|-----------------|--------|-------|------------|---------------|
| | Total tarla 162 | | 46,49 | | |
| 1113 | 163 | 5750 | 0,35 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1114 | 163 | 5751 | 2,33 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1115 | 163 | 5752 | 3,17 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1116 | 163 | 5757 | 0,40 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1117 | 163 | 5759 | 28,24 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1118 | 163 | 5762 | 2,32 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1119 | 163 | 5764 | 0,27 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| | Total tarla 163 | | 37,08 | | |
| 1120 | 164 | 5775-1 | 0,47 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1121 | 164 | 5780 | 0,17 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1122 | 164 | 5782 | 0,16 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1123 | 164 | 5783 | 0,03 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1124 | 164 | 5785 | 0,05 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1125 | 164 | 5792 | 0,03 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1126 | 164 | 5793 | 0,15 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1127 | 164 | 5797 | 0,03 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| 1128 | 164 | 5798 | 0,03 | F - FANETE | Dealul Viilor |
| | Total tarla 164 | | 1,12 | | |
| 1129 | 165 | 5801 | 7,19 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1130 | 165 | 5806 | 0,02 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1131 | 165 | 5809 | 0,83 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1132 | 165 | 5812 | 0,57 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1133 | 165 | 5813 | 0,67 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1134 | 165 | 5814 | 0,35 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1135 | 165 | 5815 | 3,26 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1136 | 165 | 5817 | 0,03 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1137 | 165 | 5818 | 0,50 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1138 | 165 | 5819 | 1,52 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1139 | 165 | 5820 | 1,13 | F - FANETE | Dealul ciorii |

| | | | | | |
|------|-----------------|------|-------|------------|-----------------|
| 1140 | 165 | 5821 | 1,47 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1141 | 165 | 5828 | 2,86 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1142 | 165 | 5834 | 1,84 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| | Total tarla 165 | | 22,24 | | |
| 1143 | 166 | 5837 | 0,46 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1144 | 166 | 5846 | 0,31 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1145 | 166 | 5851 | 0,15 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1146 | 166 | 5852 | 0,28 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1147 | 166 | 5854 | 0,35 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1148 | 166 | 5858 | 1,85 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1149 | 166 | 5859 | 0,01 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1150 | 166 | 5862 | 0,40 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1151 | 166 | 5863 | 0,01 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1152 | 166 | 5864 | 0,56 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1153 | 166 | 5866 | 1,93 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| | Total tarla 166 | | 6,31 | | |
| 1154 | 167 | 5872 | 3,10 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1155 | 167 | 5874 | 0,07 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| | Total tarla 167 | | 3,17 | | |
| 1156 | 168 | 5884 | 6,34 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1157 | 168 | 5889 | 8,09 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1158 | 168 | 5909 | 0,14 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1159 | 168 | 5911 | 1,54 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1160 | 168 | 5914 | 1,60 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1161 | 168 | 5921 | 2,21 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1162 | 168 | 5922 | 3,62 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| 1163 | 168 | 5926 | 3,33 | F - FANETE | Dealul ciorii |
| | Total tarla 168 | | 26,87 | | |
| 1164 | 169 | 5931 | 0,32 | F - FANETE | Poiana turcului |
| 1165 | 169 | 5933 | 0,17 | F - FANETE | Poiana turcului |

| | | | | | |
|------|-----------------|------|-------|------------|--------------|
| | Total tarla 169 | | 0,49 | | |
| 1166 | 170 | 5936 | 1,25 | F - FANETE | Paraul boghi |
| 1167 | 170 | 5938 | 3,74 | F - FANETE | Paraul boghi |
| 1168 | 170 | 5956 | 2,26 | F - FANETE | Paraul boghi |
| 1169 | 170 | 5957 | 5,87 | F - FANETE | Paraul boghi |
| 1170 | 170 | 5958 | 0,40 | F - FANETE | Paraul boghi |
| 1171 | 170 | 5959 | 0,73 | F - FANETE | Paraul boghi |
| 1172 | 170 | 5960 | 0,27 | F - FANETE | Paraul boghi |
| 1173 | 170 | 5963 | 0,17 | F - FANETE | Paraul boghi |
| 1174 | 170 | 5965 | 2,92 | F - FANETE | Paraul boghi |
| 1175 | 170 | 5967 | 0,50 | F - FANETE | Paraul boghi |
| | Total tarla 170 | | 18,11 | | |
| 1176 | 171 | 5970 | 0,39 | F - FANETE | Sopin |
| 1177 | 171 | 5971 | 0,72 | F - FANETE | Sopin |
| 1178 | 171 | 5973 | 0,24 | F - FANETE | Sopin |
| 1179 | 171 | 5978 | 0,38 | F - FANETE | Sopin |
| 1180 | 171 | 5980 | 2,19 | F - FANETE | Sopin |
| 1181 | 171 | 5981 | 2,07 | F - FANETE | Sopin |
| 1182 | 171 | 5983 | 0,14 | F - FANETE | Sopin |
| 1183 | 171 | 5985 | 0,32 | F - FANETE | Sopin |
| 1184 | 171 | 5990 | 9,20 | F - FANETE | Sopin |
| 1185 | 171 | 5993 | 1,99 | F - FANETE | Sopin |
| 1186 | 171 | 5996 | 0,67 | F - FANETE | Sopin |
| 1187 | 171 | 6001 | 0,70 | F - FANETE | Sopin |
| 1188 | 171 | 6004 | 0,39 | F - FANETE | Sopin |
| 1189 | 171 | 6006 | 0,28 | F - FANETE | Sopin |
| 1190 | 171 | 6010 | 0,06 | F - FANETE | Sopin |
| 1191 | 171 | 6011 | 0,22 | F - FANETE | Sopin |
| 1192 | 171 | 6017 | 0,08 | F - FANETE | Sopin |
| 1193 | 171 | 6021 | 0,12 | F - FANETE | Sopin |

| | | | | | |
|------|-----------------|--------|-------|------------|-----------------|
| 1194 | 171 | 6025 | 4,29 | F - FANETE | Sopin |
| 1195 | 171 | 6031 | 0,04 | F - FANETE | Sopin |
| 1196 | 171 | 6032 | 0,64 | F - FANETE | Sopin |
| 1197 | 171 | 6043 | 1,47 | F - FANETE | Sopin |
| 1198 | 171 | 6051 | 0,79 | F - FANETE | Sopin |
| 1199 | 171 | 6052 | 2,55 | F - FANETE | Sopin |
| | Total tarla 171 | | 29,94 | | |
| 1200 | 172 | 6057 | 0,10 | F - FANETE | Pasunea sasilor |
| 1201 | 172 | 6060 | 0,67 | F - FANETE | Pasunea sasilor |
| 1202 | 172 | 6063 | 2,14 | F - FANETE | Pasunea sasilor |
| 1203 | 172 | 6080 | 1,26 | F - FANETE | Pasunea sasilor |
| 1204 | 172 | 6081 | 0,04 | F - FANETE | Pasunea sasilor |
| 1205 | 172 | 6090 | 0,48 | F - FANETE | Pasunea sasilor |
| 1206 | 172 | 6091 | 0,86 | F - FANETE | Pasunea sasilor |
| 1207 | 172 | 6092 | 6,86 | F - FANETE | Pasunea sasilor |
| | Total tarla 172 | | 12,41 | | |
| 1208 | 173 | 6104 | 0,44 | F - FANETE | Pasunea sasilor |
| 1209 | 173 | 6109 | 1,13 | F - FANETE | Pasunea sasilor |
| 1210 | 173 | 6110 | 1,33 | F - FANETE | Pasunea sasilor |
| 1211 | 173 | 6111 | 7,86 | F - FANETE | Pasunea sasilor |
| 1212 | 173 | 6113 | 0,23 | F - FANETE | Pasunea sasilor |
| 1213 | 173 | 6115 | 0,25 | F - FANETE | Pasunea sasilor |
| 1214 | 173 | 6122 | 0,35 | F - FANETE | Pasunea sasilor |
| 1215 | 173 | 6130-1 | 0,53 | F - FANETE | Pasunea sasilor |
| 1216 | 173 | 6130-2 | 0,69 | F - FANETE | Pasunea sasilor |
| | Total tarla 173 | | 12,81 | | |
| 1217 | 174 | 6165 | 0,56 | F - FANETE | Zapodea Cetatii |
| 1218 | 174 | 6167 | 1,60 | F - FANETE | Zapodea Cetatii |
| 1219 | 174 | 6173 | 1,86 | F - FANETE | Zapodea Cetatii |
| 1220 | 174 | 6175 | 6,51 | F - FANETE | Zapodea Cetatii |

| | | | | | |
|------|-----------------|------|-------|------------|-----------------|
| 1221 | 174 | 6177 | 0,76 | F - FANETE | Zapodea Cetatii |
| 1222 | 174 | 6180 | 1,50 | F - FANETE | Zapodea Cetatii |
| 1223 | 174 | 6190 | 3,48 | F - FANETE | Zapodea Cetatii |
| 1224 | 174 | 6195 | 0,11 | F - FANETE | Zapodea Cetatii |
| 1225 | 174 | 6203 | 2,39 | F - FANETE | Zapodea Cetatii |
| | Total tarla 174 | | 18,77 | | |
| 1226 | 175 | 6206 | 0,94 | F - FANETE | Zapodea Cetatii |
| 1227 | 175 | 6210 | 0,72 | F - FANETE | Zapodea Cetatii |
| 1228 | 175 | 6212 | 7,73 | F - FANETE | Zapodea Cetatii |
| | Total tarla 175 | | 9,39 | | |

| | |
|---------------------|-------------------|
| TOTAL fanete | 2558,56 ha |
|---------------------|-------------------|

Mentionam ca in tabel sunt trecute parcelele cu suprafata totala inregistrata in registrul cadastral, parcele care se regasesc in Titlurile de proprietate emise.

Primar,

Șușa Nicolae

Secretar,

Coman Vasile

Intocmit,

Menchiu Florin Andrei



Documentele care fac dovada dreptului de proprietate asupra pajiștii, pentru fiecare parcelă în parte, se găsesc la sediul Primăriei.

Fondul pastoral cuprinde nu numai pajiștile propriu-zise, afectate direct producției, dar și celelalte categorii de terenuri din perimetrul pastoral:

- existente sau care se vor crea și care prin prezența lor sunt destinate a asigura condiții favorabile economiei pastorale (ex. zone de protecție);
- instalațiile și construcțiile existente sau care se vor realiza;
- drumurile speciale de acces la pășune (exclusiv drumurile publice).

Dintre suprafețele declarate la A.P.I.A, unele sunt cu angajament de agromediu. Situația declarațiilor acestor suprafețe se poate schimba în fiecare an.

GLOSAR

Corpul de pajiște – cea mai mare unitate economică pastorală, cu suprafețe cuprinse între

100 și 25.000 ha (ex.: gol de munte, luncă râu, etc.);

Trupul de pajiște – o suprafață continuă înconjurată de terenuri aparținând altor categorii de

folosință a terenurilor, indiferent de întinderea și apartenența ei;

Parcela descriptivă – unitatea constitutivă de bază din cadrul unui trup de pajiște, delimitată

în cadrul parcelarului în funcție de condițiile staționale și a vegetației, cu caracter permanent,

indiferent de modul de folosință a terenului în cadrul trupului respectiv.

Subparcelele – subdiviziune a parcelei descriptive unde se aplică tehnologii diferențiate de îmbunătățire;

Parcela de exploatare – suprafața din cadrul unei pășuni, delimitată prin limite naturale sau

artificiale (garduri fixe, garduri electrice, etc.), cu producții de iarbă aproximativ egale, utilizate pentru pășunatul rațional în rotație.

Enclave – suprafețe de teren cu alte categorii de folosință (arabil, pădure, luciuri de apă, etc.), amplasate în interiorul pajiștii.

2.4 SUPRAFAȚA PAJIȘTILOR. DETERMINAREA SUPRAFETELOR.

| Nr crt | Forma deținere | Suprafata (ha) | | Total Pajisti ha |
|--------|---|----------------|---------|------------------|
| | | Fanete | Pasuni | |
| 1 | Terenuri deținute conform legilor proprietății fondului funciar | 2558,60 | 246,59 | 2805,19 |
| 2 | Terenuri obținute conform ordinului prefectului nr. | 0,53 | 1620,03 | 1620,56 |
| | TOTAL | 2559,13 | 1866,62 | 4425,75 |

2.5 Organizarea administrativă

Pajiștile care sunt studiate în acest amenajament aparțin Consiliului Local al Comunei Șeica Mare și au fost măsurate conform Ordinului Prefectului nr. 108/2006. În urma licitației, s-au încheiat contracte de închiriere pe suprafețele de pajiști, cu deținători de animale locali, care au obligația să le administreze pe perioada contractuală.

Studiul se constituie pe o suprafață de pajiști de **4425,75 ha**, împărțită în **trupuri, parcele și subparcele**, răspândite pe teritoriul localităților Șeica Mare, Boarta, Buia, Stenia, Petis, Mighindoala. Unele parcele au fost subîmpărțite datorită suprafeței prea mari sau diversității caracteristicilor de relief și vegetație.

În prezent, majoritatea suprafețelor de pajiști sunt neîntreținute corespunzător. Nu prezintă mușuroaie, dar puține parcele sunt curățate de resturi de vegetație ierboasă nepășunate, de vegetație toxică sau dăunătoare, de plante cu grad redus de consumabilitate și vegetație lemnoasă de dimensiuni mici (*Crataegus monogyna*, *Prunus spinosa*, *Rosa canina*). Zonele neproductive cu tufărișuri, de pe pâraurile seci și marginile de pădure, tind să se extindă spre interiorul pajiștilor, mai ales cu vegetație lemnoasă.

CAP. 3. CARACTERISTICI GEOGRAFICE SI CLIMATICE

3.1. Relief

Teritoriul studiat se încadrează geografic în Unitatea Depresiunii Transilvaniei, subunitatea Podișul Târnavelor, sectoarele Podișul Hârtibaciului (la est de râul Visa) și Podișul Secașelor (la vest de râul Visa).

Teritoriul studiat se desfășoară altitudinal între 320-600 m, pe următoarele forme principale de relief:

| Relief, panta (%) | Soluri (US) |
|---|--|
| 1. Culmi foarte largi-platouri (suprafețe de nivelare la 500-550 m și 400-480 m); panta 1-2%. | Luvosoluri (15,18,19) Stagnosoluri (20) |
| 2. Culmi largi; 2-5%. | Luvosoluri (15,17,18,19) |
| 3. Culmi înguste; 2-10%. | Regosoluri (1,2) |
| 4. Versanți de monoclin (pe suprafețe structurale); 5-25%. | Preluvosoluri (12,14) Luvosoluri (15,17) Stagnosoluri (20) |
| 5. Versanți de tip cuestă și bazinete de versant; 25-100%. | Regosoluri (1,2) |
| 6. Versanți și bazinete cu alunecări de teren și izvoare de coastă; 5-35%. | Regosoluri (1,2,23) Faeoziomuri (9,23) Preluvosoluri (13) Luvosoluri (16) |
| 7. Bazinete de versant (fund de vale fără luncă, glacis); 2-10%. | Aluviosoluri coluvice (8) Gleiosoluri (21) |

| | |
|---|---|
| 8. Terase; 1-2%. | Faeoziomuri (10,11) |
| 9. Lunci, conuri aluviale; 1-5%. | Aluviosoluri (3-7) Faeoziomuri (10) Gleiosoluri (21,22) |
| Predomină relieful de dealuri, rezultate din fragmentarea podișului (inițial a fost câmpie fluvio-lacustră) și luncile, însoțite local de terase. | |

Faciesul petrografic și structura monoclinală a reliefului determină aspectul și formele de relief.

Relieful dezvoltat pe nisipuri ± cimentate (domină în teritoriu) și gresii, are versanți rectilini cu pante mari (de tip cuestă), glacisuri coluviale și culmi înguste.

Relieful format pe marne și argile este mai evoluat cu fragmentare și energie redusă, cu versanți și moderat înclinați (suprafețe structurale, paralele cu înclinarea stratelor) ± alunecări de teren, culmi larg văi largi mlăștinoase.

Alunecările de teren sunt frecvente pe versanții cu alternanțe de nisipuri, argile și marne, cu izvoare coastă, cu faeoziomuri și regosoluri dominant. Sunt sub forma valurilor, treptelor și prăbușirilor de mal, active, semistabilizate (domină) și stabilizate (pe suprafețele structurale).

Alunecările consecvente (pe suprafețe structurale; se deplasează pe orizontală, fără deformări și la distanțe mari.

Alunecările insecvente (pe capete de strat, cueste) se deplasează pe verticală, cu deformări mari, la distanțe reduse și sunt frecvent active.

În teritoriu domină versanții cu alunecări de teren, cu faeoziomuri și regosoluri, culmile foarte largi (platouri) cu luvosoluri și lunci cu aluviosoluri.

3.2 Geologia

Formațiunile geologice din teritoriul studiat sunt:

| | |
|------------------|-------------|
| Roci și depozite | Soluri (US) |
|------------------|-------------|

| | |
|--|---|
| 1. Depozite sedimentare sarmațiene (argile, marne, nisipuri cu intercalații de gresii, pietrișuri, conglomerate și tufuri vulcanice) la vest de râul Visa și la sud de pârâul Calva. | Regosoluri (1,2,23) Preluvosoluri (12-14) Luvosoluri (15-19) Faeoziomuri (9,23) Stagnosoluri (20) |
| 2. Depozite sedimentare pannoniene (marne, nisipuri, marnocalcare, tufuri, intercalații de gresii) domină în teritoriu. | Gleiosoluri (21) |
| 3. Depozite fluviale cuaternare (pleistocene pe terase și holocene pe lunci): nisipuri, pietrișuri, luturi, argile ± carbonați. | Aluviosoluri (3-8) Faeoziomuri (10,11) Gleiosoluri (21,22) |

Solurile din teritoriul studiat s-au format pe materiale parentale (depozite de suprafață) cuaternare (eluviale, deluviale, coluviale, fluviale, grosiere-fine, ± schelet).

Sub aspect geochemic sunt materiale dominant carbonatice pe care s-au format subtipurile calcarice ale regosolurilor, aluviosolurilor, faeoziomurilor și gleiosolurilor.

3.3. Hidrografia și hidrologia

Rețeaua hidrografică a teritoriului aparține bazinului râului Mureș.

Rețeaua hidrografică permanentă: Visa (14 km, afluent al Târnavei Mari) și afluenții săi: Calva (20 l Valea Mare (9 km), Petiș (18 km), Meghindoala 12 km), Ștenea (8 km), cu debit permanent.

Scurgerea medie lichidă: 1-2 l/s/km², aluviuni în suspensie 0,5 t/ha/an.

Apele sunt bicarbonatate, cu mineralizare de 200-1000 mg/l săruri.

Izvoare cu debit permanent: la contactul versanților cu lunca. Apele sunt bicarbonatate, cu pH 7-8 și duritate 8-16° G.

Apele pedofratice se găsesc la adâncimi: 0-1 m în lunci și văi fără luncă, cu gleiosoluri; 1-2 m în lur cu aluviosoluri gleizate puternic sau cu textura grosieră; 2-3 m în lunci, conuri aluviale, terase, cu aluviosoluri și faeoziomuri aluviale; 3-5 m pe terase, glacisuri, văi fără luncă cu aluviosoluri coluviale și faeoziomuri aluviale; la peste 5 (10) m pe dealurile podișului cu regosoluri, faeoziomuri, preluvosoluri și luvosoluri. Pe versanții cu alunecări de teren sunt izvoare de coastă cu gleiosoluri și stufăriș.

Drenajul global al solurilor: foarte slab la gleiosoluri și stagnosoluri; slab-imperfect la faeoziomuri, preluvosoluri și luvosoluri pe pante sub 12%, aluviosoluri gleizate; moderat-bun la aluviosoluri, faeozio aluvice; intens-excesiv la regosoluri și aluviosoluri cu textura grosieră.

Inundabilitatea este foarte frecventă (<1 an) în luncile neîndiguite, în microdepresiunile din luncă; frecventă (2-5 ani) pe afluenții văilor mari și rară (>5 ani) pe Visa, Calva și Petiș.

Regularizarea văilor se va face fără subminarea bazei versantului, factor major în declanșarea alunecărilor de teren.

3.4 Clima

Teritoriul studiat se încadrează în zona temperat-continentală, cu influențe oceanice din vest, iar pedoclimatic în zona III- răcoroasă-umedă.

Au fost delimitate următoarele microzone pedogeoclimatice: III O-FZ și III D-LV

Caracterizare climatică (Atlasul RSR, 1974)

| Arealul climatic omogen | 3 | 4 |
|--|-----------------------|--------------------------|
| Microzona pedogeoclimatică | III O-FZ | III D-LV |
| Relief | Podiș slab fragmentat | Podiș moderat fragmentat |
| Altitudine (m) | 320-400 | 325-600 |
| Solul dominant | Faeoziom | Luvosol |
| Temperatura medie anuală (°C) | 8-9 | 7-8 |
| T medie luna I (°C) | -3.....-4 | -3.....-4 |
| T medie luna VII (°C) | 18-20 | 18-19 |
| Suma anuală a $T \geq 0^{\circ}\text{C}$ | 3000-3250 | 2750-3000 |
| Suma anuală a $T \geq 10^{\circ}\text{C}$ | 2500-2750 | 2250-2500 |
| Nr.zile fără îngheț ($T \geq 0^{\circ}\text{C}$) | 280-290 | 260-270 |
| Nr.zile cu $T \leq 0^{\circ}\text{C}$ | 75-85 | 95-105 |

| | | |
|---|-------------------------|---------|
| Precipitații medii anuale (mm) | 600-700 | 600-700 |
| Precipitații medii V – VIII (mm) | 300-350 | 300-350 |
| Număr de zile cu precipitații $\geq 0,1$ mm | 135-145 | 135-145 |
| Număr zile cu zăpadă | 50-60 | 60-75 |
| Umiditatea atmosferică % | 79 | 80 |
| Nebulozitatea (zile acoperite) | 120 | 120 |
| Frecvența vântului (%) | V 20; NE 12; NV 10; E 8 | |
| Viteza vântului (m/s) | 2-3 | 2-3 |

Stația meteo Sibiu 443 m; 25 km Vest; Mediaș 350 m; 26 km NV.

| Elemente | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Anual |
|-----------------------------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|------|-------|
| Temperatura (°C) Sibiu | -4,1 | 0,7 | 3,8 | 9,5 | 14,1 | 17,2 | 18,5 | 17,9 | 14,3 | 8,9 | 4,4 | -1,3 | 8,5 |
| Precipitații (mm) Sibiu | 27 | 26 | 32 | 52 | 77 | 98 | 89 | 67 | 55 | 41 | 33 | 31 | 628 |
| Temperatura (°C) Mediaș | -4,1 | -1,3 | 3,8 | 9,5 | 14,7 | 17,6 | 19,2 | 18,5 | 14,5 | 9,3 | 3,6 | -1,0 | 8,7 |
| Precipitații (mm) Mediaș | 27 | 23 | 27 | 53 | 76 | 99 | 84 | 80 | 49 | 44 | 33 | 30 | 625 |

Relieful, panta și expoziția, diversifică climatul zonal în topoclimate cu \pm de căldură și/sau umezeală care stau la baza delimitării teritoriilor ecologic omogene (TEO, UT).

Topoclimate principale:

- lunca și terasele văilor Visa, Calva și Petiș în microzona III O-FZ;
- lunca și terasele văilor Visa, Calva și Petiș în microzona III D-LV;
- culmi foarte largi (platouri) (III D-LV);
- versanți umbriți moderat înclinați cu luvisoluri;
- versanți însoriți, puternic înclinați cu regosoluri.

Podișul Târnavelor are un climat de dealuri înalte, influențat de masele de aer din vest (cald și ume de altitudine și de topoclimat. Temperatura scade iar precipitațiile cresc de la vest spre est și cu altitudinea.

Pe văi și pe depresiuni (III O-FZ) verile sunt mai calde, iernile mai reci, cu inversiuni termice, cu cea primăvara și toamna.

Culmile înalte barează aerul cald de pe valea Târnavei. Ploile de vară torențiale activează eroziune alunecările de teren.

CAP. 4. VEGETAȚIA

Teritoriul studiat se încadrează geobotanic în:

| Zona, subzona, etajul, subetajul | Altitudine (m) | Temperatura medie anuală (°C) | Precipitații medii anuale (mm) |
|---|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Zona nemorală, subzona pădurilor de stejari mezofili: Podișurile Secaș și Hârtibaciu. | 320-400 | 8-9 | 600-700 |
| Etajul nemoral, subetajul pădurilor de gorun și de amestec cu gorun (fag, carpen s.a): Podișul Hârtibaciului. | 400-600 | 7-8 | 600-700 |
| Vegetație intrazonală din lunci și depresiuni. | 320-400 | 7-9 | 600-700 |

Tipurile principale de pajiști în teritoriul studiat:

| Tip de pajiște | Productivitate | | | Soluri (US) |
|---|----------------|-------|------|--|
| | clasa | VP | MV | |
| <u>Stejari mezofili</u> 1. Festuca rupicola-Agrostis capillaris (mezofil). | V-VII | 25-50 | 4-10 | Faeoziom (9,23) Preluvosol (12-14) Luvosol (15-17) |
| Subtipuri | | | | |
| 1.1. Festuca pratensis: soluri reavânjilave. | III-VI | 25-75 | 7-15 | Faeoziom (9,23) |
| 1.2. Festuca rubra: versanți umbriți | VI-VII | 25-50 | 5-10 | Preluvosol (12-14) Luvosol (15-17) |
| 1.3. Botriochloa ischaemum: versanți stepizați, degradați. (xerofil). | VIII-IX | 5-25 | 1-5 | Regosol (1,2,23) |
| <u>Gorun</u> 2. Agrostis capillaris-Festuca rupicola (mezoxerofil). | IV-VII | 25-50 | 5-15 | Faeoziom (9,23) Preluvosol (12-14) Luvosol (15-19) |
| Subtipuri | | | | |
| 2.1. Nardus stricta: soluri acide. | VIII | 5-25 | 3-5 | Luvosol (15,18,19) |
| 2.2. Festuca rubra: versanți umbriți. | VI-VII | 25-50 | 5-10 | Preluvosol (12-14) Luvosol (15-17) |
| 2.3. Festuca pratensis: soluri reavânjilave. | III-VI | 25-75 | 7-15 | Faeoziom (9,23) |
| 2.4. Brachypodium pinnatum: soluri erodate. | IX | 5-25 | 1-3 | Regosol (1,3,23) |
| 3. Agrostis capillaris-Poa pratensis (mezofil). | V-VII | 25-50 | 5-12 | Faeoziom (9-23) |
| 4. Botriochloa ischaemum: versanți stepizați, degradați | VIII-IX | 5-25 | 1-5 | Regosol (1,2,23) |

| <u>Vegetație intrazonală</u> | | | | |
|--|---------|--------|-------|----------------------|
| 5. <i>Agrostis stolonifera</i> - <i>Agropyron repens</i> pe lunci, conuri aluviale, glacisuri | V-VI | 25-65 | 7-12 | Aluviosol (3-8) |
| 6. <i>Festuca pratensis</i> - <i>Poa pratensis</i> | II-V | 50-90 | 6-12 | Faeoziom aluvic (10) |
| 7. <i>Arrhenatherum elatius</i> - <i>Dactylis glomerata</i> | II-IV | 50-100 | 13-20 | Faeoziom aluvic (11) |
| 8. <i>Juncus effusus</i> - <i>Molinia coerulea</i> | VIII-IX | 5-20 | 1-5 | Stagnosol (20) |
| 9. <i>Agrostis canina</i> - <i>Phragmites australis</i> | IX-X | 0-15 | 1-50 | Gleiosol (21,22) |

Clasa de calitate: VP: valoarea pastorală; MV: masă verde (t/ha/an).

| Scara de apreciere economică | Foarte bună | Bună | Medie | Slabă | Foarte slabă improprie |
|--|-------------|-------|--------|---------|------------------------|
| Clasa de calitate | I-II-III | IV-V | VI-VII | VIII | IX-X |
| Valoare pastorală (VP) | 75-100 | 50-75 | 25-50 | 5-25 | 0-5 |
| Masă verde (t/ha /an) | 15-30 | 10-15 | 5-10 | 3-5 | < 3 |
| Proteină digestibilă (PD%) | 9-11 | 7-9 | 6-7 | 4-6 | < 4 |
| Unități nutritive (UN%) | 80-97 | 60-80 | 50-60 | 39-50 | < 39 |
| Unități viță mare (UVM) | > 1,4 | 1-1,4 | 0,6-1 | 0,4-0,6 | < 0,4 |
| Substanța uscată (SU): $MV \times 0,2-0,3$ | | | | | |

Majoritatea pajiștilor sunt de calitate mijlocie-slabă, deși condițiile ecopedologie sunt mijlocii-bune, aluviosoluri, faeoziomuri și argiluvisoluri.

Pajiștile de *Festuca rupicola*, sunt pe versanți cu pante până la 50% și pe toate expozițiile până la altitudinea de 400 m, iar între 400 și 600 (800) nu se dezvoltă pe versanți înșoriți (S, SV) și se asociază *Agrostis capillaris*.

Pajiștile de Agrostis capillaris, ocupă cele mai mari suprafețe, se asociază cu *Festuca rupicola* în stațiuni stepizate și cu diverse specii mezofile (*Festuca pratensis*, *Lolium perenne*, *Poa pratensis* s.a) în stațiuni mai umede și mai reci. Productivitatea pajiștilor de *Agrostis capillaris* este mai mare cantitativ calitativ decât cea de *Festuca rupicola*.

Pajiștile din Șeica Mare se pot grupa în 6 areale geofitopedologice principale:

1. Culmi largi (platouri), cu *Nardus stricta*, pe luvosoluri, asociate cu stagnosoluri.
2. Versanți, cu *Festuca rupicola* dominantă sau *Agrostis capillaris* dominantă, pe faeoziomuri, preluvosoluri și luvosoluri.
3. Versanți, cu *Botriochloa ischaemum*, pe regosoluri.
4. Terasse, cu *Festuca pratensis* sau *Arrhenatherum alatum*, pe faeoziomuri aluviale.
5. Lunci, conuri aluviale cu *Agrostis stolonifera*, pe aluviosoluri.
6. Lunci, cu *Agrostis canina*, pe gleiosoluri.

4.2 TIPURI DE PAJIȘTI. DESCRIEREA TIPURILOR

Descrierea unor tipuri de pajiști caracteristice arealului studiat în comuna Șeica Mare:

• **Pajiștile de *Agrostis capillaris* (*A. tenuis*) (iarba-câmpului)**

Răspândire și ecologie - ocupă cele mai mari suprafețe în zona de deal și cea montană inferioară, începând de la altitudinea de 200 - 300 m până la peste 1.200 m, din subzona stejarilor și gorunului până în subetajul fagului și al amestecurilor de fag cu rășinoase. În teritoriu se disting pajiști de *Agrostis capillaris* de productivitate bună pe terenuri plane sau ușor înclinate cu soluri mai bogate și pajiști cu productivitate mijlocie pe terenuri cu înclinație mare și expoziții însoțite pe soluri mai sărace acide. *Agrostis capillaris* este o graminee valoroasă din punct de vedere furajer, cu grad ridicat de consumabilitate.

Soluri - brune argiloiluviale, brune luvice, luvisoluri albice, brune eumezobazice cu reacție slab acidă până la neutre pentru pajiștile mai bune și puternic acide pentru cele de productivitate mijlocie.

Vegetația are în componență numeroase specii cu valoare furajeră ridicată, dar și specii nevaloroase, dăunătoare și toxice. Adesea, aceste pajiști sunt invadate și de vegetație lemnoasă dăunătoare, ca: păducelul (*Crataegus monogyna*), porumbarul (*Prunus spinosa*), măceșul (*Rosa canina*), în zone mai uscate și alunul (*Corylus avellana*), carpenul (*Carpinus betulus*), mestecănul (*Betula pendula*) în zone mai umede.

Valoarea pastorală a pajiștilor de *Agrostis capillaris* este bună, ajungând la o producție de 10-15 t/ha MV și o capacitate de pășunat de 1,0-1,2 UVM/ha.

A doua categorie de pajiști de acest tip, cu productivitate mijlocie, are o valoare pastorală mijlocie cu 5,0-7,5 t/ha MV și o capacitate de pășunat de 0,5-0,8 UVM/ha.

• **Pajiștile de *Festuca rupicola* (*F. sulcata*) (păiuș de silvostepă)**

Răspândire și ecologie - în arealul pădurilor de stejar pedunculat din Podișul Transilvaniei în subzona pădurilor de cer și gârniță din Dealurile Vestice până la cca 600 m altitudine, pe versanți slab până la moderat înclinați, pe toate expozițiile la altitudini mai joase și numai însoțite la altitudini mai mari.

Soluri - predominante sunt cernoziomuri cambice, soluri cenușii, brune argiloiluviale, rendzine, regosoluri, erodisoluri.

Vegetația este dominată de numeroase specii nevaloroase, dăunătoare și toxice (alior, scaieți, pelin, etc.), care diminuează mult calitatea acestor pajiști.

Valoarea pastorală și productivitatea este slabă-mijlocie, cu o producție de 3,5-6 t/ha MV și o capacitate de pășunat de 0,4-0,6 UVM/ha.

● **Pajiștile degradate de *Botriochloa ischaemum* (bărboasă)**

Răspândire și ecologie - cele mai răspândite tipuri de pajiști derivate din cele de *Festuca valesiaca* și *Festuca rupicola*, ca efect al pășunatului abuziv, nerațional și al eroziunii solului, din Podișul Moldovei, Depresiunea Transilvaniei, Podișul Dobrogei cât și al unor enclave din Dealurile Olteniei și Banatului. *Botriochloa ischaemum* este o specie oligotrofă, xerofită din zona de stepă până în subetajul gorunului și chiar al fagului, pe coastele înșorite, moderat până la foarte puternic înclinate, cu grade diferite de eroziune ale solului.

Soluri - dominante - regosolurile, solurile brune argiloiluviale, brune luvice și luvisoluri albice.

Vegetația acestui tip de pajiște derivată este frecvent invadată de buruieni, specii dăunătoare și toxice (alior, lumânărică, scaieți, pelin, pojarniță, etc.).

Valoarea pastorală și productivitatea este foarte slabă, cu producții de 1,5-5 t/ha MV, în funcție de intensitatea degradării, cu o capacitate de pășunat în jur de 0,3-0,4 UVM/ha.

4.3 DESCRIEREA VEGETAȚIEI LEMNOASE

Pe teritoriul pășunilor se găsesc doar arbuști izolați, de diferite dimensiuni, din speciile *Crataegus monogyna* (Păducel), *Prunus spinosa* (Porumbar), *Rosa canina* (Măceș). Păducel și porumbar se află pe suprafața unor pășuni și sub formă de pâlcuri răzlețe de dimensiuni mai mici (20 - 30 cm h), roase de animale, cu diferite întinderi dar și rare exemplare de păducel de 2 - 3 m. Mai ales în zonele cu pârâuri seci sau cu mici izvoare, cresc și rare exemplare de *Prunus cerasifera* (Corcoduș), *Salix caprea* (Salcie), iar pe unele zone mai nisipoase crește în pâlcuri mici *Robinia pseudoaccacia* (Salcâm).

Pe liziera pădurilor din vecinătatea unor parcele există tendința de înaintare a vegetației forestiere pe suprafața pășunilor.

CAP. 5. CADRUL DE AMENAJARE

5.1 PROCEDEE DE CULEGERE A DATELOR DIN TEREN

Datele pedologice au fost recoltate, identificate și prelucrate de către specialiștii OSPA Sibiu, care au întocmit și Studiul pedologic.

Datele pratologice, descrierea caracteristicilor geografice, climatic, descrierea parcelară, cadrul de amenajare, propunerile de organizare, îmbunătățire și dotare a pajiștilor au fost culese și elaborate de către specialiști din cadrul Direcției Agricole a județului Sibiu,

5.2 OBIECTIVE SOCIAL – ECONOMICE ȘI ECOLOGICE

Principalul obiectiv al acestui studiu îl reprezintă viabilitatea pajiștilor, atât din punct de vedere al valorii culturale a speciilor de plante cuprinse în compoziția floristică, cât și din punct de vedere economic.

Este importantă implementarea unui program de gestionare în condiții corespunzătoare a pajiștilor permanente și exploatarea rațională a pajiștilor după o concepție științifică de amenajament pastoral.

Se urmărește asigurarea și sporirea capacității de pășunat a pajiștilor, menținerea speciilor valoroase, precum și punerea în practică a măsurilor de protecție antierozională.

Prin asigurarea dezvoltării sectorului zootehnic cu acces la sursă de hrană ieftină și de calitate, se pot crea oportunități de dezvoltare a producției, implicit a mediului de afaceri, prin creșterea competitivității activităților agricole, deci și oportunități de noi locuri de muncă în mediul rural.

Respectarea bunelor condiții agricole și de mediu, cu standardele pentru protecția mediului și pentru menținerea suprafețelor de pajiști, prin menținerea, întreținerea și utilizarea lor în condiții de păstrare a compoziției floristice, asigură și îmbunătățirea structurii și fertilității solului, conservarea biodiversității floristice, a calității și valorii nutritive și energetice a furajului.

5.3 STABILIREA CATEGORIILOR DE FOLOSINȚĂ A PAJIȘTILOR

Principalele categorii de folosință a pajiștilor permanente care fac obiectul prezentului amenajament pastoral sunt **Pășune** – pe cea mai mare suprafață și **Fâneată**. Pe suprafețe mici sunt utilizate și terenuri clasificate ca Neproductive, care nu prezintă grad mare de degradare și mai pot fi îmbunătățite prin curățarea vegetației lemnoase mici, fertilizare și reînsămânțare.

Unele suprafețe, care inițial aveau categoria de folosință Arabil, nu au mai fost incluse într-un sistem de rotație a culturilor cel puțin în ultimii 5 ani și sunt utilizate pentru pășunatul animalelor.

O parte din pajiști sunt pășunate de taurinele din localitățile UAT-ului, iar altă parte de ovine.

Factori limitativi în majoritatea pajiștilor sunt reprezentați de factori naturali (eroziuni eoliene, alunecări în trepte mici), mai ales în zonele din jurul pâraurilor seci sau active, suprapășunatul, accesul la pășune (cărări bătătorite și numeroase în unele zone) mai ales pe zonele cu pantă mai mare, starea precară a aducțiunilor de apă din izvoare și a adăpătorilor.

5.4 FUNDAMENTAREA AMENAJAMENTULUI PASTORAL

Pajiștile permanente reprezintă cea mai importantă sursă de furaj pentru animale în timpul perioadei de vegetație, iar hrănirea animalelor pe pășune are numeroase efecte pozitive. Animalele astfel crescute prezintă indici sangvini superiori și nu manifestă simptome de rahitism. Mișcarea permanentă în aer liber și expunerea la razele solare determină o mai bună asimilare a calciului și fosforului, dezvoltarea sistemului osos, a masei musculare, și în general, fortificarea organismului. Animalele devin mai rezistente la boli și capabile de producții sporite.

Din punct de vedere economic, pășunatul pe o pajiște cu specii valoroase reprezintă cel mai rentabil sistem de întreținere al animalelor, eliminându-se costurile cu recoltarea, transportul și depozitarea furajelor.

Fundamentarea amenajamentului pastoral constă în soluțiile tehnologice și tehnice care asigură realizarea obiectivelor privind gospodărirea rațională a suprafețelor de pajiști din cadrul proiectului și care oferă condiții favorabile creșterii speciilor valoroase, cu un grad ridicat de consumabilitate și o mare valoare nutritivă. Masa verde, de pe pajiștile cu compoziție floristică valoroasă, conține 2 - 3% proteine brute (10 – 12% din s.u.) și 0,14 – 0,25 unități nutritive. (Osiceanu M., Ionescu I., 2009)

Amenajamentul pastoral trebuie să respecte codul de bune practici agricole și să fie în concordanță cu condițiile pedoclimatice ale arealului unde se află amplasată pajiștea.

În scopul protejării acestor ecosisteme naturale și a biodiversității lor deosebite sunt necesare următoarele măsuri:

- a nu se efectua fertilizări sau alte lucrări de întreținere în pajiști și fânețe naturale, în perioada înfloririi plantelor;
- a nu se efectua lucrări când solul este prea umed pentru a nu determina apariția proceselor degradării solului prin compactare excesivă, cu numeroase consecințe negative și asupra organismelor care trăiesc în sol;
- a se salva și proteja arborii mari solitari și arbuștii existenți, deoarece asigură hrană și adăpost viețuitoarelor sălbatice;
- a proteja pășunile naturale; se vor cosi doar dacă este necesar și în nici un caz nu se vor ara; pășunile degradate se vor însămânța în solul nearat utilizând semănători dotate cu brăzdare adecvate;
- a se lăsa, prin rotație, suprafețe necosite pe pajiști și fânețe; este indicat să se facă parcelări, și la 3-4 ani o parcelă să fie lasată necosită, pentru reînsămânțarea naturală completă;
- cosire manuală unde terenul are stare de umiditate ridicată și, mai ales în luncile inundabile, unde este practic imposibilă utilizarea mașinilor agricole;
- eliminarea pășunatului pe pășunile îmbătrânite, degradate, pe cele proaspăt însămânțate în scopul regenerării; pășunatul nu se practică în păduri, pe coastele dealurilor acoperite cu arbuști sau altă vegetație specifică, în zone protejate din jurul lacurilor și râurilor, chiar dacă acest lucru nu este economic;
- pășunatul se va practica cu număr redus de animale, în special de oi, pe coastele dealurilor, pe pantele malurilor lacurilor și râurilor, în zonele nisipoase sau cu soluri calcaroase;
- suprapășunatul este interzis; este necesar să se asigure un raport optim între numărul de animale, suprafața și calitatea pașunii;
- este necesar ca vara, la stâne, locul pentru muls și înoptare a animalelor să fie schimbat la 3-4 zile, pentru a evita supraîngrășarea terenului și pentru a se asigura îngrășarea uniformă (târlire) ;
- pe fâneță, primavara, imediat după topirea zapezii, balegarul bine putrezit se va împrăști în strat cât mai uniform; odată cu această operație se poate realiza și supraînsămânțarea cu semințe din specii de leguminoase sau graminee valoroase, cu recomandare specială pentru trifoiul alb, încorporate în masa de fertilizant natural ;

- Îngrășarea pașunilor și fânețelor se va face numai cu îngrășăminte organice naturale și se va face în fiecare an; pentru a evita acidificarea solului și pentru a evita fenomenul de sălbăticiune a florei (acest fenomen este prezent numai la munte), ciclul varat – iernat nu trebuie întrerupt, se va practica o încărcătură echilibrată de animale la hectar ;
- pentru fertilizare se va evita folosirea bălegarului care conține rumeguș utilizat ca așternut pentru animale datorită acidității pe care acesta o determină;
- În cazul cositului mecanizat, să se evite rănirea animalelor și păsărilor, care adesea, se ascund în zonele necosite, prin începerea cositului de la mijlocul câmpului spre margini și prin dotarea utilajelor cu dispozitive de alarmă.

5.4.1 Durata sezonului de pășunat

Declanșarea pășunatului rațional primăvara are o mare importanță pentru menținerea productivității pajiștii și pentru sănătatea și producția animalelor. De aceea se va ține cont de producția pajiștii, de înălțimea plantelor și starea solului (Osiceanu M., Ionescu I., 2009).

Momentul începerii pășunatului rațional:

- Înălțimea covorului ierbos este de 8 – 15 cm pe pajiștile naturale și 12–20 cm pe pajiștile semănate;
- Înălțimea apex-ului (conul de creștere al spicului la graminee) este de 6 – 10 cm;
- producția de masă verde, denumită în continuare MV, ajunge la 3 - 5 t/ha pe pajiștile naturale și 5 – 7,5 t/ha pe pajiștile semănate sau echivalent în substanță uscată 0,6 – 1 t/ha și 1– 1,5 t/ha SU;
- înflorirea păpădiei (*Taraxacum officinalis*) în primăvară, care este un adevărat fitotermometru;
- după 23 aprilie (Sf. Gheorghe) respectat de crescătorii de animale din țara noastră.

Durata sezonului de pășunat este determinată în primul rând de durata perioadei de vegetație:

- câmpie: 190 – 210 zile la irigat (aprilie – octombrie) sau 100 – 150 zile la neirigat;
- dealuri: **140 – 180 zile** (mai – septembrie);

Când pășunatul este organizat pe parcele, se recomandă să nu se depășească o perioadă de 6 zile pe aceeași parcelă, pentru a favoriza procesul de otăvire, pentru a nu se bătători solul și a micșora pericolul îmbolnăvirii animalelor cu paraziți intestinali, care după primele zile trec în stadiul de invazie.

Ținând cont de caracteristicile climei în zona colinară a UAT- ului Șeica Mare, **durata sezonului de pășunat este de cca 180 zile, din a doua decadă a lunii aprilie, până în a doua decadă a lunii octombrie, depinde și de specificul vremii în fiecare an.**

Modul de organizare a pășunatului se stabilește prin hotărâre a Consiliului local (art. 6 lit. 4 din Ordinul nr. 544/2013).

Încetarea pășunatului se face cu 3 – 4 săptămâni (20 – 30 zile) înainte de apariția înghețurilor permanente la sol sau, de Sf. Dumitru (26 octombrie).

5.4.2 Numărul ciclurilor de pășunat

Ciclul de pășunat este intervalul de timp în care iarba de pe aceeași parcelă de exploatare, odată pășunată, se regenerează și devine din nou bună pentru pășunat.

Numărul ciclurilor de pășunat este în funcție de condițiile climatice și staționale de sol, de compoziția floristică și de capacitatea de regenerare a pajiștilor.

În zona montană, de la 600 – 800 m altitudine durata optimă a sezonului de pășunat care este de 160 zile, scade cu cca 7,5 zile cu fiecare 100 m altitudine, ajungând la 2200 – 2400 m, la numai 40 de zile. Pe pășuniile pe cele de deal 3 – 5 cicluri de pășunat și la câmpie 2 - 3 cicluri în condiții de neirigare și de 5 - 7 cicluri (rotații) de pășunat în condiții de irigare.

5.4.3 Fânețele

Suprafețele ce nu se pășunează și se utilizează pentru producerea de fân, se vor cosi în momentul optim pentru a asigura cantitatea maximă de nutrienți, cu excepția celor care sunt sub angajamente.

5.4.4 Capacitatea de pășunat

Stabilirea capacității de pășunat se va face prin împărțirea producției totale de masă verde cu rația necesară unei unități vită mare.

Se recomandă 65 kg masă verde / zi / cap pentru 1 UVM (din care consumate efectiv 50 Kg / cap / zi).

Conversia în UVM a speciilor de animale:

Tabelul 5.1

| Categoria de animale | Coeficientul de conversie | Capete/UVM |
|--|---------------------------|------------|
| Tauri, vaci și alte bovine de mai mult de 2 ani, ecvidee de mai mult de 6 luni | 1,0 | 1,0 |
| Bovine între 6 luni și 2 ani | 0,6 | 1,6 |
| Bovine de mai puțin de 6 luni | 0,4 | 2,5 |
| Ovine | 0,15 | 6,6 |
| Caprine | 0,15 | 6,6 |

Producția totală de iarbă (Pt) s-a determinat prin **Metoda pratologică**, prin aprecierea participării procentuale în biomasă (P) a componentelor botanice pe grupe economice: graminee, leguminoase, ciperacee și juncacee, alte familii, mușchi și licheni, specii lemnoase.

Producția și calitatea principalelor categorii de pajiști:

| Cod | Categoria de pajiște | Producția de iarbă (t/ha) | Calitatea furajeră |
|-----|---|---------------------------|---------------------|
| I | Reînsămânțate, fertilizate intensiv, amendate, după caz, din zone umede și cu condiții de irigare | 30-50 | Foarte bună |
| II | Reînsămânțate, fertilizate la nivel mediu, amendate, după caz, din zone umede, neirigate | 25-35 | Foarte bună Bună |
| III | Supraînsămânțate, amendate, după caz, fertilizate la nivel mediu din zone mai uscate, neirigate | 12-25 | Bună Mijlocie |

| | | | |
|----|---|------|--------------------|
| IV | Pajiști cu specii cu valoare medie, fertilizate sporadic cu îngrășăminte naturale și chimice, parțial îmbunătățite | 6-15 | Mijlocie Slabă |
| V | Pajiști cu specii cu valoare medie și slabe furajere, neîmbunătățite | 3-10 | Slabă Foarte slabă |
| VI | Pajiști îmburuienate, invadate cu vegetație arbustivă, soluri erodate, exces de umiditate și alte degradări ale solului și vegetației | 1-5 | Foarte slabă |

Capacitatea de pășunat (Cp) se va determina în fiecare sezon de pășunat utilizând formula:

$$Cp \text{ (UVM/ha)} = \frac{Pt \text{ (kg/ha)} \times Cf \%}{Nz \times DZP \times 100}$$

În care: Pt = producția totală de iarbă;

Cp = capacitatea de pășunat;

Nz = necesarul zilnic de iarbă pe cap de animal, în Kg/zi;

DZP = numărul zilelor sezonului de pășunat;

Cf = coeficient de folosire a pajiștii, în %.

Coeficientul de folosire exprimat în procente se stabilește prin cosirea și cântărirea resturilor neconsumate (Rn) pe 5 – 10 m², după scoaterea animalelor din tarla și raportarea ei la producția totală după formula:

$$Cf = \frac{Pt \text{ (kg/ha)} - Rn \text{ (kg/ha)}}{Pt \text{ (kg/ha)}} \times 100, \text{ în \%}$$

În care: Pt = producția totală de iarbă;

RN = resturi neconsumate.

O altă metodă este bazată pe determinarea valorii pastorale care se înmulțește cu coeficientul 0,02 respectiv o pajiște cu valoarea pastorală maximă de 100 poate întreține 2 UVM pe hectar / an.

Capacitatea de pășunat în acest caz se determină după formula:

$$CP = VP \times C \text{ (UVM/ha)}$$

În care: VP = indicator valoare pastorală

C = coeficient de capacitate variabil în funcție de altitudine

Pe pășuni se calculează încărcarea posibilă cu animale în funcție de nivelul de fertilizare a pajiștii, durata de pășunat și alte criterii. Determinarea corectă a încărcării cu animale a unei pășuni este deosebit de importantă pentru menținerea producției și calității covorului ierbos. Supraîncărcarea ca și subîncărcarea unei pășuni au influențe negative, greu de îndreptat ulterior.

Producția de iarbă și încărcarea cu animale exprimată în unități vită mare (UVM) la hectar a principalelor tipuri de pajiști din România:

| Tipul de pajiște | Producția de iarbă (t/ha) | Încărcarea cu animale UVM/ha |
|---|---------------------------|------------------------------|
| Pajiști zonale | | |
| a) Festuca valesiaca (păiuș stepic) | 3,0 - 5,0 | 0,3 - 0,5 |
| b) Festuca rupicola (păiuș de deal) | 3,5 - 6,0 | 0,4 - 0,6 |
| c) Botriochloa ischaemum (bărboasă) | 1,5 - 5,0 | 0,3 - 0,4 |
| d) Poa pratensis angustifolia (firuța) | 7,5 - 12,5 | 1,0 - 1,5 |
| e) Agrostis capillaris (iarba-vântului) | 5,0 - 15,0 | 0,5 - 1,2 |
| f) Festuca rubra (păiuș roșu) | 5,0 - 15,0 | 0,5 - 1,5 |
| g) Nardus stricta (țepoșică) | 3,0 - 5,0 | 0,2 - 0,5 |
| h) Festuca airoides (părușcă) | 2,0 - 4,0 | 0,2 - 0,5 |
| i) Carex curvula (coarnă) | 1,5 - 3,0 | 0,1 - 0,4 |
| Pajiști azonale | | |
| j) lunci și depresiuni | 7,5 - 20,0 | 1,0 - 2,0 |
| k) soluri saline și alcaline | 4,0 - 7,0 | 0,1 - 0,6 |
| l) soluri nisipoase și nisipuri | 1,0 - 3,0 | 0,1 - 0,2 |

Astfel, în funcție de capacitatea de pășunat, încărcarea posibilă cu animale și alte criterii locale, se face repartizarea suprafețelor pe specii și categorii de animale, ținând cont de cerințele acestora cu privire la: calitatea pajiștii (tipul pajiștii, sistemul de exploatare), etajarea altitudinală, posibilitățile de asigurare a apei de băut pentru animale, drumurile de acces, etc.

După definitivarea lucrărilor de repartizare a pajiștilor, este necesar ca acestea să fie consemnate într-un document cu următoarele mențiuni:

- denumirea trupului de pajiște repartizată și din ce corp face parte, suprafața și delimitări;
- beneficiarul pajiștii repartizate;
- capacitatea de pășunat exprimată în UVM;
- numărul pe categorii al animalelor ce vor fi admise la pășunat pe pajiștea repartizată;
- perioada de timp pentru care s-a făcut repartizarea;
- lucrările de îmbunătățire, întreținere și folosire prevăzute a se aplica pe pajiștea respectivă, în cadrul programului de punere în valoare;
- sarcinile concrete ce revin beneficiarilor cu privire la lucrările ce trebuie să le aplice pe pajiștea repartizată în cursul anului pe date calendaristice.

(Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov - Ghid de întocmire a amenajamentelor pastorale – 2014).

CAP. 6. ORGANIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA, DOTAREA ȘI FOLOSIREA PAJIȘTILOR

6.1 LUCRĂRI DE REPUNERE ÎN VALOARE A SUPRAFETELOR DE PAJIȘTI

Lucrările propuse vor fi în conformitate cu metodologia și respectarea bunelor condiții agricole și de mediu, denumite în continuare GAEC și a celor care sunt sub angajament (declarat la APIA etc.).

Principalele măsuri de creștere cantitativă și calitativă a producției pajiștilor se bazează pe înlăturarea sau diminuarea efectului factorilor limitativi ai productivității acestora.

Pentru determinarea măsurilor și tehnologiilor de îmbunătățire adecvate trebuie să se stabilească în prealabil, cu exactitate, cauzele degradării pajiștii respective, deoarece aplicarea oricărei măsuri de îmbunătățire a covorului vegetal fără a se îndepărta cauzele degradării lui, conduce la unele rezultate bune, valabile doar pe termen scurt.

Măsurile ameliorative generale care se aplică pe toate pajiștile afectate de diferiți factori limitativi ai producției sunt:

- eliminarea excesului de umiditate;
- combaterea eroziunii de adâncime și alunecărilor solului;
- corectarea reacției solului (acidității, respectiv alcalinității) prin lucrări de amendare;

Măsurile de suprafață de îmbunătățire a pajiștilor cuprind:

- lucrările de întreținere a pajiștilor ce constau în curățirea de mușuroaie de orice proveniență, de vegetația ierboasă și lemnoasă nevaloroasă și de pietre, nivelarea nanoreliefului, împrăștierea dejecțiilor (rămase în urma pășunatului sau după fertilizarea organică), aerarea covorului vegetal;
- îmbunătățirea regimului de nutriție a plantelor printr-o fertilizare corespunzătoare;
- supraînsămânțarea pajiștilor.

Măsurile de refacere radicală a covorului ierbos constau în:

- curățirea de mușuroaie, de vegetația ierboasă și lemnoasă nevaloroasă și de pietre;
- distrugerea vechiului covor vegetal degradat;
- îmbunătățirea regimului de nutriție a plantelor printr-o fertilizare corespunzătoare;
- pregătirea patului germinativ;
- reînsămânțarea cu amestecuri de plante furajere productive și cu valoare furajeră ridicată;
- întreținerea pajiștii nou înființate.

Pentru realizarea unor producții mari de furaje și de o calitate corespunzătoare, covorul ierbos al pajiștilor permanente (naturale și seminaturale) și temporare (semădate) necesită a fi susținut prin **fertilizare (organică și/sau chimică)** și după caz corectarea reacției solului prin amendare. Cel mai important factor de degradare a covorului ierbos este lipsa sau excesul de elemente fertilizante din care se remarcă azotul, fosforul și potasiul (NPK).

Pentru realizarea unei tone de substanță uscată (SU) echivalentul a 4-5 tone de iarbă prin recoltă (fân sau iarbă păscută), din sol se extrag în medie 20 – 25 kg N, 2 – 3 kg P, 22 – 25 kg K și 4 – 5 kg calciu.

Prin fertilizare adecvată se pot îmbunătăți pajiștile de deal și munte cu climat mai umed care sunt dominate de *Nardus stricta* (țapoșică, părul porcului) ce pot deveni pajiști mai valoroase de *Agrostis capillaris*, *Festuca rubra*, *Alopecurus pratensis*, *Poa pratensis* și altele. De asemenea, fertilizarea în limite optime și proporție adecvată contribuie la menținerea unui echilibru între gramineele și leguminoasele perene din pajiști cât și la supraviețuirea speciilor noi introduse prin supraînsămânțare în covorul ierbos sau reînsămânțare în cazul pajiștilor semădate sau temporare.

Pentru realizarea unor producții mari de furaje și de o calitate corespunzătoare, covorul ierbos al pajiștilor permanente (naturale și seminaturale) și temporare (semădate) necesită a fi

susținut prin **fertilizare (organică și/sau chimică)** și după caz corectarea reacției solului prin amendare. Cel mai important factor de degradare a covorului ierbos este lipsa sau excesul de elemente fertilizante din care se remarcă azotul, fosforul și potasiul (NPK).

Pentru realizarea unei tone de substanță uscată (SU) echivalentul a 4-5 tone de iarbă prin recoltă (fân sau iarbă păscută), din sol se extrag în medie 20 – 25 kg N, 2 – 3 kg P, 22 – 25 kg K și 4 – 5 kg calciu.

Târlirea tradițională normală, confirmată științific, se face cu oile și anume 2 – 3 nopți 1 oaie adultă / mp pe pășuni cu covor ierbos corespunzător și 4 – 6 nopți 1 oaie / mp pe pășunile degradate, care în zona montană sunt invadate de *Nardus stricta* (părul porcului, țepoșică). Depășirea acestui prag de 6 nopți, în toate situațiile duce la supratârlire, cu întreg cortegiul de dezechilibre grave ale covorului ierbos și ale celorlalți factori de mediu.

Cercetări mai recente au dovedit că este posibil a se târli până la 50 % din suprafața atribuită unei turme de animale cu condiția aplicării unor erbicide pentru distrugerea covorului ierbos degradat, urmată de supraînsămânțare cu ierburi perene și fertilizare cu îngrășăminte chimice fosfatice. Concret, pe o pășune degradată de țepoșică se aplică 5 l/ha Roundup (glifosat), diluat în 150 litri de apă, utilizând pentru stropire o pompă de spate după care la 2 săptămâni se supraînsămânțează cu un amestec calculat pentru 1 hectar de 270 kg superfosfat (18 % P₂O₅) împreună cu 25 kg graminee (*Festuca rubra*, *Festuca pratensis*, *Phleum pratense*, *Lolium perenne*, *Dactylis glomerata*, *Agrostis capillaris* și altele) și 5 kg leguminoase perene (*Trifolium repens*, *Trifolium hybridum*, *Lotus corniculatus*, etc.), revenind 3 kg amestec complex la 100 mp, după care se efectuează o târlire redusă la numai 2 nopți 1 oaie/mp sau 1 vacă/6 mp. La fiecare stână ar trebui să existe și amestecuri complexe de ierburi perene cu îngrășăminte chimice fosfatice, păstrate în pungi de polietilenă care să fie aplicate pe târle cu 1 – 2 zile înainte de a fi mutate în alt loc.

Îngrășămintele organice sunt produse naturale care conțin elemente fertilizante (nutritive) pentru plante, în diferite proporții și cantități mari de substanțe organice, având o veche utilizare în agricultură.

Gunoii de grajd este un îngrășământ de bază folosit în agricultură, fiind alcătuit dintr-un amestec de dejecții provenite de la animale și materialul folosit ca așternut. Conținutul mediu în elemente fertilizante a acestui tip de îngrășământ este de: 0,55 % N; 0,22 % P₂O₅; 0,55 % K₂O și 0,23 % CaO. Calitatea gunoii de grajd depinde de specia de animale de la care provine, cel mai bogat în elemente fertilizante fiind gunoiul de ovine urmat de cabaline și bovine, iar cel mai sărac este cel rezultat de la porcine. Depozitarea și fermentarea gunoii de grajd se face în *platformă pentru gunoi*. Fermentarea durează 3 – 5 luni, timp în care se pierde 25 – 30% din greutatea inițială a gunoii. Gunoiul de grajd influențează favorabil însușirile fizico-chimice ale solului, mărește permeabilitatea solurilor grele și coeziunea celor nisipoase, contribuie la afânarea și încălzirea solurilor, îmbunătățește reacția solului. Este un îngrășământ universal, întrucât poate să fie administrat pe toate solurile la majoritatea plantelor cultivate și pe toate tipurile de pajiști și se aplică atât la suprafața pajiștilor naturale cu covor ierbos corespunzător, cât și prin încorporare înainte de desțelenire și înființarea pajiștilor semănate. Aplicarea gunoii de grajd bine fermentat (3 - 5 luni în platformă) la suprafața terenului, toamna târziu sau primăvara devreme în cantități de 20-30 t/ha se face frecvent pe fânețele naturale din apropierea gospodăriilor. Gunoiul de grajd este mai bine valorificat când se administrează împreună cu doze mici de îngrășăminte chimice. Efectul fertilizării cu gunoi de grajd durează în medie 3 - 5 ani.

Gunoii de păsări este un alt îngrășământ organic complet, cu acțiune rapidă. Compoziția chimică depinde de specia de păsări de la care provine fiind în medie de 1,7 % N; 1,6 % P₂O₅; 0,9 % K₂O și 2 % CaO. Pentru a evita pierderea azotului în timpul păstrării se depozitează în șoproane, în straturi subțiri și se stropește cu lapte de var. Se aplică toamna în cantitate de 1 – 1,5 t/ha sau în timpul perioadei de vegetație a pajiștilor.

Compostul este un alt îngrășământ organic solid care provine din resturile adunate în gospodărie (paie, pleavă, frunze, cenușă, gunoie menajere) ce se depistează în platformă, se umectează, se îndeasă și se lasă să fermenteze o perioadă dublă decât gunoiul de grajd, respectiv 6 – 10 luni. Odată cu umectarea din când în când se adaugă var și superfosfat. Compostul se consideră fermentat atunci când a devenit brun și sfărâmișos, după care se trece prin ciururi cu ochiuri de 1,2 – 2 cm și se administrează toamna în cantitate de 20 – 25 t/ha pe pajiștile naturale.

Aplicarea îngrășămintelor organice solide se face cu mașinile de împrăștiat gunoi de grajd și alte utilaje specifice.

Tulbureala este un îngrășământ organic semilichid care se obține de la adăposturile de taurine prevăzute cu sistem de evacuare hidraulică a dejecțiilor sau tabere de vară cu pardoseală de ciment, spălare cu jet de apă și colectare într-un bazin acoperit. În aceste bazine tulbureala formată din urină, dejecții solide și apa de spălare fermentează 3– 4 săptămâni după care se administrează folosind 200 – 400 hl/ha. Îngrășămintele semilichide bogate în azot și potasiu se aplică pe pajiștile permanente în doze de maximum 150 m³/ha, împreună cu 30 kg/ha P₂O₅, elementul nutritiv deficitar. Capacitatea bazinelor colectoare se calculează în funcție de numărul de animale considerându-se câte 7 – 8 m³ pentru o unitate vită mare. Pe pășuni din motive sanitar-veterinare, doza nu trebuie să depășească 25-30 m³/ha la o aplicare. Pășunatul este permis numai după o perioadă de 4 - 5 săptămâni pentru "sterilizarea pășunii" de agenți patogeni, sub acțiunea razelor solare.

Urina și mustul de grajd sunt îngrășăminte lichide, formate din urina animalelor, respectiv mustul care se scurge din platforma de gunoi în timpul fermentării. Aceste produse se colectează în bazinele amplasate la capătul grajdurilor și platformelor de gunoi, bazine care se acoperă, iar la suprafața lichidului se toarnă un strat de ulei rezidual gros de 3 – 5 mm, pentru a evita pierderea azotului. La urină azotul se găsește sub formă de uree, acid uric și acid hipuric. Urina și mustul de grajd sunt îngrășăminte unilaterale, fiind mai bogate în azot potasiu și sărace în fosfor și calciu. Urina conține în medie 1 – 1,5% N; 1,3 – 1,6% K₂O și 0,3% P₂O₅ iar mustul de 3 ori mai puțin din aceste substanțe nutritive. Înainte de aplicare urina sau mustul de bălegar se diluează cu cel puțin 2 ori pe atâta apă, dacă se aplică în timpul vegetației pentru a nu arde plantele. Astfel, 10 t/ha urină se diluează cu 20 – 30 t/ha apă pentru diluare rezultând 30 – 40 t/ha (~ 250 – 350 hl/ha) care se poate aplica în special pe fânețe. Urina și mustul se transportă și nediluate, în remorci - cisterne (vidanje) și după împrăștiere pe sol (100 – 150 hl/ha) se încorporează prin arătura de bază înainte de înființarea pajiștii semănată.

Introducerea îngrășămintelor fosfatice este necesară pentru completare, întrucât dejecțiile animalelor sunt mai bogate în azot și potasiu și mai sărace în fosfor, element de bază prin care se susțin în continuare leguminoasele și fixarea azotului atmosferic.

Îngrășămintele chimice - datorită resurselor insuficiente de îngrășămintele organice

pentru îmbunătățirea pajiștilor și a caracteristicilor care le au, respectiv conținut redus de

elemente fertilizante în cantități mari de material (gunoi, compost, turbureală, etc.) care măresc cheltuielile de transport și aplicare, suntem nevoiți să facem adesea apel la îngrășămintele chimice mai ușor de administrat la distanțe mari de ferma în condiții naturale mai greu accesibile.

Folosirea îngrășămintelor chimice pe pajiști a produs o adevărată revoluție verde prin sporuri

mari de producție de iarbă și calitatea furajelor, reflectate și în creșterea numărului de animale

și al producțiilor acestora la unitatea de suprafață din fermele zootehnice. Aplicarea îndelungată și în cantități mari a îngrășămintelor chimice pot avea și efecte negative cum ar fi acidifierea solului, poluarea mediului cu nitriți și nitrați, perturbarea activității microorganismelor din sol, dezechilibre de nutriție la animale, reducerea biodiversității și altele.

Exemplu: Aplicăm primăvara devreme îngrășămintele chimice complexe din formula 15 – 15 – 15, o cantitate de 330 kg/ ha produs comercial pentru asigurarea unui nivel de 50 kg/ha N și aceeași cantitate de oxizi de P și K necesare pentru întreg anul, după care în completare, imediat sau după ciclurile de recoltă se aplică numai îngrășămintele azotoase cum ar fi nitrocalcarul (21 % N) pe solurile acide, azotatul de amoniu (33,5 % N), sau ureea (46 N) pe soluri cu reacție normală și sulfatul de amoniu (20 % N) pe soluri sărăturate. (Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov, "Ghid de Întocmire a Amenejamentelor Pastorale, 2014").

Date orientative privind fertilizarea pajiștilor permanente cu îngrășămintele chimice (kg s.a./ha/an)

Tabelul 6.1

| Tipul de pajiște | N | P ₂ O ₅ | K ₂ O |
|-------------------------------|---------|-------------------------------|------------------|
| 1. <i>Festuca valesiaca</i> | 100-200 | 50-60 (20-25) | - |
| 2. <i>Festuca rupicola</i> | 100-200 | 50-60 (20-25) | 50-60 (40-50) |
| 3. <i>Agrostis capillaris</i> | | | |
| a) productive | 150-200 | 75-100 (35-45) | 75-100 (60-80) |
| b) slabe | 100-150 | 50-75 (20-35) | 50-75 (40-60) |
| 4. <i>Festuca rubra</i> | 150 | 75 (50) | 75 (60) |
| 5. <i>Nardus stricta</i> | 200 | 100 (45) | 100 (80) |
| 6. <i>Festuca airoides</i> | 100 | 50 (20) | 50 (40) |

6.2. AMESTECURI DE IERBURI RECOMANDATE PENTRU REÎNSĂMÂNȚAREA SAU SUPRAÎNSĂMÂNȚAREA PAJIȘTILOR

În marea majoritate a cazurilor parcele din zonele studiate au covorul ierbos degradat datorită lipsei de întreținere curentă (grăpat, combatere buruieni, etc.), absența sau insuficiența fertilizării cu îngrășăminte organice și chimice, cât și a folosirii neraționale prin pășunat (durată, încărcare, abandon, starea necorespunzătoare a țelinii, etc.) sau alte cauze.

Pentru reînsămânțare după refacerea totală a covorului ierbos prin diferite metode și mijloace sau supraînsămânțare pentru înlocuirea parțială sau îndesirea pajiștii este necesară alcătuirea unor amestecuri de graminee și leguminoase perene adecvate condițiilor staționale și modului de folosință preconizat. Lucrările de reînsămânțare și supraînsămânțare vor fi efectuate doar acolo unde este necesar, iar amestecul va conține specii de graminee și leguminoase perene de pajiști pretabile condițiilor staționare și modului de folosire, având în vedere și restricțiile din cadrul angajamentelor.

Regula de aur în reușita semănatului este: **tasare – semănat – tasare**. Multe din semănături nu reușesc pentru că nu se respectă această regulă.

După ce s-a hotărât ce metodă de refacere totală sau parțială se va folosi, în funcție de condițiile naturale și scopul propus, pasul următor este stabilirea unui amestec de graminee și leguminoase perene de pajiști.

Denumirile științifice și cele populare ale principalelor ierburi perene cultivate la noi:

Graminee perene:

Agropyron pectiniforme – pir cristat
Bromus inermis – obsigă nearistată
Dactylis glomerata – golomăț
Festuca arundinacea – păiuș înalt
Festuca pratensis – păiuș de livadă
Festuca rubra – păiuș roșu
Lolium perenne – raigras peren
Phalaris arundinacea – ierbăluță
Phleum pratense – timoftică
Poa pratensis – firuță

Leguminoase perene:

Lotus corniculatus – ghizdei
Medicago sativa – lucerna albastră
Onobrychis viicifolia – sparcetă
Trifolium hybridum – trifoi corcit
Trifolium pratense – trifoi roșu
Trifolium repens - trifoi alb

Problema alcătuirii amestecurilor de ierburi perene este extrem de complicată și dificilă în același timp.

În continuare, după alegerea amestecului de ierburi, se trece la următoarea fază de stabilire a raportului dintre graminee și leguminoase care de regulă este de 60-80 % graminee și 20-40 % leguminoase. Pentru supraînsămânțarea pajiștilor degradate cantitățile de sămânță se reduc cu 30-50 % din norma pentru pajiștile semămate.

În vederea reducerii pe cât posibil al greșelilor care se fac mai frecvent în alcătuirea amestecurilor de ierburi, vă prezentăm mai jos 10 criterii mai importante ce trebuie avute în vedere. (După - Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov, "Ghid de întocmire a Amenejamentelor Pastorale, 2014").

Structura amestecurilor de graminee și leguminoase perene pentru pajiști
(% din norma de semănat)

Tabelul 6.2

| Modul de folosință | Durata de folosință (ani) | Graminee | | | Leguminoase | | |
|--------------------|---------------------------|----------|-------------------|--------|-------------|-------------------|--------|
| | | Total | Din care de talie | | Total | Din care de talie | |
| | | | Înaltă | Scundă | | Înaltă | Scundă |
| Fâneață | 2 - 3 | 30 | 30 | - | 70 | 70 | - |
| | 4 - 6 | 60 | 60 | - | 40 | 40 | - |
| Pășune | Peste 6 | 70 | 30 | 40 | 30 | 10 | 20 |
| Mixtă | 4-6 | 60 | 50 | 10 | 40 | 30 | 10 |
| | Peste 6 | 60 | 45 | 15 | 40 | 25 | 15 |

Propunere de amestec de ierburi pentru îmbunătățirea pajiștilor studiate în comuna Șeica Mare:

- La 1 ha pajiște: *Dactylis glomerata* 10 kg + *Festuca pratensis* 8 kg + *Phleum pratense* 5 kg + *Lolium perenne* 2 kg + *Poa pratensis* 2 kg + *Trifolium repens* 3 kg.

- Pentru regosoluri, la 1 ha: *Dactylis glomerata* 5 kg + *Bromus inermis* 12 kg + *Lotus corniculatus* 5 kg + *Medicago sativa* 5 kg + *Onobrychis viciaefolia* 25 kg.

6.4. ORGANIZAREA PĂȘUNATULUI PENTRU DIFERITELE SPECII DE ANIMALE

Suprafețele care formează obiectul acțiunii de repartizare a pășunilor sunt pășunile propriu zise, fânețele folosite prin pășunat și suprafețele din fondul forestier lipsite de arborete sau cu consistență redusă, cu păduri degradate, în care crește iarbă consumabilă de animale. Beneficiarele ale acestor suprafețe sunt animalele crescătorilor din zonă, pentru care nu se poate asigura pășunatul pe suprafețele proprii.

În subzone de până la 1600 m, pentru repartizarea pajiștilor, este util să fie adoptate următoarele criterii:

- pășunile îmbunătățite, cele de tipul *Festuca rubra* (păiuș roșu), *Agrostis capillaris* (iarba câmpului) cu diverse specii mezofile, situate în partea inferioară a etajului fagului, cu forme de relief mai domoale, cu indici de producție superiori, cu surse de apă pentru adăpare cel puțin acolo unde se amplasează tabăra de vară și cu drumuri accesibile, să fie rezervate vacilor de lapte;

Tabelul 6.5.

Câteva date necesare pentru alcătuirea amestecurilor de graminace și leguminoase perene în condiții de necirigare

| Specia | Regiunea de cultură | | | | | | Particularități biologice | | | | | | Modul de folosință principal | Norma de sămânță (kg/ha) |
|-------------------------------|---------------------|---------|-------|-------|-----------|-------|---------------------------|----------|---------------------------|-------------|---------|--------|------------------------------|--------------------------|
| | Câmpie | dealuri | | Munte | Subalpină | Lunci | Talpa | Oțavire | Capacitatea de concurență | | | | | |
| | | Uscate | Umede | | | | | | Anul I | Cealaltă an | | | | |
| <i>Agropyron pectiniforme</i> | + | + | * | * | * | * | Mijlocie | f. slabă | III | II | fâneață | 16-18 | | |
| <i>Bromus merxus</i> | + | + | * | * | * | * | Înaltă | f. slabă | III | II | fâneață | 30-35 | | |
| <i>Dactylis glomerata</i> | + | + | * | * | * | * | Înaltă | f. bună | III | I | mixt | 20-25 | | |
| <i>Festuca arundinacea</i> | * | * | + | + | + | + | Înaltă | f. bună | III | I | fâneață | 25-30 | | |
| <i>Festuca pratensis</i> | * | * | + | + | + | + | Mijlocie | bună | II | II | mixt | 25-30 | | |
| <i>Festuca rubra</i> | * | * | + | + | + | + | Joasă | slabă | III | III | pășune | 20-25 | | |
| <i>Lolium perenne</i> | * | * | + | * | * | + | Joasă | f. bună | I | II | pășune | 25-30 | | |
| <i>Phleum pratense</i> | * | * | + | + | + | + | Înaltă | bună | III | III | mixt | 15-18 | | |
| <i>Poa pratensis</i> | * | * | + | + | + | + | Joasă | slabă | III | II | pășune | 12-15 | | |
| <i>Lotus corniculatus</i> | + | + | + | * | * | + | Joasă | f. bună | III | III | mixt | 12-16 | | |
| <i>Medicago sativa</i> | + | + | + | * | * | + | Înaltă | f. bună | I | I | fâneață | 18-20 | | |
| <i>Onobrychis viciifolia</i> | + | + | + | * | * | + | Înaltă | slabă | III | III | fâneață | 80-100 | | |
| <i>Trifolium pratense</i> | * | * | + | * | * | + | Înaltă | f. bună | II | II | fâneață | 16-20 | | |
| <i>Trifolium repens</i> | * | * | + | + | + | + | Joasă | f. bună | III | III | pășune | 16-12 | | |

+ se recomandă a fi semănată
* nu se recomandă

I - capacitate mare de concurență
II - capacitate mijlocie de concurență
III - capacitate mică de concurență

Tabelul 6.6.

Amestecuri standardizate de iserburi recomandate pentru reînsemănțare pe zone de cultură și mod de folosire (P - pășunat; F - fâneață; M - mixt)

| Zona | Silvostepă | | Etajul pădurilor de foioase | | | | | | | | Etaj molii | | | Condiții staționale speciale | | | | | | | |
|--|------------|----|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|------------------------------|----|----|----|----|----------|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Exc. apă | 19 | 20 |
| Mod de folosire | P | F | PM | PM | P | F | MF | PM | M | M | PM | M | P | P | PM | MF | PM | F | M | M | P |
| <i>Dactylis glomerata</i> | 12 | 6 | 8 | 10 | - | 10 | 12 | - | 9 | 10 | - | 4 | - | 10 | 8 | 5 | - | 5 | 5 | - | - |
| <i>Festuca pratensis</i> | 8 | - | 10 | 8 | - | - | 5 | 15 | - | 13 | 12 | 8 | - | 5 | - | 7 | - | - | 8 | - | - |
| <i>Phleum pratense</i> | 5 | - | - | 5 | - | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 3 | - | 5 | - | - | 7 | - | - |
| <i>Lolium perenne</i> | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 9 | - | - | - | - | 15 | 5 | 3 | - | - | 5 | 15 | 10 |
| <i>Festuca arundin.</i> | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 15 |
| <i>Festuca rubra</i> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Poa pratensis</i> | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| <i>Bromus merxus</i> | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 25 | - | - | - |
| <i>Trifolium repens</i> | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| <i>Trifolium pratense</i> | - | - | - | - | 12 | - | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>Lotus corniculatus</i> | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
| <i>Medicago sativa</i> | - | 15 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - |
| <i>Onobrychis viciif.</i> | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 40 | - | - | - |
| Total vâdnă (cu valoarea culturală 100%) | 32 | 21 | 62 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 33 | 38 | 31 | 28 | 21 | 28 | 32 | 31 | 52 | 65 | 25 | 28 | 33 |

- pajiștile situate în etajul superior al fagului și în etajul molidului, cu unele condiții mai puțin prielnice dar care prin măsuri de întreținere și îmbunătățire pot asigura producții mari de iarbă, să fie repartizate pentru pășunatul tineretului bovin de prăsilă și pentru îngrășare;
- suprafețele situate pe terenuri cu relief mai frământat, dominate de ierburi mai puțin productive de tipul *Nardus stricta* (țăpoșică), care nu pot fi folosite cu randament de bovine, să fie repartizate pentru pășunatul ovinelor.

După definitivarea lucrărilor de repartizare a pajiștilor, este necesar ca acestea să fie consemnate într-un document cu următoarele mențiuni:

- denumirea trupului de pajiște repartizată și din ce corp face parte cu suprafața și delimitările;
- beneficiarul pajiștii repartizate;
- capacitatea de pășunat exprimată în UVM;
- numărul pe categorii al animalelor ce vor fi admise la pășunat pe pajiștea repartizată;
- perioada de timp pentru care s-a făcut repartizarea;
- lucrările de îmbunătățire, întreținere și folosire prevăzute a se aplica pe pajiștea respectivă, în cadrul programului de punere în valoare;
- sarcinile concrete ce revin beneficiarilor cu privire la lucrările ce trebuie să le aplice pe pajiștea repartizată în cursul anului pe date calendaristice.

Numărul și suprafața parcelelor de exploatare se stabilesc în funcție de producția lor, calitatea ierbii și posibilitatea regenerării ei. Ca suprafață, parcelele de exploatare pot diferi între ele, cu condiția ca producția de iarbă să fie aceeași și să suporte aceeași încărcătură de animale. În momentul în care capacitatea și calitatea furajelor de pe parcelă sunt ridicate, se pot face subparcele de folosire, în vederea eșalonării producției și valorificării raționale a furajului, cositul furajelor excedentare, pentru a asigura necesarul în cazul condițiilor nefavorabile. În mod normal, iarba se valorifică cu atât mai bine cu cât numărul parcelelor dintr-o tarla de pășunat este mai mare, întrucât se poate reduce durata medie a pășunatului și mări durata perioadei de refacere a ierbii. Modul de divizare a unei tarlale în parcele, care face parte dintr-o unitate de exploatare (UE), este determinat de configurația terenului, de forma lui geometrică.

Ordinea de pășunat a parcelelor de exploatare este determinată de expoziție, altitudine și amplasare față de căile de acces. În general, parcelele cu o expoziție însorită și cu altitudinea cea mai mică se vor pășuna primele, după care se valorifică cele cu expoziție umbră sau situate la altitudini mai mari, rezultând calendarul de pășunat pe cicluri de exploatare. De asemenea se recomandă ca suprafețele aflate în imediata apropiere a localității să fie pășunate de vacile de lapte, iar tineretul bovin și celelalte categorii să utilizeze pajiștile mai îndepărtate.

Pentru delimitarea parcelelor de exploatare se vor folosi, pe cât posibil, limitele naturale, culmi, pâraie, drumuri, poteci, iar, unde acestea nu sunt prezente, se vor crea limite artificiale, preferabil garduri fixe din lemn, piatră, garduri vii sau electrice.

Ciclul de exploatare reprezintă perioada după care se revine pe aceeași parcelă în același sezon de pășunat.

Ritmul neuniform de repartizare a producției de iarbă pe pășuni face ca animalele să aibă de regulă un surplus de hrană la începutul pășunatului și să fie în criză la sfârșitul sezonului.

În condițiile unui pășunat pe tarlale, această problemă se poate rezolva mult mai ușor în sensul că o parte din tarlale (de exemplu 2 - 3 tarlale din 8 existente) la primul ciclu de pășunat

producția excedentară se cosește pentru prepararea fânului sau însilozare. La fel se procedează și la ciclul doi de pășunat (1 - 2 tarlale din 8). Abia la ciclul al 3-lea și următoarele (4 - 6), producția pășunii se valorifică numai prin păscut cu animalele și completarea după caz pentru vacile de lapte cu furaje recoltate din primele cicluri de recoltă sau din afara pășunii.

Repartiția producției de iarbă într-o perioadă de pășunat este destul de neuniformă fiind mai mare la începutul spre mijlocul sezonului și mai mică la sfârșitul sezonului de pășunat. Din aceste considerente necesarul zilnic calculat de iarbă pentru o unitate de vită mare (UVM) în condițiile din țara noastră, de 50 kg, este bine să fie mărit cu cca 30 %, ajungând astfel la 65 kg iarbă pentru 1 UVM sau 13 kg substanță uscată (SU).

6.5. CĂI DE ACCES

La fiecare corp de pajiște trebuie să existe un drum de acces pe care să poată circula mijloace auto și mecanizate, ca să efectueze în bune condiții, în sezonul primăvară – vară - toamnă, toate transporturile necesare, inclusiv pentru mersul animalelor. De la drumul principal de acces la corpul de pajiști se vor deschide și amenaja drumuri în continuare, pe cât posibil la toate trupurile de pajiști, iar în interiorul fiecărui trup se vor amenaja drumuri sau căi de acces simple, până la adăposturile de animale, la stâne, la adăpători, depozite de furaje, silozuri etc.

La proiectarea și execuția drumurilor pastorale se ține seama de unele criterii și anume:

- drumul să servească pe cât posibil mai multor scopuri: pastorale, forestiere, turistice etc.;
- să deservească și să ofere posibilități de acces la o cât mai mare suprafață de pajiști;
- să traverseze cât mai puține văi și pâraie, în vederea reducerii volumului lucrărilor de artă, poduri, podețe etc. și să evite complet locurile înmlăștinate;
- să fie pietruit, de la drumul de legătură până la corpul de pajiști și în interiorul acestuia cel puțin pe porțiunile cu pantă;
- să solicite un cost redus pe fiecare kilometru, spre a se putea cu aceleași investiții, în timp mai scurt, să se facă mai multe drumuri.

În teren – căile de acces la pajiștile din zona studiată pornesc de obicei din drumuri naționale sau de exploatație, sunt de pământ și greu accesibile în condiții meteo nefavorabile. Unele sunt dublate atunci când nu mai sunt practicabile, de alte căi paralele. Principalele degradări au loc din cauza adâncirii sau deplasării animalelor (urmele de copite).

- Se recomandă repararea și întărirea drumurilor de acces la trupuri, cu pietriș tasat, completat de lucrări de îndepărtarea umidității acolo unde este cazul.

6.6. CONSTRUCȚII ZOOPASTORALE ȘI SURSE DE APĂ

Pentru buna funcționare a amenajamentului pastoral sunt necesare mai multe construcții și dotări pentru sporirea gradului de accesibilitate, îmbunătățirea alimentării cu apă,

adăpostirea oamenilor și animalelor, prelucrarea laptelui, energie electrică, împrejmuire pentru târlire și pășunat rațional, depozitarea și aplicarea dejecțiilor cât și alte utilități în consens cu dezvoltarea tehnicii și nivelului de civilizație.

Asigurarea cu apă de băut este o condiție indispensabilă pentru realizarea pășunatului rațional. Pentru fiecare kg de SU ingerată (5Kg MV) consumul zilnic de apă se ridică la 4-6 l la vacile de lapte 3-5 l la bovine la îngrășat și la 2-3 l la ovine și cabaline. De exemplu pentru o vacă care consumă 10 kg SU (50 Kg MV) trebuie să i se asigure 40-60 l apă. Pentru fiecare litru de lapte produs o vacă are nevoie de 4-6 l apă.

În general se socotește că 1 UVM în sezonul de pășunat are nevoie 30-40 litri apă/zi vara și de 15 - 20 litri în cursul primăverii și al toamnei. Pentru o oaie adultă se socotește 2 - 4 l/cap/zi în perioada pășunatului. Aprovizionarea cu apă se face din diferite surse, cu adăpători fixe sau mobile.

Înzestrarea pășunilor cu adăpători, este adesea dificilă, datorită debitelor insuficiente ale surselor de apă și calității necorespunzătoare a acestora. Dacă debitul sursei de apă este mai redus, cum este cazul unor izvoare de coastă, se poate construi un rezervor de apă care permite acumularea cantității de apă necesară animalelor aduse la pășunat. La fel se poate colecta în bazine apa din ploii de pe acoperișurile adăposturilor de animale sau a caselor de locuit, prevăzute cu jgheaburi și țevi de colectare. În zonele lipsite de izvoare în care apa curge gravitațional se pot săpa puțuri și fântâni cu cumpănă sau pompe acționate manual, cu energie mecanică, electrică, eoliană, etc. care se dirijează direct în jgheaburile de adăpare sau bazine de rezervă pentru același scop.

Adăpătorile fixe trebuie să fie amplasate la maximum 800 m de locul unde se pășunează și în jurul lor sunt necesare lucrări de eliminare a excesului de umiditate. Lungimea jgheaburilor de adăpare (L) se calculează în funcție de numărul de animale (N) în așa fel încât adăparea unei grupe de animale să nu dureze mai mult de o oră:

$$L = \frac{Nts}{T}$$

t = timpul necesar pentru adăparea unui animal (minute)

s = frontul de adăpare pentru un animal (m)

T = timpul necesar pentru adăparea întregului efectiv de animale (maxim 60 minute).

Unele date necesare pentru calculul lungimii adăpătorilor:

| Specia și categoria de animale | Necesar zilnic de apă | Timp necesar adăpării unui animal (minute) | Frontul de adăpare (m) când adăpatul se face: | |
|--------------------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
| | | | Pe ambele laturi | Pe o singură latură |
| Bovine și cabaline adulte | 40-50 | 7-8 | 0,5 | 1,2 |
| Tineret taurin și cabalin | 20-30 | 5-6 | 0,4 | 1,0 |
| Oi și capre adulte | 4-5 | 4-5 | 0,2 | 0,5 |
| Tineret ovin | 2-3 | 4-5 | 0,2 | 0,5 |

Soluția cea mai bună o constituie adăpătorile automate cu nivel constant, unde pierderile de apă sunt minime.

O mare atenție trebuie acordată locurilor de adăpare a animalelor care pot să fie focare de răspândire a helmintozelor (gălbezei). În acest scop este necesară curățirea și dezinfectarea lunară a adăpătorilor cu lapte de var. Terenul din jurul adăpătorilor se va menține uscat prin pavare și asigurarea scurgerii apelor în surplus.

În cazul captării izvoarelor, fie că acesta este unul singur sau sunt mai multe pe același loc, în partea lor din aval se face un baraj în spatele căruia se adună apa ce este apoi condusă la jgheaburi, la intermediar se construiește un recipient de captare, simplu sau cu un decantor. Bazinul de apă, casa de apă sau recipientul de captare, atât în cazul aducerii apei din pâraie cât și direct de la izvoare, se construiește din lemn îmbinat, din piatră cu mortar de ciment sau din beton, pietruit sau betonat pe fund și margini și acoperit cu blăni de lemn, cu lespezi de piatră sau cu plăci de beton, peste care adesea se așează un strat de pământ sau se pun brazde. Din recipient la jgheaburi, conducerea apei se face prin țevi de fier sau zincate, sau tuburi din material plastic cu diametrul de 1-2 țoli (25,5-51 mm).

În teren, în prezent, pășunatul cu "vacile satului" are loc pe o parte din parcelele UAT-ului, mai apropiate de localități, fără a fi nevoie de adăpostire peste noapte sau pentru vreme neprielnică. Majoritatea parcelelor, mai ales cele mai îndepărtate de localități, sunt păscute de ovine, care au și adăposturi locale – stâne.

Există parcele cu izvoare cu debit continuu, colectate (în general în trecut), unele necolectate și alte izvoare care seacă vara și unde se aduce apă cu cisterne. În majoritatea parcelelor mai mari există adăpători de beton vechi și degradate, iar în zonele unde izvoarele au secat, adăpătorile sunt complet distruse. În jurul adăpătorilor terenul este degradat de exces de umiditate și bătătorire, ceea ce duce la îngreunarea adăpatului, murdărirea animalelor și chiar infectarea zonei cu diferiți paraziți.

În parcelele în care pasc ovine, se utilizează adăpători din cauciuc (foste pneuri) care se alimentează cu apă din izvoare sau din cisterne.

- Se recomandă – repararea adăpătorilor și aducțiunilor de apă existente, construcția unora noi acolo unde este nevoie, dezinfectarea lor periodică, eliminarea excesului de umiditate și pavarea cu pietriș a zonei din jurul lor. Pentru buna funcționare a adăpătorilor, în fiecare primăvară, acestea să fie revăzute, reparate și întreținute în tot timpul verii iar paznicii de vite au obligația de a curăța jgheaburile, cel puțin o dată pe săptămână.

CAP.7 Descrierea parcelară:

DESCRIEREA PARCELARA Seica Mare –Ord.Prefect 1.

1.

| U.A.T. | Trupul de pajiște; Tarlaua 2 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|---------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Deal in vale</i> | 27;30; | 36,86 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: SUD Înclinație: 5 -35° Sol: Regosol calcaric, | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaeumum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaeumum</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 13 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 10% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetația a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

2.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 3 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Șeica Mare | LA GARA | 31;32;34;35;5 7/1/1 | 9.82 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 100-250 Expoziție: S Înclinație: 10-15° Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaeumum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaeumum</i> (50%); | | | | | | |
| 18% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (10%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (3%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 12 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 3% Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> | | | | | | |
| 12% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> | | | | | | |

| |
|---|
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95% |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 4 -5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15 t/ha) |
| Lucrări executate: |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

3.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.67 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>SUB HEDEL</i> | 2115-2127 | 78,45 | Pășune | lunca | Neuniform |
| Altitudine: 300-350 Expoziție: S Înclinație: 1-5% Sol: Gleosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis canina-Phragmites australis</i> | | | | | | |
| 50 % Graminee: <i>Agrostis canina-Phragmites australis</i> | | | | | | |
| 20 % Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (10%), <i>Lotus corniculatus</i> (6%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 25 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> | | | | | | |
| 5% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> [arbusti în palcuri raslete | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 97 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 vaci/ha sau 2 - 3 oi/ha (producție masă verde 4 -5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă; curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150 kg/ha N,60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

4.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.47 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Baza sportiva</i> | 1749;1750. | 1,71 | Pășune | lunca | Uniforma |
| Altitudine: 300 Expoziție: N Înclinație: 1-10% Sol: Aluvisol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): apa freatica la 1-5 m. | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> | | | | | | |
| 60 % Graminee <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> 60% | | | | | | |
| 10 % Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderale</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> | | | | | | |
| 5% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> [arbusti în palcuri raslete] | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 99 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 vaci/ha sau 2 - 3 oi/ha (producție masă verde 5 - 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (145 kg/ha N, 50 kg/ha P ₂ O ₅ , 25 kg/ha K ₂ O), îngrășăminte org. 25 t/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii. scoaterea cioatelor, taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

5.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.48 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Coasta furcii</i> | 1819 | 2,83 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: E Înclinație: 5 -15° Sol: : Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 60 % Graminee 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); | | | | | | |
| 10 % Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 15 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderale</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> | | | | | | |
| 10% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> [arbusti în palcuri raslete] | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 97% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 vaci/ha sau 2 - 3 oi/ha (producție masă verde 5 - 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 25 kg/ha K ₂ O), îngrășământ organic 25.t/ha supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; | | | | | | |

folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.
 - **cu angajament de agro-mediu;** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

6.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.62 | Parcela descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Dosul Vaii Mari</i> | 2020-2032 | 49,78 | Pășune | Versant | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: E Înclinație:1- 25° Sol: luvosol stationar | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște; <i>Agrostis capilaris-Festuca rupicola</i> | | | | | | |
| 49% Graminee <i>Agrostis capilaris-Festuca rupicola</i> 49% | | | | | | |
| 15% Leguminoase: <i>Tripholium sp.</i> (10%), <i>Medicago sativa</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (2%) | | | | | | |
| 14% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (10%); <i>Thymus vulgaris</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Eryngium campestris</i> | | | | | | |
| 20% Vegetația lemnoasă: rar <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 99% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 – 0,6 bovine/ha sau 2 -3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovină/ha (producție masă verde 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; curățire și ; fertilizare anuală (180 kg/ha N, 70 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamint org. 35to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

7.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.68 | Parcela descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Dealul Sigherului</i> | 2147/1-2170 | 193,58 | Pășune | lunca | uniforma |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: S Înclinație: 1-5° Sol: Stagnosol,Gleiosol,Faeoziom. | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: - <i>Arrhenatherum elatius-Dactilis glomerata,Agrostis canina-Phragmites australis</i> | | | | | | |
| 60 %Graminee: -- <i>Arrhenatherum elatius</i> 20%- <i>Dactilis glomerata</i> 20%, <i>Agrostis canina-Phragmites australis</i> 20% | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Tripholium sp.</i> (5%), <i>Medicago sativa</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (2%) | | | | | | |
| 12% Diverse plante: <i>Robinia pseudoaccacia</i> 5%. <i>Aquilea millefolium</i> (5%); <i>Thymus vulgaris</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> | | | | | | |

| |
|--|
| (2%); 3% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Eryngium campestre</i> |
| 5% Vegetația lemnoasă: rar <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 98% |
| Lucrări executate: |
| Lucrări propuse: : curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; curățire și ; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 70 kg/ha P ₂ O ₅ , 80 kg/ha K ₂ O),ingrasamint org. 30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

8.

| U.A.T. | Trupul de pajiște | Parcela descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|--------------------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Viile Istioanului</i> | 2171. | 0,38 | Pășune | culme | Ne uniforma |
| Altitudine:400 Expoziție: S-E Înclinație: 2-10% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 45% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> 30% <i>Agrostis tenuis</i> (5%), <i>Festuca rupicola</i> (5%) , 5% alte graminee(<i>Festuca pratensis</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Bromus inermis</i>) | | | | | | |
| 20% Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 10%, <i>medicago sativa</i> 5% , <i>lotus corniculatus</i> 5% | | | | | | |
| 5% Diverse plante: <i>Achillea m.</i> (5%), <i>Thymus vulgaris</i> (5%), <i>Plantago m.</i> (5%), | | | | | | |
| 3% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| 25% Vegetația lemnoasă: rar <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 98% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 – 0,6 bovine/ha sau 2 -3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ling.org. 30. supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

9.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.74 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Dealul Hedel</i> | 2337-2339 | 50,62 | Pășune | culme | neuniforma |
| Altitudine: 350 Expoziție: N-E Înclinație: 2-10% Sol. Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> 20% <i>Agrostis tenuis</i> (15%), <i>Festuca rupicola</i> (10%), 5% alte graminee (<i>Festuca pratensis</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Bromus inermis</i>) | | | | | | |
| 30% Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 15%, medicago sativa 10%, lotus corniculatus 5% | | | | | | |
| 15% Diverse plante: <i>Achillea m.</i> (5%), <i>Thymus vulgaris</i> (5%), <i>Plantago m.</i> (5%), | | | | | | |
| 5% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 – 0,6 bovine/ha sau 2 -3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| 30% Vegetația lemnoasă: rar <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ling.org. 30. supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii. scoaterea cioatelor, taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

10.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.36 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Sesul colibelor</i> | 1186/1 | 45,0 | Pășune | Versant de monoclin | Neuniform |
| Altitudine: 500-550 Expoziție: V Înclinație: 5-25% Sol: Stagnosol eluvic. | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> | | | | | | |
| 60 % Graminee: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> 60% | | | | | | |
| 15 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> (10%), <i>Coronilla varia</i> (1%), <i>Medicago sativa</i> (2%), <i>Lotus corniculatus</i> (2%) | | | | | | |
| 18% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (10%); <i>Achillea melifolium</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 5% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Allium ursinum</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 99% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3 – 5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15t/ha) | | | | | | |
| 1% Vegetația lemnoasă: rar <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri | | | | | | |
| Lucrări executate. | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - <u>cu angajament de agro-mediu</u> ;; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

11.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.37 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Fantana Maigului</i> | 1194-1231 | 51,03 | Pășune | Versant | Neuniform |
| Altitudine:400-500 Expoziție: V Înclinație: 20% Sol: Stagnosol eluvic | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> | | | | | | |
| 55 % Graminee: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> 55% | | | | | | |
| 8% Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> (3%), <i>Coronilla varia</i> (2%), <i>Medicago sativa</i> (2%), <i>Lotus corniculatus</i> (1%) | | | | | | |
| 8% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (10%); <i>Achillea melifolium</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 2% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Allium ursinum</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 98% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3 – 5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15t/ha) | | | | | | |
| 25% Vegetația lemnoasă: rar <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri | | | | | | |
| Lucrări executate. | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha,supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire | | | | | | |

organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.

- **cu angajament de agro-mediu;** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

12.

| U.A.T. | Trupul de pajiște | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|--------------------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Fantana Maiaului,</i> | 1235-1272 | 51,15 | Pășune | Deal | Neuniform |
| Altitudine:400-500 Expoziție: V Înclinație: 20% Sol: Stagnosol eluvic | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> | | | | | | |
| 50 % Graminee: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> 50% | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> (4%), <i>Coronilla varia</i> (3%), <i>Medicago sativa</i> (2%), <i>Lotus corniculatus</i> (1%) | | | | | | |
| 8% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (10%); <i>Achillea millefolium</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 2% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Allium ursinum</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3 – 5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15t/ha) | | | | | | |
| 30% Vegetația lemnoasă: rar <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri | | | | | | |
| Lucrări executate. | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha,supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

13.

| U.A.T. | Trupul de pajiște | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Șeica Mare | GAUNOASA | 1278-1389/2 | 105,26 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300-500 Expoziție: V Înclinație: 2-50% Sol: Regosol eutric calcaric,Aluvisol eutric,calcaric,Luvisol albic stg,stagnosol preluvic. | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul) | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaenum</i> , <i>Agrostis stolonifera</i> , <i>Agropirum repens</i> , <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> | | | | | | |
| 40% Graminee: <i>Botriochloa ischaenum</i> 20%, <i>Agrostis stolonifera</i> , <i>Agropirum repens</i> 10%, <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> 10% | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Tripolium sp.</i> (5%), <i>Vicia cracca</i> (3%), <i>Medicago sativa</i> (1%), <i>Lotus corniculatus</i> (1%) | | | | | | |
| 9 % Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (3%); <i>Thymus vulgaris</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante | | | | | | |

| |
|--|
| (<i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) |
| 1% % Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Eryngium campestre</i> |
| 35% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> [arbusti în palcuri raslete |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 -3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 6 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15 t/ha) |
| 36% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri, <i>Prunus spinosa</i> |

14

| U.A.T. | Trupul de pajiște | Parcela descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Șeica Mare | DEALUL FURNICILOR | 359-422 | 32,04 | Pășune | Versant | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: V Înclinație: 5-25% Sol: Stagnosol eluvic | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> | | | | | | |
| 27% Graminee: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> 27% | | | | | | |
| 5% Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> (2%), <i>Coronilla varia</i> (1%), <i>Medicago sativa</i> (1%), <i>Lotus corniculatus</i> (1%) | | | | | | |
| 5% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (10%); <i>Achillea millefolium</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 2% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Allium ursinum</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 99% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3 – 5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15t/ha) | | | | | | |
| 60% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri | | | | | | |
| Lucrări executate. | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu.: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

15

| U.A.T. | Trupul de pajiște | Parcela descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Șeica Mare | Roaba | 641-666 | 39,03 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 400 Expoziție: V Înclinație: 20° Sol: : Stagnosol eluvic | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> | | | | | | |
| 45% Graminee: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> 65% | | | | | | |
| 10 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> (7%), <i>Coronilla varia</i> (1%), <i>Medicago sativa</i> (1%), <i>Lotus corniculatus</i> (1%) | | | | | | |
| 8% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (10%); <i>Achillea millefolium</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante | | | | | | |

| |
|--|
| (<i>Daucus carota, Prunella vulgaris, Potentilla sp., Rumex sp., Agrimonia eupatoria...</i>) |
| 2% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp., Allium ursinum, Eryngium campestre</i> |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95% |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3 – 5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15t/ha) |
| 30% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna, Rosa canina, tineri</i> |
| Lucrări executate. |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

16.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.24 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | DOSUL ROABA | 683-705 | 38,79 | Pășune | Versant | Neuniform |
| Altitudine: 440 Expoziție: Vest Înclinație: 15° -20% Sol: Gleiosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis canina-Phragmites australis</i> | | | | | | |
| 25 % Graminee: <i>Agrostis canina-Phragmites australis</i> | | | | | | |
| 5 % Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (2%), <i>Lotus corniculatus</i> (1%), <i>Medicago lupulina</i> (1%), <i>Trifolium campestre</i> (1%) | | | | | | |
| 3 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta, Prunella vulgaris, Geranium pratense...</i> | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias, Veratum album, Xanthium sp., Lepidium ruderales, Xeranthenum annuum</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,5vac/ha sau 2 - 3 oi/ha (producție masă verde 4 –5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| 60% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna, Rosa canina</i> [arbusti in palcuri raslete | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă; curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150 kg/ha N,60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

17.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.25 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Roaba</i> | 683-705 | 38,79 | Pășune | Versant | Neuniform |
| Altitudine: 430 Expoziție: -Vest Înclinație: 15° Sol: Stagnosol eluvic. | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> | | | | | | |
| 10 % Graminee: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> 10% | | | | | | |
| 5 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> (3%), <i>Coronilla varia</i> (2%), <i>Medicago sativa</i> (1%), <i>Lotus corniculatus</i> (1%) | | | | | | |
| 2% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> , <i>Achillea melifolium</i> , <i>Taraxacum sp.</i> ; alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 2% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Allium ursinum</i> , <i>Eryngium campestris</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 99% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3 – 5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15t/ha) | | | | | | |
| 80% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri | | | | | | |
| Lucrări executate. | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

18

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.28 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | GAURA PORTI | 874-876 | 11,31 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 450 Expoziție: vest Înclinație: 20-60° Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaenum</i> | | | | | | |
| 35% Graminee: <i>Botriochloa ischaenum</i> (35%); | | | | | | |
| 5% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 3% Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 5 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderale</i>, <i>Xeranthemum annuum</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 98 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 4 –5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15 t/ha) | | | | | | |
| 50 % Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i>, <i>Rosa canina</i>.... | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O), ing.org.30to/ha , supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angaiament de agro-mediu.: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

| U.A.T. | Trupul de pajiște | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-----------------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Șeica Mare | VALEA LUPULUI T.33 | 1072-1074/1 | 27,10 | Pășune | Deal | Neuniform |
| Altitudine: 450 Expoziție: v Înclinație: 35-60 Sol: : Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 10 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 5% Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 98% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 4 –5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15 t/ha) | | | | | | |
| 13% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.35to/ha supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; tălire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - <u>cu angajament de agro-mediu</u> ;; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

20.

| U.A.T. | Trupul de pajiște | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|--------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Șeica Mare | VALEA MIGHINDOALEI T.105 | 3381;3382. | 9,91 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350 Expoziție: V Înclinație: 0-25% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 46% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (46%); | | | | | | |
| 8% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (1%), <i>Trifolium campestre</i> (1%) | | | | | | |
| 10% Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 3 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 97 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 4 –5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15 t/ha) | | | | | | |

| |
|---|
| 30 % Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna, Rosa canina...</i> |
| Lucrări executate: |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. |
| - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

21.

| U.A.T | Trupul de pajiște T.106 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | SUB CEARMAN | 3386. | 1,26 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: S-V Înclinație: 5-35° Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaeumum</i> | | | | | | |
| 45% Graminee: <i>Botriochloa ischaeumum</i> (45%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (5%), <i>Lotus corniculatus</i> (2%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (1%) | | | | | | |
| 10% Diverse plante: <i>Potentilla erecta, Prunella vulgaris, Geranium pratense...</i> | | | | | | |
| 5% Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias, Veratum album, Xanthium sp., Lepidium ruderales, Xeranthemum annuum</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 4 –5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15 t/ha) | | | | | | |
| 30 % Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna, Rosa canina...</i> | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha , supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

22.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.109 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | IN SES | 3460 | 2,39 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 250 Expoziție: S -V Înclinație 2-10° Sol: Luvosol albic, stagno gleizat puternic | | | | | | |

| |
|---|
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): |
| Tipul de pajiște; Agrostis capilaris-Festuca rupicola |
| 40 % Graminee Agrostis capilaris-Festuca rupicola 40% |
| 15 % Leguminoase: Tripholium sp. (10%), Medicago sativa (3%), Lotus corniculatus (1%) |
| 9% Diverse plante: Aquilea millefolium; Thymus vulgaris ; Taraxacum sp. ; alte plante (Daucus carota, Prunella vulgaris, Potentilla sp., Rumex sp., Agrimonia eupatoria...) |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: Carduus sp., Eryngium campestre |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 – 0,6 bovine/ha sau 2 -3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovină/ha (producție masă verde 15 - 20 t/ha) |
| 25% Vegetația lemnoasă: rar Crataegus monogyna, Rosa canina, tineri |
| Lucrări executate: |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; curățire și ; fertilizare anuală (180 kg/ha N, 75 kg/ha P ₂ O ₅ , 75 kg/ha K ₂ O),ingrasamint org. 35to/ha,supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

23.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.110 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| Șeica Mare | IN POIANA | 3478-3486. | 49,33 | Pășune | Platou,cul me versant | Neuniform |
| Altitudine: 350 Expoziție: S -V Înclinație: 15-35° Sol: Stagnosol preluvic | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> | | | | | | |
| 30 % Graminee: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> 30% | | | | | | |
| 6% Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> (3%), <i>Coronilla varia</i> (1%), <i>Medicago sativa</i> (5%), <i>Lotus corniculatus</i> (1%) | | | | | | |
| 8% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (10%); <i>Achillea melifolium</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 2% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Allium ursinum</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 96% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3 – 5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15t/ha) | | | | | | |
| 50% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri | | | | | | |
| Lucrări executate. | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu.; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

24.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.115 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | ZAPODIA DOMNULUI | 3690;3691. | 0,44 | Pășune | Platou culme | Neuniform |
| Altitudine: 200-250 Expoziție: E Înclinație:2-15° Sol: Luvosol stagnogleizat puternic. | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): <i>Nardus stricta</i> | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Nardus stricta</i> | | | | | | |
| 48 % Graminee: <i>Nardus stricta</i> (20%); <i>Agrostis sp.</i> (10%); <i>Phleum pratense</i> (5%); 13% alte graminee (<i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Poa sp.</i> , <i>Avena sp.</i> , <i>Carex sp.</i> ...) | | | | | | |
| 10 % Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (5%); <i>Lotus corniculatus</i> (3%); <i>Medicago lupulina</i> (3%); <i>Trifolium campestre</i> (9%) | | | | | | |
| 9 % Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (4%); <i>Potentilla erecta</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 11% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 1% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Eryngium campestre</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 98% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3– 5t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 3-4 ovine/ha (producție masă verde 10 - 12 t/ha) | | | | | | |
| 30%Vegetația lemnoasă: | | | | | | |

| |
|---|
| Lucrări executate: |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și tufăriș; fertilizare anuală (190kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80 kg/ha K ₂ O),ing.org.35 kg/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

25.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.116 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Coasta Hampului</i> | 3697..3718 | 13,26 | Pășune | Platou culme | Neuniform |
| Altitudine: 200-250 Expoziție: E Înclinație:2-15° Sol: Luvosol stagnogleizat puternic. | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): <i>Nardus stricta</i> | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Nardus stricta</i> | | | | | | |
| 40 % Graminee: <i>Nardus stricta</i> (30%); <i>Agrostis sp.</i> (10%); <i>Phleum pratense</i> (10%); 10% alte graminee (<i>Arrhenatherum elatius, Poa sp., Avena sp., Carex sp...</i>) | | | | | | |
| 10 % Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (5%); <i>Lotus corniculatus</i> (2%); <i>Medicago lupulina</i> (2%); <i>Trifolium campestre</i> (1%) | | | | | | |
| 9 % Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (4%); <i>Potentilla erecta</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 11% alte plante (<i>Daucus carota, Prunella vulgaris, Potentilla sp., Rumex sp., Agrimonia eupatoria...</i>) | | | | | | |
| 1% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp., Eryngium campestre, Euphorbia cyparissias, Xeranthenum annuum</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3–5t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 3-4 ovine/ha (producție masă verde 10 - 12 t/ha) | | | | | | |
| 35%Vegetația lemnoasă: | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și tufăriș; fertilizare anuală (190kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80 kg/ha K ₂ O),ing.org.35 kg/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

26.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.112 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | COASTA MARE | 3491;3517. | 42,49 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 500-550 Expoziție: V Înclinație: 35° Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 15% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (15%); | | | | | | |
| 8% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (2%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (1%) | | | | | | |
| 1 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderale</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> | | | | | | |
| 70% Vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

27.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.113 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|------------|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | ZAPODEA CU RAPI | 3567;3583/1. | 83,14 | Pășune | Culme | Neuniform |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Altitudine: 350-400 Expoziție: S-V Înclinație: 5-35° Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 4 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderale</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> | | | | | | |
| 20 % Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 85 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 4 –5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha , supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

28.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.114 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | ZAPODIA MORII | 3656;3660. | 2,97 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 530 Expoziție: S-V Înclinație: 10° Sol: | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 40% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (40%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 4 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderale</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> | | | | | | |
| 40% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 4 –5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 12 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: distrugerea vegetației lemnoase și reinsămânțare, curățire repetată de plante dăunătoare; fertilizare anuală (100- 140 kg/ha N, 50 - 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 30 – 40 kg/ha K ₂ O), supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii. scoaterea cioatelor, taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

29.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.115 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | ZAPODIA DOMNULUI | 3665;3674. | 30,15 | Pășune | Deal | Neuniform |
| Altitudine: 250-300 Expoziție: VEST Înclinație: 5-30% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 48% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (48%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 8 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |

| |
|---|
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderale</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> ... |
| 30% vegetatie lemnoasa |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei:98% |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

30.

| U.A.T. | Trupul de pajiște | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|--|---------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>T.117</i> <i>Cosata Hampului</i> | 3814/1 | 35,80 | Pășune | Deal | Neuniform |
| Altitudine: 250-300 Expoziție: VEST Înclinație: 5-30% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); | | | | | | |
| 5% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (2%), <i>Lotus corniculatus</i> (1%), <i>Medicago lupulina</i> (1%), <i>Trifolium campestre</i> (1%) | | | | | | |
| 8 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderale</i>, <i>Xeranthenum annuum</i>... | | | | | | |
| 20% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei:85% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

31.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.138 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | SESUL BUII | 4901 | 6,85 | Pășune | Deal | Neuniform |
| Altitudine: 250-300 Expoziție: E -S Înclinație: 5-10% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 40% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (40%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 8 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 40% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei:100% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 6 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| <p>Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O),ingrasamant organic 25 to/ha,,supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.</p> <p>- cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.</p> | | | | | | |

32.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.140 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | DEALUL SIBIULUI | 4971/4 | 5,5 | Pășune | Deal | Neuniform |
| Altitudine: 250-300 Expoziție: NORD Înclinație: 15 -25° Sol: Faeoziom | | | | | | |
| Datele staționale (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Festuca rupicola</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Festuca rupicola</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 8 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 25% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei:95% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,6 - 0,8 bovine/ha sau 3 - 5ovine/ha (producție masă verde 6– 8 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8-1,0bovină/ha sau 5 -6 ovine/ha (producție de 15- 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (130 kg/ha N, 40 kg/ha P ₂ O ₅ , 40 kg/ha K ₂ O),ingrasamant organic 20 to/ha,,supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

33.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.141 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | In CARN | 5046-5067 | 50,56 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 250-300 Expoziție: NORD Înclinație: 5 -25° Sol: Faeoziom argic,clinogleic. | | | | | | |
| Datele staționale (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Festuca rupicola</i> | | | | | | |
| 40% Graminee: <i>Festuca rupicola</i> (40%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 8 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 30% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei:90 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,6 - 0,8 bovine/ha sau 3 - 5ovine/ha (producție masă verde 6– 8 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8-1,0bovină/ha sau 5 -6 ovine/ha (producție de 15- 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (130 kg/ha N, 40 kg/ha P ₂ O ₅ , 40 kg/ha K ₂ O),ingrasamant organic 20 to/ha,, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

34.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.149 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Șeica Mare | ZAPODIA NUCILOR | 5370/1 | 21,73 | Pasune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 200-250 Expoziție: NORD Încălzire: 5 -25° Sol: Faeziom argic,clinogleic. | | | | | | |
| Datele staționale (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Festuca rupicola</i> | | | | | | |
| 55% Graminee: <i>Festuca rupicola</i> (55%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 8 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 25% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei:100 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,6 - 0,8 bovine/ha sau 3 - 5ovine/ha (producție masă verde 6– 8 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8-1,0bovină/ha sau 5 -6 ovine/ha (producție de 15- 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (140 kg/ha N, 40 kg/ha P ₂ O ₅ , 30 kg/ha K ₂ O),îngrasamant organic 20 to/ha., supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

35.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.152 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Șeica Mare | CIOARA | 5456-5462 | 7,11 | Pasune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350 Expoziție: N-V Încălzire: 5-15° Sol: Stagnosol preluvic | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> | | | | | | |
| 10% Graminee: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> 10% | | | | | | |
| 5 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> (2%), <i>Coronilla varia</i> (1%), <i>Medicago sativa</i> (1%), <i>Lotus corniculatus</i> (1%) | | | | | | |
| 3% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> ; <i>Achillea melifolium</i> ; <i>Taraxacum sp.</i> ; alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 2% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Allium ursinum</i> , <i>Eryngium campestris</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3 – 5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 10 | | | | | | |

| |
|---|
| - 15t/ha) |
| 80% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri |
| Lucrări executate. |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. |
| - cu angajament de agro-mediu.; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

36.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.153 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|------------|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | OGRADA | 5474/1- 5484/1 | 7,07 | Pășune | culme | Neuniform |

| | | | |
|---|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Altitudine: 250-300 | Expoziție: E -S | Înclinație: 5-10% | Sol: Regosol calcaric |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | |
| 40% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (40%); | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | |
| 8 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderales</i>, <i>Xeranthemum annuum</i>... | | | |
| 20% vegetatie lemnoasa | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei:80 % | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 6 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | |
| Lucrări executate: | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamant organic 25 to/ha,supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | |
| - cu angajament de agro-mediu.; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | |

37

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.168 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | DEALU CIORI | 5901;5905. | 3,37 | Pășune | culme | Neuniform |
| Altitudine: 350 | | | | | | |
| Expoziție: N-V | | | | | | |
| Înclinație: 5-15° | | | | | | |
| Sol: Stagnosol preluvic | | | | | | |

| |
|---|
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): |
| Tipul de pajiște: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> |
| 8% Graminee: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> 8% |
| 5 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> (2%), <i>Coronilla varia</i> (1%), <i>Medicago sativa</i> (1%), <i>Lotus corniculatus</i> (1%) |
| 3% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (10%); <i>Achillea melifolium</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) |
| 2% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Allium ursinum</i> , <i>Eryngium campestre</i> |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 98% |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3 – 5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15t/ha) |
| 80% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri |
| Lucrări executate. |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. |
| - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

38.

| U.A.T. | Trupul de pajiște | Parcela | Suprafața | Categoria de | Unitatea | Configurația |
|--|--------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | T.170 | Descriptivă | (ha) | folosință | de relief | |
| Șeica Mare | PARUL BOGHI | 5935-5954 | 25,05 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 250-300 Expoziție: VEST Înclinație: 5-30% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 10% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (10%); | | | | | | |
| 5% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (2%), <i>Lotus corniculatus</i> (1%), <i>Medicago lupulina</i> (1%), <i>Trifolium campestre</i> (1%) | | | | | | |
| 2% Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderale</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> ... | | | | | | |
| 80% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 98% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamant organic 25 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arbustilor. | | | | | | |
| Cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

39.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.172 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| Șeica Mare | PASUNEA SASILOR | 6070;6076. | 22,22 | Pășune | Versant umbrat uniform | Uniform |
| Altitudine: 250 Expoziție: E Înclinație: 1- 25° Sol: luvosol stagnogleizat slab | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște; Festuca rubra | | | | | | |
| 20% Festuca rubra | | | | | | |
| 10 % Leguminoase: <i>Tripholium sp.</i> (5%), <i>Medicago sativa</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (2%) | | | | | | |
| 8% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> ; <i>Thymus vulgaris</i> ; <i>Taraxacum sp.</i> ; alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 99 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 – 0,6 bovine/ha sau 2 -3 ovine/ha (producție masă verde 7– 10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovină/ha (producție masă verde 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| 60% Vegetația lemnoasă: rar <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (180 kg/ha N, 70 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), îngrășământ org. 35t/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii. scoaterea cioatelor, taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - <u>cu angajament de agro-mediu</u> : interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

40.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.173 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | PSUNEA SASILOR | 6101 | 20,51 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 250 Expoziție: E Înclinație: 1- 25° Sol: luvosol stagnogleizat slab | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște; Festuca rubra | | | | | | |
| 40 % Festuca rubra | | | | | | |
| 10 % Leguminoase: <i>Tripholium sp.</i> (5%), <i>Medicago sativa</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (2%) | | | | | | |
| 8% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> ; <i>Thymus vulgaris</i> ; <i>Taraxacum sp.</i> ; alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 – 0,6 bovine/ha sau 2 -3 ovine/ha (producție masă verde 7 – 10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovină/ha (producție masă verde 15 - | | | | | | |

| |
|--|
| 20 t/ha) |
| 35% Vegetația lemnoasă: rar <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , |
| Lucrări executate: |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (180 kg/ha N, 70 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamint org. 35to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: ; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

41.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.174 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | ZAPODIA CETATII | 6153/1 | 45,91 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 250-300 Expoziție: VEST Înclinație: 5-30% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaeumum</i> | | | | | | |
| 40% Graminee: <i>Botriochloa ischaeumum</i> (40%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 8 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 25% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei:90 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamant organic 25 to/ha,.supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: ; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

42.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 154 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------|--------------|------|--------|-------|-----------|
| Șeica Mare | Pisc | 5496;5497/1. | 2,20 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine 350-440 Expoziție: S-V Înclinație: 15-20% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 10% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (10%); | | | | | | |
| 4% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (1%), <i>Lotus corniculatus</i> (1%), <i>Medicago lupulina</i> (1%), <i>Trifolium campestre</i> (1%) | | | | | | |
| 1 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 21% Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderalis</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 75% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 92% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 6 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamant organic 25 to/ha., supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - <u>cu angajament de agro-mediu;</u> interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

43.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 156 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Pisc | 5534 | 0,05 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine 350-440 Expoziție: S-V Înclinație: 15-20% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 8 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2% Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderalis</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 20% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 90 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 6 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamant organic 25 to/ha., supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - <u>cu angajament de agro-mediu;</u> interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. | | | | | | |

gunoii de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

Lucrări propuse: Taierea arboretului, reînsămânțare, fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O), îngrășământ organic 25 to/ha.

44.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.157 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| Șeica Mare | DUMBRAVA | 5551-5580 | 16,01 | Pășune | Culme – versant- alunecari | Neuniform |
| Altitudine: 400-500 Expoziție: N Înclinație: 30-35% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul) | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 8 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 20% vegetație lemnoasă | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 4– 5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 10- 12 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| <p>Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O), îngrășământ organic 25 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; tălire organizată; folosire rațională a pajiștii. scoaterea cioatelor, taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.</p> <p>- cu angajament de agro-mediu:; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.</p> | | | | | | |

45.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.160 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | DEALUL VIILOR | 5665 | 28,02 | Pășune | Deal | Neuniform |
| Altitudine: 250-300 Expoziție: E-S Înclinație: 25° Sol: Stagnosol eluvic | | | | | | |

Datele staționale suplimentare (dacă este cazul):

Tipul de pajiște: *Juncus cflusus-Molinia coerulea*

50% Graminee: *Juncus cflusus-Molinia coerulea* 50%

15 % Leguminoase: *Trifolium sp.* (10%), *Coronilla varia* (1%), *Medicago sativa* (2%), *Lotus corniculatus* (2%)

18% Diverse plante: *Aquilea millefolium* (10%); *Achillea melifolium* (3%); *Taraxacum sp.* (2%); 3% alte plante (*Daucus carota*, *Prunella vulgaris*, *Potentilla sp.*, *Rumex sp.*, *Agrimonia eupatoria*...)

2% Plante dăunătoare și toxice: *Carduus sp.*, *Allium ursinum*, *Eryngium campestre*

Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95%

Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3 – 5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15t/ha)

10% Vegetația lemnoasă: rar *Crataegus monogyna*, *Rosa canina*, tineri

Lucrări executate.

Lucrări propuse; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 80 kg/ha P₂O₅, 80kg/ha), ing.org.30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.

- **cu angajament de agro-mediu;** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

Descriere parcelara Pasuni- Seica Mare.

1.

| U.A.T. | Trupul de pajiște | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Șeica Mare | Deal în vale | 2-11 | 8,25 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: SUD Înclinație: 5 -35° Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 18% Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderale</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 8% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 98% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.25to/ha , supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire | | | | | | |

organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.

- **cu angajament de agro-mediu;** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

2.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 3 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|--------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | LA GARA | 45 | 0,11 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 100-250 Expoziție: S Înclinație: 10-15° Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); | | | | | | |
| 15% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (5%), <i>Lotus corniculatus</i> (5%), <i>Medicago lupulina</i> (3%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 4 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 92 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 4 –5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15 t/ha) | | | | | | |
| 12 % Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.25to/ha , supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

3.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 16 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
|--------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|

| | | | | | | |
|--|-----------------|---------|------|--------|-------|-----------|
| Șeica Mare | Dealul Furcilor | 397-404 | 2,63 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: V Înclinație: 5-25% Sol: Stagnosol eluvic | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> | | | | | | |
| 20 % Graminee: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> 20% | | | | | | |
| 15 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 10%, <i>Coronilla varia</i> (1%), <i>Medicago sativa</i> (2%), <i>Lotus corniculatus</i> (2%) | | | | | | |
| 3% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (10%); <i>Achillea melifolium</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 2% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Allium ursinum</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3 – 5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15t/ha) | | | | | | |
| 60% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri | | | | | | |
| Lucrări executate. | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - <u>cu angajament de agro-mediu</u> : interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

4.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 19 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Balcau | 484-524 | 17,98 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 420 Expoziție: N Înclinație: 35-40 % Sol: Aluviosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> | | | | | | |
| 30% Graminee: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> (30%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 3 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderae</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 45% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.25to/ha supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - <u>cu angajament de agro-mediu</u> : interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

5.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 21 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | BALCAU | 595-622 | 1,38 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350 Expoziție: N Înclinație: : 35% Sol: Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 25% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (25%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 3 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 55% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.25to/HA , supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

6.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 22 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Dealul Furcilor | 667-676 | 5,97 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 400 Expoziție: V Înclinație: 20° Sol: : Stagnosol eluvic | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> | | | | | | |
| 20 % Graminee: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> 20% | | | | | | |
| 5 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> (2%), <i>Coronilla varia</i> (1%), <i>Medicago sativa</i> (1%), <i>Lotus corniculatus</i> (1%) | | | | | | |
| 1% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (10%); <i>Achillea millefolium</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 2% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Allium ursinum</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 99% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3 – 5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15t/ha) | | | | | | |
| 70% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri | | | | | | |
| Lucrări executate. | | | | | | |

Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 80 kg/ha P₂O₅, 80kg/ha K₂O), ing.org.30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.

- **cu angajament de agro-mediu;** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

7.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 26 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Gaura Portii</i> | 760-775 | 15,48 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 450 Expoziție: S-E Înclinație: 50-55% Sol: Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 45% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (45%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 3 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderaie</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 35% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha , supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

8.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 28 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Gura Portii</i> | 864-866 | 18,16 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 450 Expoziție: vest Înclinație: 20-60° Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 48% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (48%); | | | | | | |
| 15% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (9%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (1%) | | | | | | |
| 4 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |

| |
|---|
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 98 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 4 –5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15 t/ha) |
| 30 % Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> |
| Lucrări executate: |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.25to/ha , supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

9.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 29 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Malai</i> | 957-965 | 4,43 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300-350 Expoziție: N Înclinație: 25-30 Sol: Luvosol stagnic | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Festuca rupicola-Agrostis capilaris</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: : <i>Festuca rupicola-Agrostis capilaris</i> (60%); | | | | | | |
| 5% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 4 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 4 –5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15 t/ha) | | | | | | |
| 25 % Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (170kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.35to/ha , supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

10.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 31 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Malai</i> | 1018-996 | 6,41 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 320-350 Expoziție: N-E Încălnație: 30-35 Sol: Iuvosol stagnic | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Festuca rupicola-Agrostis capilaris</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: : <i>Festuca rupicola-Agrostis capilaris</i> (50%); | | | | | | |
| 20% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (12%), <i>Lotus corniculatus</i> (4%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 4 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderaie</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 85% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 4 -5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15 t/ha) | | | | | | |
| 10% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> ... | | | | | | |
| Lucrări executate: supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu.: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |
| Lucrări propuse: curatire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (170kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.35to/ha , supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii, scoaterea cioatelor,taierea arbustilor | | | | | | |

11

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 41 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Coasta Rapii</i> | 1428 | 0,26 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300-350 Expoziție: S Încălnație: 25-30 Sol: Regosol eutric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaeumum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaeumum</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderaie</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 3% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 88 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 - 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curatire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 70 kg/ha K ₂ O),ing.org.30 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire | | | | | | |

organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.

- **cu angajament de agro-mediu;** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

12.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 43 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Dealul Teis</i> | 1521-1524 | 0,76 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: V-S Înclinație: 40-45 Sol: Regosol eutric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Brachypodium pinnatum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Brachypodium pinnatum</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 2% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 97% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3– 5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 6 ovine/ha (producție de 10 -1 2 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 70 kg/ha K ₂ O),ing.org.30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

13.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 44 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Coasta Marului</i> | 1556-1563 | 0,20 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 450-500 Expoziție: S-V Înclinație: 50-55 Sol: Aluviosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> | | | | | | |
| 55% Graminee: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> (55%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 5% vegetatie lemnoasa | | | | | | |

| |
|---|
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

14.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 45 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Șeica Mare | Coasta marului | 1615-1690 | 0,22 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 420-480 Expoziție: S-V Înclinație: 50-55 Sol: Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 45% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (45%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderale</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> ... | | | | | | |
| 15% vegetație lemnoasă | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (160kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ing.org.30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

15

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 61 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--------|---------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|
|--------|---------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|

| | | | | | | |
|---|------------|-----------|-------|--------|-------|-----------|
| Șeica Mare | Valea mare | 2016-2017 | 15,38 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Alitudine: 450-500 Expoziție: S Înclinație: 30-35 Sol: Preluvosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): versanti umbriti | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Festuca rubra</i> | | | | | | |
| 45% Graminee: <i>estuca rubra</i> (45%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 13 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 25% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ing.org.25to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - <u>cu angajament de agro-mediu;</u> interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

16.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 63 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Valea mare | 2033-2048 | 11,35 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Alitudine: 450-500 Expoziție: S-V Înclinație: 25-30 Sol: Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaeumum</i> | | | | | | |
| 48% Graminee: <i>Botriochloa ischaeumum</i> (48%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 13 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 20% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 93 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.25.to./ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - <u>cu angajament de agro-mediu;</u> interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

17.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 70 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Intre lacuri</i> | 2224-5...2226 | 0,70 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 250-300 Expoziție: S-E Înclinație: 25% Sol: Gleiosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis canina-Phragmites</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Agrostis canina-Phragmites</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 2% vegetație lemnoasă | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 97% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 - 0,3 bovine/ha sau 1 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3– 4 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,5 bovină/ha sau 3 ovine/ha (producție de 7 - 10 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (160kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.30 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

18.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 76 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>In hedel</i> | 2401 | 0,26 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 400-450 Expoziție: E Înclinație: 35% Sol: faeoziom | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Festuca pratensis</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Festuca pratensis</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 18 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 15% vegetație lemnoasă | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (130kg/ha N, 40 kg/ha P ₂ O ₅ , 40 kg/ha K ₂ O), ing.org.20 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire | | | | | | |

organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.

- **cu angajament de agro-mediu:** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

19.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 77 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Pe visa</i> | 2430-2434 | 1,17 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: S Înclinație: 10-15 Sol: Aluvisol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 21 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 2% vegetație lemnoasă | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 99 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 3- 4 ovine/ha (producție masă verde 6 – 8 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (160kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org 30 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

20.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 90 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>redea</i> | 2939-2948 | 0,95 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 450 Expoziție: S Înclinație: 25-30% Sol: Gleiosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis canina-Phragmites</i> | | | | | | |
| 55% Graminee: <i>Agrostis canina-Phragmites</i> (55%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |

| |
|---|
| 20 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... |
| 3% vegetatie lemnoasa |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 - 0,3 bovine/ha sau 1 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3– 4 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,5 bovină/ha sau 3 ovine/ha (producție de 7 - 10 t/ha) |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80 kg/ha K ₂ O),ing.org 30 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. |
| - cu angajament de agro-mediu: ; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

21

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 91 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>La ochiuri</i> | 2962 | 0,02 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 430 Expoziție: S-V Înclinație: 25-30% Sol:Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 3% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 98% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii, scoaterea cioatelor,taierea arbustilor | | | | | | |

22

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 93 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>grivoaia</i> | 3086-3093 | 0,25 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 420 Expoziție: S-V Înclinație: 30-35 Sol: Regosol eutric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |

| |
|---|
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... |
| 20 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... |
| 5% vegetatie lemnoasa |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 98% |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 70 kg/ha K ₂ O),ing.org.30t0/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |
| |
| |

23

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 94 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Lanul lui Ionuț</i> | 3118-3124 | 0,25 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Alitudine: 430 Expoziție: S-V Înclinație: 25-30% Sol: : Regosol eutric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 18 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 25% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (160kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 70 kg/ha K ₂ O),ing.org.30t0/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

24

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 95 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Capul Barcului</i> | 3139 | 0,15 | Pășune | Culme | Neuniform |

Altitudine: 450 Expoziție: S Înclinație: 25-30 Sol: regosol kalcaric

Datele staționale suplimentare (dacă este cazul):

| |
|--|
| Tipul de pajiște: <i>Brachypodium pinnatum</i> |
| 60% Graminee: <i>Brachypodium pinnatum</i> (60%); |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... |
| 2% vegetatie lemnoasa |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 97 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3– 5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 6 ovine/ha (producție de 10 -1 2 t/ha) |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ing.org.25to/ha supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. |
| - <u>cu angajament de agro-mediu</u> : interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

25

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 98 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Valea PUNTI</i> | 3196 | 0,56 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 450 Expoziție: S Înclinație: 25% Sol:Aluviosol kalcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> | | | | | | |
| 40% Graminee: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> (40%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 18 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 25% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (160kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ing.org.30to/ha supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire | | | | | | |

repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatare.

- **cu angajament de agro-mediu;** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

26

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 105 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Valea Mighindoalei</i> | 3307 | 0,22 | Pășune | Culme | Neuniform |

Altitudine: 350 Expoziție: V Înclinație: 25% Sol: Regosol calcaric

Datele staționale suplimentare (dacă este cazul):

Tipul de pajiște: *Botriochloa ischaemum*

50% Graminee: *Botriochloa ischaemum* (50%);

5% Leguminoase: *Medicago falcata* (3%), *Lotus corniculatus* (3%), *Medicago lupulina* (2%), *Trifolium campestre* (2%)

4 % Diverse plante: *Potentilla erecta*, *Prunella vulgaris*, *Geranium pratense*...

1 % Plante dăunătoare și toxice: *Euforbia cyparissias*, *Veratum album*, *Xanthium sp.*, *Lepidium ruderalis*, *Xeranthemum annuum*

Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 90%

Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 4 –5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15 t/ha)

30 % Vegetația lemnoasă: *Crataegus monogyna*, *Rosa canina*....

Lucrări executate:

Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O), ing.org.30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatare.

- **cu angajament de agro-mediu;** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

27

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 106 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Sub gearman</i> | 3389 | 3,02 | Pășune | Culme | Neuniform |

Altitudine: 350-400 Expoziție: S-V Înclinație: 5-35° Sol: Regosol calcaric

Datele staționale suplimentare (dacă este cazul):

Tipul de pajiște: *Botriochloa ischaemum*

50% Graminee: *Botriochloa ischaemum* (50%);

5% Leguminoase: *Medicago falcata* (3%), *Lotus corniculatus* (3%), *Medicago lupulina* (2%), *Trifolium campestre* (2%)

4 % Diverse plante: *Potentilla erecta*, *Prunella vulgaris*, *Geranium pratense*...

| |
|---|
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 4 –5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15 t/ha) |
| 30 % Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> |
| Lucrări executate: |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

28

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 113 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Zapodia cu rapii</i> | 3550 | 1,38 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: S-V Înclinație: 5-35° Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (50%); | | | | | | |
| 5% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 4 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> | | | | | | |
| 30 % Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 4 –5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ing.org.30 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

29.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 114 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Zapodia morii</i> | 3653 | 0,27 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Alitudine: 530 Expoziție: S-V Înclinație: 10° Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 40% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (40%); | | | | | | |
| 5% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 4 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> | | | | | | |
| 40% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 90 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 4 -5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 12 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: distrugerea vegetației lemnoase și reinsămânțare, curățire repetată de plante dăunătoare; fertilizare anuală (160 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing. org. 30 t/ha. supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii. scoaterea cioatelor, taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatare. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

30

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 115 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Zapodia domnului</i> | 3676-3680 | 1,43 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Alitudine: 200-250 Expoziție: E Înclinație: 2-15° Sol: Luvosol stagnogleizat puternic. | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): <i>Nardus stricta</i> | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Nardus stricta</i> | | | | | | |
| 40% Graminee: <i>Nardus stricta</i> (20%); <i>Agrostis sp.</i> (10%); <i>Phleum pratense</i> (5%); 5% alte graminee (<i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Poa sp.</i> , <i>Avena sp.</i> , <i>Carex sp.</i> ...) | | | | | | |
| 15 % Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (5%); <i>Lotus corniculatus</i> (5%); <i>Medicago lupulina</i> (3%); <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 7% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (4%); <i>Potentilla erecta</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 11% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 3% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Eryngium campestre</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 - 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3-5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 3-4 ovine/ha (producție masă verde 10 - 12 t/ha) | | | | | | |

| |
|---|
| 30 % Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i>, <i>Rosa cania</i>: |
| Lucrări executate: |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și tufăriș; fertilizare anuală (190kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80 kg/ha K ₂ O),ing.org.35 kg/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

31

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 116 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Coasta hampului</i> | 3732-3785 | 2,0 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 200-250 Expoziție: E Înclinație:2-15° Sol: Luvosol stagnogleizat puternic. | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): <i>Nardus stricta</i> | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Nardus stricta</i> | | | | | | |
| 35% Graminee: <i>Nardus stricta</i> (20%); <i>Agrostis sp.</i> (5%); <i>Phleum pratense</i> (5%); 5% alte graminee (<i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Poa sp.</i> , <i>Avena sp.</i> , <i>Carex sp...</i>) | | | | | | |
| 12 % Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (5%); <i>Lotus corniculatus</i> (3%); <i>Medicago lupulina</i> (3%); <i>Trifolium campestre</i> (1%) | | | | | | |
| 9 % Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (4%); <i>Potentilla erecta</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 11% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria...</i>) | | | | | | |
| 1% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Eryngium campestre</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 92% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3–5t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 3-4 ovine/ha (producție masă verde 10 - 12 t/ha) | | | | | | |
| 35% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și tufăriș; fertilizare anuală (190kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80 kg/ha K ₂ O),ing.org.35 kg/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

32.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 119 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Dealul mighindoalei</i> | 4023-4028 | 4,54 | Pășune | Culme | Neuniform |

| |
|--|
| Altitudine: 450-500 Expoziție: N-S Înclinație: 30-35 Sol: regosol |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): |
| Tipul de pajiște: Brachypodium pinnatum |
| 40 % Graminee : Brachypodium pinnatum (40%); |
| 10 % Leguminoase <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderale</i>, <i>Xeranthenum annuum</i>... |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3–5t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 3-4 ovine/ha (producție masă verde 10 - 12 t/ha) |
| 20% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i>, <i>Rosa canina</i> |
| Lucrări executate: |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și tufăriș; fertilizare anuală (190kg/ha N, 80 kg/ha P₂O₅, 80 kg/ha K₂O),ing.org.35 kg/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. |
| - cu angajament de agro-mediu;; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

33.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 120 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Nasandoala</i> | 4113-4142 | 0,90 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: S-V Înclinație: 25-30% Sol:Aluviosol eutric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 13 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderale</i>, <i>Xeranthenum annuum</i>... | | | | | | |
| 10% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 80 kg/ha P₂O₅, 70kg/ha K₂O),ing.org.30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de | | | | | | |

exploatație.

- **cu angajament de agro-mediu;** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

34

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 122 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Nucari</i> | 4174-4182 | 7,80 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 450-500 Expoziție: S Încălțare: 35-40% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaeumum</i> | | | | | | |
| 20% Graminee: <i>Botriochloa ischaeumum</i> (20%); | | | | | | |
| 5% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (2%), <i>Lotus corniculatus</i> (1%), <i>Medicago lupulina</i> (1%), <i>Trifolium campestre</i> (1%) | | | | | | |
| 3 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 65% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org 30to/ha. supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

35

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 124 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Valea viilor</i> | 4321 | 0,18 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 500-530 Expoziție: N—E-S Încălțare: 35% Sol:Aluviosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis stolonifera-Agrophyron repens</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Agrostis stolonifera-Agrophyron repens</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |

| |
|---|
| 13 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderale</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... |
| 10% vegetatie lemnoasa |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ing.org 30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cei puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

36

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 128 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Sesul steniei</i> | 4397-4409 | 2,81 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: S Înclinație: 5-10° Sol: Faeoziom calcaric | | | | | | |
| Tipul de pajiște; <i>Agrostis capilaris-Festuca rupicola</i> | | | | | | |
| 30 % Graminee <i>Agrostis capilaris-Festuca rupicola</i> 30% | | | | | | |
| 23% Leguminoase: <i>Tripholium sp.</i> (20%), <i>Medicago sativa</i> (2%), <i>Lotus corniculatus</i> (1%) | | | | | | |
| 5% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (4%); <i>Thymus vulgaris</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 1% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,6 – 0,8 bovine/ha sau 4 -5 ovine/ha (producție masă verde 7– 10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovină/ha (producție masă verde 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| 35% Vegetația lemnoasă: rar <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; curățire și ; fertilizare anuală (135 kg/ha N, 50 kg/ha P ₂ O ₅ , 50 kg/ha K ₂ O),ingrasamint org. 20to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

37

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 130 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--------|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
|--------|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|

| | | Top. | | | | |
|--|----------------------|-----------|------|--------|-------|-----------|
| Șeica Mare | <i>Sesul steniei</i> | 4450-4457 | 0,28 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: N Înclinație: 45% Sol: Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaeumum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaeumum</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 10% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org 30to/ha. supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu.; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

38

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 131 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Sesul steniei</i> | 4480-4506/02 | 3,11 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: N Înclinație: 47% Sol: Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaeumum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaeumum</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 3 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 30% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org 30to/ha. supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu.; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau | | | | | | |

gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

39.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 131 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Sesul steniei</i> | 4527-4559 | 2,28 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: s Înclinație: 40-45 % Sol: Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 13 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderale</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> ... | | | | | | |
| 10% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org 30to/ha. supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - <u>cu angajament de agro-mediu</u> : interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

40.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 133 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Sesul steniei</i> | 4582-4591 | 8,13 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: S Înclinație: 40-45 % Sol: Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 20% Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderale</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> ... | | | | | | |
| 5% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 93 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 | | | | | | |

t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha)

Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O), supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.

- **cu angajament de agro-mediu;** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

41

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 134 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Sesul steniei</i> | 4669-4691 | 2,01 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: S-N Înclinație: 45% Sol: Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> ... | | | | | | |
| 10% vegetație lemnoasă | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ing.org.25to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

42

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 135 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Inuri</i> | 4722-4771 | 1,92 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 600 Expoziție: N Înclinație: 5-15% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |

| |
|---|
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) |
| 8 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderale</i>, <i>Xeranthenum annuum</i>... |
| 15% vegetatie lemnoasa |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 6 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8bovină/ha sau 4 ovine/ha (producție de 10- 12 t/ha) |
| Lucrări executate: |
| Lucrări propuse: Taiere arboret,reinsamantare, fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamant organic 25 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

43

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 138 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Șeica Mare | <i>Sesul Buii</i> | 4906 | 0,08 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 250-300 | | Expoziție: E -S | | Înclinație: 5-10% | | Sol: Regosol calcaric |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (0%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 8 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 10% Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderale</i>, <i>Xeranthenum annuum</i>... | | | | | | |
| 20% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei:98% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 6 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamant organic 25 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 139 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Sesul buii</i> | 4923-4949 | 0,41 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350 Expoziție: E-S Înclinație: 25-30% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); | | | | | | |
| 15% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (5%), <i>Lotus corniculatus</i> (5%), <i>Medicago lupulina</i> (3%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 12 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 3% Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 5% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 6 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), îngrășământ organic 25 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii. scoaterea cioatelor, taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - <u>cu angajament de agro-mediu</u> ; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 140 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Dealul sibiului</i> | 4967-5009 | 1,69 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 250-300 Expoziție: NORD Înclinație: 15 -25° Sol: Faeoziom | | | | | | |
| Datele staționale (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Festuca rupicola</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Festuca rupicola</i> (60%); | | | | | | |
| 15% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (5%), <i>Lotus corniculatus</i> (5%), <i>Medicago lupulina</i> (3%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 12 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 7% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 96% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,6 - 0,8 bovine/ha sau 3 - 5 ovine/ha (producție masă verde 6– 8 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8-1,0bovină/ha sau 5 -6 ovine/ha (producție de 15- 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |

Lucrări propuse: fertilizare anuală (130 kg/ha N, 40 kg/ha P₂O₅, 40 kg/ha K₂O), îngrășământ organic 205t/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor, taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.

- **cu angajament de agro-mediu:** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

46

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 146 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Fagetul lui bela</i> | 5195 | 1,10 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: N Înclinație: 20-25@ Sol: Aluviosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 10% vegetație lemnoasă | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing org 30t/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor, taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

47.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 147 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Gruu morii</i> | 5317 | 6,99 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: N-E Înclinație: 25-30% Sol: Regosol eutric | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 55% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (55%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 8 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , | | | | | | |

| |
|--|
| <i>Xeranthemum annuum...</i> |
| 20% vegetatie lemnoasa |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei:95 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 6 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) |
| Lucrări executate: |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamant organic 25 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. |
| - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

48

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 148 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Faget</i> | 5530 | 2,52 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 450-500 Expoziție: S-E Înclinație: 25-30% Sol: regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaeumum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaeumum</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 8 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense...</i> | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderales</i>, <i>Xeranthemum annuum...</i> | | | | | | |
| 25% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei:95% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 6 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamant organic 25 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

49

| U.A.T. | Trupul de pajiște T149 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Zapodia nucilor</i> | 5374-5390 | 0,39 | Pășune | Culme | Neuniform |

| | | | |
|---|------------------------|---------------------------|--|
| Altitudine: 200-250 | Expoziție: NORD | Înclinație: 5 -25° | Sol: Faeoziom argic,clinogleic. |
| Datele staționale (dacă este cazul): | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Festuca rupicola</i> | | | |
| 50% Graminee: <i>Festuca rupicola</i> (50%); | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | |
| 8 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderale</i>, <i>Xeranthenum annuum</i>... | | | |
| 25% vegetatie lemnoasa | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei:95 % | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,6 - 0,8 bovine/ha sau 3 - 5ovine/ha (producție masă verde 6– 8 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8-1,0bovină/ha sau 5 -6 ovine/ha (producție de 15- 20 t/ha) | | | |
| Lucrări executate: | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (140 kg/ha N, 40 kg/ha P₂O₅, 30 kg/ha K₂O),ingrasamant organic 20 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arbuștilor. | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (145kg/ha N, 30 kg/ha P₂O₅, 30kg/ha K₂O),ing.org 30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | |
| - cu angajament de agro-mediu.; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | |

50

| U.A.T. | Trupul de pajiște | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Cioara</i> | 5469-5471 | 0,95 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350 Expoziție: N-V Înclinație: 5-15° Sol: Stagnosol preluvic | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> | | | | | | |
| 60 % Graminee: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> 60% | | | | | | |
| 15 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> (10%), <i>Coronilla varia</i> (1%), <i>Medicago sativa</i> (2%), <i>Lotus corniculatus</i> (2%) | | | | | | |
| 12% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (8%); <i>Achillea melifolium</i> (2%); <i>Taraxacum sp.</i> (1%); 1% alte plante (<i>Daucus carota</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Potentilla sp.</i>, <i>Rumex sp.</i>, <i>Agrimonia eupatoria</i>...) | | | | | | |
| 5% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i>, <i>Allium ursinum</i>, <i>Eryngium campestris</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3 – 5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15t/ha) | | | | | | |
| 3% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i>, <i>Rosa canina</i>, tineri | | | | | | |
| Lucrări executate. | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 80 kg/ha P₂O₅, 80kg/ha K₂O), ing.org.30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire | | | | | | |

repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.

- **cu angajament de agro-mediu:** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

51.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 153 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Ograda</i> | 5476-5484/2 | 0,87 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 250-300 Expoziție: E-S Înclinație: 5-10% Sol: regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 35% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (35%); | | | | | | |
| 5% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (2%), <i>Lotus corniculatus</i> (1%), <i>Medicago lupulina</i> (1%), <i>Trifolium campestre</i> (1%) | | | | | | |
| 3 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderaie</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> ... | | | | | | |
| 50% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei:95% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 6 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamant organic 25 to/ha., supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

52

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 154 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Pisc</i> | 5497/02 | 0,37 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine 350-440 Expoziție: S-V Înclinație: 15-20% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 10% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (10%); | | | | | | |
| 3% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 5 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |

| |
|--|
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderale</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... |
| 75% vegetatie lemnoasa |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei:95% |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 6 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) |
| Lucrări executate: |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamant organic 25 to/ha., supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |
| Lucrări propuse: Taierea arboretului,reinsamantare, fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamant organic 25 to/ha. |

53.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 156 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Pisc</i> | 5534 | 0,05 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine 350-440 Expoziție: S-V Înclinație: 15-20% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 8 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 7 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderale</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 20% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei:95% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 6 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamant organic 25 to/ha., supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |
| Lucrări propuse: Taierea arboretului,reinsamantare, fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamant organic 25 to/ha. | | | | | | |

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 158 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Dumbrava</i> | 5582-5588 | 10,57 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 400-420 Expoziție: E Înclinație: 20-25% Sol: Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 48% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (48%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 15 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 20% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - <u>cu angajament de agro-mediu</u> : interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 159 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Dealul viilor</i> | 5635-5658 | 3,26 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 450-500 Expoziție: S Înclinație: 40-45 % Sol: Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 13 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 20% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - <u>cu angajament de agro-mediu</u> : interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau | | | | | | |

gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

56

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 161 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Dealul viilor</i> | 5681 | 5,16 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 450-500 Expoziție: S-V Înclinație: 35-40% Sol:livosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Festuca rupicola-Agrostis capilaris</i> | | | | | | |
| 55% Graminee: : <i>Festuca rupicola-Agrostis capilaris</i> (55%); | | | | | | |
| 5% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 4 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderale</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> | | | | | | |
| 30% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> ... | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 4 –5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (170kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), îng.0,35t/ha , supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

57

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 162 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Dealul viilor</i> | 5709-5733 | 45,60 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 450-500 Expoziție: S-V Înclinație: 40-45% Sol:livosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Festuca rupicola-Agrostis capilaris</i> | | | | | | |
| 55% Graminee: : <i>Festuca rupicola-Agrostis capilaris</i> (55%); | | | | | | |
| 15% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (7%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (3%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 9 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderale</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> | | | | | | |

| |
|---|
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 4 –5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15 t/ha) |
| 10 % Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i>, <i>Rosa canina</i>... |
| Lucrări executate: |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (190kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80 kg/ha K ₂ O), ing.org.305o/ha , supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

58

| U.A.T. | Trupul de pajiște | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Șeica Mare | Dealul viilor | Top. 5753 | 0,01 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 450-500 Expoziție: S-N Înclinație: 40-45% Sol: regosol eutric | | | | | | |

Datele staționale suplimentare (dacă este cazul):

| |
|---|
| Tipul de pajiște: <i>Brachypodium pinnatum</i> |
| 55% Graminee: <i>Brachypodium pinnatum</i> (55%); |
| 15% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (7%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) |
| 9 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... |
| 15% vegetație lemnoasă |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 96 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3–5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 6 ovine/ha (producție de 10 -1 2 t/ha) |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ing.org 30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 165 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Dealul ciori</i> | 5826-5830 | 1,98 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 500-520 Expoziție: N-E Înclinație: 40-43% Sol: Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaeumum</i> | | | | | | |
| 55% Graminee: <i>Botriochloa ischaeumum</i> (55%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 9% Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 3% Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> ... | | | | | | |
| 15% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 92 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 - 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org 30to/ha supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor, taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

| U.A.T. | Trupul de pajiște T.168 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>DEALU CIORI</i> | 5878-5907 | 4,84 | Pășune | culme | Neuniform |
| Altitudine: 350 Expoziție: N-V Înclinație: 5-15° Sol: Stagnosol preluvic | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> | | | | | | |
| 50 % Graminee: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> 50% | | | | | | |
| 15 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> (10%), <i>Coronilla varia</i> (1%), <i>Medicago sativa</i> (2%), <i>Lotus corniculatus</i> (2%) | | | | | | |
| 18% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (10%); <i>Achillea melifolium</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 2% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Allium ursinum</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 - 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3 - 5 | | | | | | |

| |
|--|
| t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15t/ha) |
| 10% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri |
| Lucrări executate. |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

61

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 173 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Pasunea sasiilor</i> | 6128 | 0,11 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 250 Expoziție: E Înclinație:1- 25° Sol: luvosol stagnogleizat slab | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște; Festuca rubra | | | | | | |
| 45% Festuca rubra | | | | | | |
| 10 % Leguminoase: <i>Tripholium sp.</i> (5%), <i>Medicago sativa</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (2%) | | | | | | |
| 18% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (10%); <i>Thymus vulgaris</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 2% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 – 0,6 bovine/ha sau 2 -3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovină/ha (producție masă verde 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| 20% Vegetația lemnoasă: rar <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; curățire și ; fertilizare anuală (180 kg/ha N, 70 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamint org. 35to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

62

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 174 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
|--------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|------|-------------------|-------|-----------------------|
| Șeica Mare | Zapodia cetatii | 6179-6202 | 4,08 | Pășune | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 250-300 | | Expoziție: VEST | | Înclinație: 5-30% | | Sol: Regosol calcaric |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaeumum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaeumum</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 8 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderale</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> ... | | | | | | |
| 35% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| <p>Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O),ingrasamant organic 25 to/ha,. supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.</p> <p>- cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.</p> | | | | | | |

DESCRIERE PARCELARĂ FÂNEȚE -ȘEICA MARE

1.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 2 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Deal în Vale</i> | 13-30/2 | 57,38 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: SUD Înclinație: 5 -35° Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| 60% Graminee <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 15 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 8% vegetație lemnoasă; <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 3- 4 ovine/ha (producție masă verde 5-7t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 12 - 15t/ha);VP-5-25.;Slaba. | | | | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), îngrășământ organic 25 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

2.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 3 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>La Gara Șeica Mare</i> | 38-2-61 | 17,64 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 100-250 Expoziție: S Înclinație: 10-15° Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (50%); | | | | | | |
| 15% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (7%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (3%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 12 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 3 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , | | | | | | |

| |
|--|
| <i>Xeranthemum annuum</i> |
| 15 % Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna, Rosa canina</i> |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5-7 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 12 - 15 t/ha) |
| Lucrări executate: |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu.; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

3.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 4 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>La Strâmturi</i> | 64-79 | 4,01 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 250 Expoziție: E Înclinație: 5-10% Sol: Aluviosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 20 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta, Prunella vulgaris, Geranium pratense...</i> | | | | | | |
| 2% Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias, Veratrum album, Xanthium sp., Lepidium ruderaie, Xeranthemum annuum...</i> | | | | | | |
| 3% vegetație lemnoasă | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,6 - 0,8 bovine/ha sau 3 - 5 ovine/ha (producție masă verde 7-12 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha)VP;25-50 | | | | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.25to/ha supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu.; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

4.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 6 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Lunci</i> | 92-95 | 0,11 | Fânețe | Culme | Neuniform |

| |
|--|
| Altitudine: 250 Expoziție: E Înclinație: 5-10% Sol: Aluviosol |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> |
| 55% Graminee: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> (55%); |
| 21% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (15%), <i>Lotus corniculatus</i> (4%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) |
| 17 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... |
| 3 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderales</i>, <i>Xeranthemum annuum</i>... |
| 4% vegetație lemnoasă |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.25to/ha supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. |
| - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

5

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 7 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | La Șeica | 101-139 | 24,20 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300-350 Expoziție: S Înclinație: 35-40% Sol: Luvosol stagnic | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Festuca rupicola-Agrostis capilaris</i> | | | | | | |
| 40% Graminee: : <i>Festuca rupicola-Agrostis capilaris</i> (40%); | | | | | | |
| 12% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (6%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (1%) | | | | | | |
| 8% Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 5 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderales</i>, <i>Xeranthemum annuum</i> | | | | | | |
| 25 % Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i>, <i>Rosa canina</i>.... | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 90% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,6 - 0,8 bovine/ha sau 3 - 5 ovine/ha (producție masă verde 4-10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5-6 ovine/ha (producție de 12 - 15 t/ha)VP;25-50. | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (170kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.35to/ha , supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor arbustilor cu acordul Ocolului silvic, pentru curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală | | | | | | |

6.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 8 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Pârăul Ursului</i> | 152-161/4 | 17,94 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300-350 Expoziție: S Înclinație: 35-40% Sol: Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (50%); | | | | | | |
| 16% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (7%), <i>Lotus corniculatus</i> (5%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 12% Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2% Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> | | | | | | |
| 15% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> ... | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5-7 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 12 - 15 t/ha) | | | | | | |
| <p>Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O), ing.org.25to/ha supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.</p> <p>- cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.</p> | | | | | | |

7.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 9 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Pârăul Ursului</i> | 169-185/11 | 12,09 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine:300-350 Expoziție: S Înclinație: 35-40 Sol: Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (50%); | | | | | | |
| 15% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (7%), <i>Lotus corniculatus</i> (5%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (1%) | | | | | | |
| 12 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 3% Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> | | | | | | |
| 15 % Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> . | | | | | | |

| |
|--|
| ... |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 –7 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 12 - 15 t/ha) |
| Lucrări executate: |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.25to/ha supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală., |

8.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 10 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>La Șeica</i> | 192-252 | 40,91 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 250-300 Expoziție: S Înclinație:35% Sol: Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaeumum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaeumum</i> (50%); | | | | | | |
| 15% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (8%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 14 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 92 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5–7 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| 12% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> ... | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.25to/ha , supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

9.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 11 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Șesul Râpii</i> | 256-276 | 15,26 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 250-300 Expoziție: E Înclinație: 15-20% Sol: Aluviosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 18 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 5% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.25to/ha supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; tălire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - <u>cu angajament de agro-mediu:</u> interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

10.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 12 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Șesul Râpii</i> | 279-299 | 4,01 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300-320 Expoziție S Înclinație: 25--35 Sol: Luvosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Festuca rubra</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: : <i>Festuca rubra</i> (60%); | | | | | | |
| 18% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (8%), <i>Lotus corniculatus</i> (6%), <i>Medicago lupulina</i> (3%), <i>Trifolium campestre</i> (1%) | | | | | | |
| 11% Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 3% Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> | | | | | | |
| 3 % Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: : în condiții actuale 0,6 - 0,8 bovine/ha sau 3 - 5 ovine/ha (producție masă verde 5-10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5-6 ovine/ha (producție de 12 - 15 t/ha)VP;25-50. | | | | | | |

3 % Vegetația lemnoasă: *Crataegus monogyna*, *Rosa canina*....**Lucrări executate:**

Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (170kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O), ing.org.35to/ha , supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii, scoaterea cioatelor, taierea arbuștilor, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii. scoaterea cioatelor, taierea arborilor, arbuștilor cu acordul Ocolului silvic; pentru curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.

- **cu angajament de agro-mediu;** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală

11.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 13 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Valea Lupului</i> | 306-312 | 0,96 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: Expoziție:250-300 Vestică S Înclinație: 15-20%Sol: Faeziom calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște; Agrostis capilaris-Festuca rupicola | | | | | | |
| 50 % Graminee Agrostis capilaris-Festuca rupicola 50% | | | | | | |
| 12% Leguminoase: <i>Tripholium sp.</i> (6%), <i>Medicago sativa</i> (4%), <i>Lotus corniculatus</i> (2%) | | | | | | |
| 18% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (10%); <i>Thymus vulgaris</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante (<i>Daucus carota</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Potentilla sp.</i>, <i>Rumex sp.</i>, <i>Agrimonia eupatoria</i>...) | | | | | | |
| 5 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i>, <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,6 – 0,8 bovine/ha sau 4 -5 ovine/ha (producție masă verde 5– 15 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovină/ha (producție masă verde 15 - 20 t/ha), VP 25-50. | | | | | | |
| 15% Vegetația lemnoasă: rar <i>Crataegus monogyna</i>, <i>Rosa canina</i>, tineri | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; curățire și ; fertilizare anuală (135 kg/ha N, 50 kg/ha P ₂ O ₅ , 50 kg/ha K ₂ O),ingrasamint org. 20to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor arbuștilor cu acordul Ocolului silvic, pentru curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală t/ha.... | | | | | | |

12.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 14 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Valea Lupului</i> | 318-341 | 7,52 | Fânețe | Culme | Neuniform |

| |
|--|
| Altitudine: 350-400 Expoziție: S Înclinație: 15-20% Sol: Gleiosol |
| Tipul de pajiște; Agrostis canina-Phragmites australis |
| 50 % Graminee Agrostis canina-Phragmites 50% |
| 22 % Leguminoase: <i>Tripholium sp.</i> (18%), <i>Medicago sativa</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (1%) |
| 18% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (10%); <i>Thymus vulgaris</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante (<i>Daucus carota</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Potentilla sp.</i>, <i>Rumex sp.</i>, <i>Agrimonia eupatoria</i>...) |
| 2% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i>, <i>Eryngium campestre</i> |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 – 0,4 bovine/ha sau 2 -3 ovine/ha (producție masă verde 1-5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,6 bovină/ha sau 5 ovină/ha (producție masă verde 5 - 8 t/ha) V.P.O-15 |
| 3% Vegetația lemnoasă: rar <i>Crataegus monogyna</i>, <i>Rosa canina</i>, tineri |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 93 % |
| Lucrări executate: |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; curățire și ; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamint org. 30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor arbustilor cu acordul Ocolului silvic, pentru curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală t/ha.... |

13.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 15 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Valea Lupului | 346-353 | 2,62 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: S-E Înclinație: 15-20% Sol: Gleiosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște; Agrostis canina-Phragmites | | | | | | |
| 50 % Graminee Agrostis canina-Phragmites 50% | | | | | | |
| 15% Leguminoase: <i>Tripholium sp.</i> (10%), <i>Medicago sativa</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (2%) | | | | | | |
| 8% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (10%); <i>Thymus vulgaris</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante (<i>Daucus carota</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Potentilla sp.</i>, <i>Rumex sp.</i>, <i>Agrimonia eupatoria</i>...) | | | | | | |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i>, <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,6 – 0,8 bovine/ha sau 4 -5 ovine/ha (producție masă verde 7– 10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovină/ha (producție masă verde 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| 25% Vegetația lemnoasă: rar <i>Crataegus monogyna</i>, <i>Rosa canina</i>, tineri | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 99 % | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; curățire și ; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamint org. 30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |

- **cu angajament de agro-mediu:** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

14.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 16 | Parcela descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Dealul Furnicilor</i> | 391-427 | 3,46 | Fânețe | Versant | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: V Înclinație: 5-25% Sol: Stagnosol eluvic | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Juncus eflusus-Molinia coerulea</i> | | | | | | |
| 46 % Graminee: <i>Juncus eflusus-Molinia coerulea</i> 46% | | | | | | |
| 12 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> (6%), <i>Coronilla varia</i> (3%), <i>Medicago sativa</i> (2%), <i>Lotus corniculatus</i> (1%) | | | | | | |
| 10% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (10%); <i>Achillea millefolium</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 2% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Allium ursinum</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 1 – 5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 8 – 10 t/ha) VP 5-20 | | | | | | |
| 25% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , | | | | | | |
| Lucrări executate. | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha, , supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; tâlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor arbustilor cu acordul Ocolului silvic, pentru curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

15.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 18 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Sub Vii</i> | 435-480 | 32,76 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: S-E Înclinație: 115-25% Sol Gleiosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște; <i>Agrostis canina-Phragmites australis</i> | | | | | | |
| 50 % Graminee <i>Agrostis canina-Phragmites australis</i> 50% | | | | | | |
| 15% Leguminoase: <i>Tripholium sp.</i> (10%), <i>Medicago sativa</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (2%) | | | | | | |
| 18% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (10%); <i>Thymus vulgaris</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 2% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 90 % | | | | | | |

Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,6 – 0,8 bovine/ha sau 4 -5 ovine/ha (producție masă verde 7– 10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovină/ha (producție masă verde 15 - 20 t/ha)

5% Vegetația lemnoasă: rar *Crataegus monogyna*, *Rosa canina*,

Lucrări executate:

Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; curățire și ; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O),ingrasamint org. 30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.

- **cu angajament de agro-mediu:** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

16.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 19 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Bălcău | 487-552/1 | 25,33 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: S-V Înclinație: 20-25 % Sol: Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaeumum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaeumum</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 13 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> ... | | | | | | |
| 20% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12 - 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curatire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org 30to/ha. supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

17.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 20 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Bălcău | 567-576 | 12,21 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: S Înclinație: 25-30 % Sol: Luvosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Festuca rubra</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Festuca rubra</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 20 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 15% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 97% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (190kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80 kg/ha K ₂ O), ing.org 35to/ha. supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștili. scoaterea cioatelor, taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

18.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 21 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Bălcău | 587/1-621 | 28,71 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300-350 Expoziție: V Înclinație: 25-30% Sol: Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 10% Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 20% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 97 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org 30to/ha. supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire | | | | | | |

organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.

- **cu angajament de agro-mediu;** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

19.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 22 | Parcela descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Roaba | 624-669 | 7,91 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 400 Expoziție: V Înclinație: 20° Sol: : Stagnosol eluvic | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Juncus eflusus-Molinia coerulea</i> | | | | | | |
| 55 % Graminee: <i>Juncus eflusus-Molinia coerulea</i> 55% | | | | | | |
| 14 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> (8%), <i>Coronilla varia</i> (3%), <i>Medicago sativa</i> (2%), <i>Lotus corniculatus</i> (1%) | | | | | | |
| 8% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (3%); <i>Achillea melifolium</i> (2%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 1% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 3% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Allium ursinum</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 1– 5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 8 - 12t/ha) VP 5-20 | | | | | | |
| 15% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , | | | | | | |
| Lucrări executate. | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

20.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 25 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Pășunea Roaba | 714-718 | 2,74 | Fânețe | Versant | Neuniform |
| Altitudine: 430 Expoziție:-Vest Înclinație: 15° Sol: Stagnosol eluvic. | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> | | | | | | |
| 50 % Graminee: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> 50% | | | | | | |
| 15 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> (10%), <i>Coronilla varia</i> (1%), <i>Medicago sativa</i> (2%), <i>Lotus corniculatus</i> (2%) | | | | | | |
| 14% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> <i>Achillea melifolium</i> <i>Taraxacum sp.</i> ; alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 2% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Allium ursinum</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 96% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3 – 5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15t/ha) | | | | | | |

| |
|---|
| 15% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri |
| Lucrări executate. |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. |
| - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

21.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 26 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | <i>Dealul Furnicilor</i> | 726-811 | 30,40 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 250-300 Expoziție: S-V Înclinație: 25-30% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 20% Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 15% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 97 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12 - 15 t/ha) , | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

22.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 27 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | <i>Mălai și Vidigrenci</i> | 818-849 | 51,07 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 250-300 Expoziție: S Înclinație: 20-25% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |

| |
|---|
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaeumum</i> |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaeumum</i> (50%); |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) |
| 18% Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderales</i>, <i>Xeranthemum annuum</i>... |
| 15% vegetatie lemnoasa |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5– 7 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrării propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12 - 15 t/ha) , |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 80 kg/ha P₂O₅, 80kg/ha K₂O), ing.org.30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. |
| - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 28 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Gaura Porții | 855-882 | 13,76 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 450 Expoziție: vest Înclinație: 20-60° Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaeumum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaeumum</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (5%), <i>Lotus corniculatus</i> (2%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (1%) | | | | | | |
| 10 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 91 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 4 –5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15 t/ha) | | | | | | |
| 10 % Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5– 7 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12 - 15 t/ha) , | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha , supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu:; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

24.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 29 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Mălai | 887-970/2 | 24,69 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300-350 Expoziție: S-V Înclinație:20-25% Sol: Luvosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Festuca rupicola-Agrostis capilaris</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: : <i>Festuca rupicola-Agrostis capilaris</i> (60%); | | | | | | |
| 15% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (10%), <i>Lotus corniculatus</i> (2%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (1%) | | | | | | |
| 4 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 4 –5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15 t/ha) | | | | | | |
| 15 % Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 4– 7 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12 - 15 t/ha) , | | | | | | |

Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O), ing.org.30to/ha , supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.

- **cu angajament de agro-mediu:** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

25.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 31 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Mălai | 977-1039 | 36,25 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300-350Expoziție: S Înclinație:20-25 % Sol: | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Festuca rupicola-Agrostis capilaris</i> | | | | | | |
| 55% Graminee: : <i>Festuca rupicola-Agrostis capilaris</i> (55%); | | | | | | |
| 5% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 14 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderales</i>, <i>Xeranthemum annuum</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 80 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 4 – 5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4-5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15 t/ha) | | | | | | |
| 5% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i>, <i>Rosa canina</i>.... | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12 - 15 t/ha) , | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha , supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

26.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 32 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Valea Lupului | 1044-1063 | 9,77 | Fânețe | Culme | Neuniform |

| |
|--|
| Altitudine: 450-500 Expoziție: S Înclinație: 15-20 % Sol:Aluviosol |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> |
| 50% Graminee: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> (50%); |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) |
| 13 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderales</i>, <i>Xeranthemum annuum</i>... |
| 20% vegetatie lemnoasa |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O),ing org 30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. |
| - cu angajament de agro-mediu;; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

27.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 34 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | <i>Valea Lupului</i> | 1084-1089/1 | 26,91 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 400-450 Expoziție: S-E Înclinație: 20-25%% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaeumum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaeumum</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderales</i>, <i>Xeranthemum annuum</i>... | | | | | | |
| 10% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O),ing org 30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu;; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu | | | | | | |

specii din flora locală.

28.

| U.A.T. | Trupul de pajiște | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Șeica Mare | Tarla 35 | Top | | | | |
| Șeica Mare | Valean Lupului | 1094-1158/3 | 30,40 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300-330 Expoziție: N-E Înclinație: 20-25 % Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaeumum</i> | | | | | | |
| 55% Graminee: <i>Botriochloa ischaeumum</i> (55%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 13 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderales</i>, <i>Xeranthemum annuum</i>... | | | | | | |
| 11% vegetație lemnoasă | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 91 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5– 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12 - 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O),ing org 30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu:: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

29

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 36 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Fântina Maigului</i> | 1163-1177 | 1,64 | Fânețe | Versant de monoclin | Neuniform |
| Alitudine: 500-550 Expoziție: V Înclinație: 5-25% Sol: Stagnosol eluvic. | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> | | | | | | |
| 55 % Graminee: <i>Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> 55% | | | | | | |
| 15 % Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> (10%), <i>Coronilla varia</i> (1%), <i>Medicago sativa</i> (2%), <i>Lotus corniculatus</i> (2%) | | | | | | |
| 18% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (10%); <i>Achillea melifolium</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 2% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Allium ursinum</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3 – 5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 10 - 15t/ha) | | | | | | |
| 10% Vegetația lemnoasă: rar <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri | | | | | | |
| Lucrări executate. | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; tâlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

30.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 39 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Găunoasa</i> | 1383 | 1,99 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Alitudine: 300-500 Expoziție: V Înclinație: 2-50% Sol: Regosol eutric calcaric,Aluvisol eutric,calcaric,Luvisol albic stg,stagnosol preluvic. | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul) | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum,Agrostis stolonifera,Agropirum repens, Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum ,Agrostis stolonifera,Agropirum repens, Juncus cflusus-Molinia coerulea</i> | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Tripolium sp.</i> (5%), <i>Vicia cracca</i> (5 %), <i>Medicago sativa</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (2%) | | | | | | |
| 9 % Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (3%); <i>Thymus vulgaris</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante (<i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 1% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 90 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 – 0,4 bovine/ha sau 2 -3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 4 ovine/ha (producție masă verde 12 - 15 t/ha) | | | | | | |
| 10% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna, Rosa canina, tineri, Prunus spinosa</i> | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire urgentă a versantului N-E de vegetația tânără pentru a-l reda pașunatului, curațire de | | | | | | |

plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (100- 120 kg/ha N, 50 - 60 kg/ha P₂O₅, 50 – 60 kg/ha K₂O), supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.
- **cu angajament de agro-mediu;** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

31.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 40 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | <i>Valea Petișului</i> | 1405-1413 | 0,63 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: S-E Înclinație: 15-20% Sol: Aluviosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderales</i>, <i>Xeranthemum annuum</i>... | | | | | | |
| 5% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O),ing org 30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

32.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 41 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | <i>Coasta Râpii</i> | 1423-1440 | 53,02 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300-350 Expoziție: N Înclinație: 20-25% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |

| |
|--|
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> ... |
| 5% vegetație lemnoasă |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12 - 15 t/ha) |
| Lucrări propuse: curățire urgentă a versantului N-E de vegetația tânără pentru a-l reda pașunatului, curățire de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (100- 120 kg/ha N, 50 - 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 50 – 60 kg/ha K ₂ O), supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

33.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 42 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | <i>Șesul Râpii</i> | 1446-1518 | 1,99 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300-350 Expoziție: S-E Înclinație: 20-25% Sol: Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Brachypodium pinnatum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Brachypodium pinnatum</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> ... | | | | | | |
| 3% vegetație lemnoasă | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 93 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5– 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 6 ovine/ha (producție de 12 -15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ing.org.25to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

:

34.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 43 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | <i>Dealul Teiș</i> | 1522-1549 | 8,92 | Fânețe | Culme | Neuniform |

| |
|--|
| Altitudine: 300-350 Expoziție: S Înclinație: 20-25% Sol: Regosol calcaric |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): |
| Tipul de pajiște: Brachypodium pinnatum |
| 60% Graminee: Brachypodium pinnatum (60%); |
| 12% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (5%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) |
| 19 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... |
| 2% vegetatie lemnoasa |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 94 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 - 0,3 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 1– 3 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 10 -1 2 t/ha) VP 5-25 |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80kg/ha K ₂ O), ing.org.30to/ha, , supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor arbustilor cu acordul Ocolului silvic, pentru curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

35.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Taria 44 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | <i>Dealul Jidovului</i> | 1551-1604 | 10,09 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300-350 Expoziție: S Înclinație: 20-25 % Sol: Aluviosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 5% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha). | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ing org 30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

36.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 45 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Coasta Mărului | 1613-1696 | 49,38 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 450-500 Expoziție: S Înclinație: 40-45% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 10% vegetație lemnoasă | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5– 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrării propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire urgentă a versantului N-E de vegetația tânără pentru a-l reda pășunatului, curățire de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (100- 120 kg/ha N, 50 - 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 50 – 60 kg/ha K ₂ O), supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

37.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 46 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Coasta Mărului | 1721-1740 | 0,77 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300-350 Expoziție: S-E Înclinație: 25-30% Sol: Aluviosol calcaric | | | | | | |

| |
|---|
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis stolonifera-Agrophyron repens</i> |
| 50% Graminee: <i>Agrostis stolonifera-Agrophyron repens</i> (50%); |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderales</i>, <i>Xeranthenum annuum</i>... |
| 14% vegetatie lemnoasa |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 99 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (160kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O),ing.org.30to/ha supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

38.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 47 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | <i>Baza Sportivă</i> | 1753-1772 | 4,67 | Fânețe | Cuime | Neuniform |
| Altitudine: 300 Expoziție: N Înclinație: 1-10% Sol: Aluvisol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): apa freatica la 1-5 m. | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis stolonifera-Agrophyron repens</i> | | | | | | |
| 60 % Graminee <i>Agrostis stolonifera-Agrophyron repens</i> 60% | | | | | | |
| 10 % Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 20% Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderales</i>, <i>Xeranthenum annuum</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 96 % | | | | | | |
| 5% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 vaci/ha sau 2 - 3 oi/ha (producție masă verde 5 –7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (145 kg/ha N, 50 kg/ha P₂O₅, 25 kg/ha K₂O),ingrasaminte org.25 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 48 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Coasta Furcii | 1779-1805 | 15,08 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: E Înclinație: 5 -15° Sol: : Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște <i>Botriochloa ischaeumum</i> | | | | | | |
| 60 % Graminee: <i>Botriochloa ischaeumum</i> (60%); | | | | | | |
| 10 % Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 vaci/ha sau 2 - 3 oi/ha (producție masă verde 5 –7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 12 - 15 t/ha) | | | | | | |
| 5% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 25 kg/ha K ₂ O), îngrășământ organic 25.t/ha , supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - <u>cu angajament de agro-mediu</u> : interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 49 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | În Cărării | 1823-1840 | 1,89 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: N-V Înclinație:20-25 % Sol: Aluviosol | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 3% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 98% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (160kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ing.org.30to/ha supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |

- **cu angajament de agro-mediu:** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

41.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 50 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Părăul Bodii | 1844-1870 | 25,52 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300-350 Expoziție: N-E Înclinație:20-25 % Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderale</i>, <i>Xeranthenum annuum</i>... | | | | | | |
| 4% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 99 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5– 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12 - 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire urgentă a versantului N-E de vegetația tânără pentru a-l reda pašunatului, curățire de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (100- 120 kg/ha N, 50 - 60 kg/ha P₂O₅, 50 – 60 kg/ha K₂O), supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

42.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 51 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Valea Mare | 1879-1896 | 4,40 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300 Expoziție: S Înclinație:10-15 % Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderale</i>, <i>Xeranthenum annuum</i>... | | | | | | |
| 3% vegetatie lemnoasa | | | | | | |

| |
|--|
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 98 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5– 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) |
| Lucrări executate: |
| Lucrări propuse: curățire urgentă a versantului N-E de vegetația tânără pentru a-l reda pašunatului, curățire de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (100- 120 kg/ha N, 50 - 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 50 – 60 kg/ha K ₂ O), supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

43.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 53 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | <i>Dupa Deal</i> | 1902/1-1922 | 3,17 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: S Înclinație: 40-45% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 20 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderale</i>, <i>Xeranthemum annuum</i>... | | | | | | |
| 5% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 97% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5– 7,0t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12 - 15 t/ha).. | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire urgentă a versantului N-E de vegetația tânără pentru a-l reda pašunatului, curățire de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (100- 120 kg/ha N, 50 - 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 50 – 60 kg/ha K ₂ O), supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

44.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 60 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | <i>Vale Mare</i> | 1950-1992 | 60,88 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300 Expoziție: V Înclinație: 20-25 % Sol: Gleiosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis canina-Phragmites</i> | | | | | | |

| |
|--|
| 50% Graminee: <i>Agrostis canina-Phragmites</i> (50%); |
| 15% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderale</i>, <i>Xeranthenum annuum</i>... |
| 5% vegetatie lemnoasa |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 - 0,3 bovine/ha sau 1 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3– 4 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,5 bovină/ha sau 3 ovine/ha (producție de 7 - 10 t/ha) |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 80 kg/ha P ₂ O ₅ , 80 kg/ha K ₂ O),ing.org 30 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. r |

45.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 61 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | Valea Mare | 2002-2015 | 31,83 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: S-E Înclinație: 25-30% Sol: Preluvosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): versanti umbriti | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Festuca rubra</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Festuca rubra</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 20 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 5% Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderale</i>, <i>Xeranthenum annuum</i>... | | | | | | |
| 5% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: : în condiții actuale 0,6 - 0,8 bovine/ha sau 3 - 5 ovine/ha (producție masă verde 5-10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5-6 ovine/ha (producție de 12 - 15 t/ha)VP;25-50. | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (170kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org.35to/ha , supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târiile organizată; folosire rațională a pajiștii, scoaterea cioatelor,taierea arbustilor, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor, arbustilor cu acordul Ocolului silvic; pentru curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală | | | | | | |

46.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 63 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | Valea Mare | 2035-2076 | 35,44 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300-350 Expoziție: S-V Înclinație: 20-25 % Sol: Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 20% Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderale</i>, <i>Xeranthenum annuum</i>... | | | | | | |
| 15% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5– 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12 - 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O), îngrășământ organic 25 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii. scoaterea cioatelor, taierea arborilor, arbuștilor cu acordul Ocolului silvic, pentru curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală t/ha.... | | | | | | |

47.

| U.A.T | Trupul de pajiște Tarla 64 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | Dealul Sigherului | 2088-2093 | 13,30 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300-350 Expoziție: E Înclinație: 15-20% Sol: Gleiosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis canina-Phragmites</i> | | | | | | |
| 40% Graminee: <i>Agrostis canina-Phragmites</i> (40%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 20 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderale</i>, <i>Xeranthenum annuum</i>... | | | | | | |
| 25% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 97 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 - 0,3 bovine/ha sau 1 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3– 4 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,5 bovină/ha sau 3 ovine/ha (producție de 7 - 10 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 80 kg/ha P₂O₅, 80 kg/ha K₂O), ing.org 30 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii. scoaterea cioatelor, taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau | | | | | | |

gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

48.

| U.A.T. | Trupul de pajiște | Parcela descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|----------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| Șeica Mare | T.69 <i>Ville Istioanului</i> | 2189/2- 2207/3 | 25,15 | Fânețe | culme | Ne uniforma |
| Altitudine:350 Expoziție: S -E Înclinație: 15-20% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 40% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> <i>Agrostis tenuis</i> <i>Festuca rupicola</i> , alte graminee(<i>Festuca pratensis</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Bromus inermis</i>) | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Trifolium sp.</i> 4%, <i>medicago sativa</i> 4% , <i>lotus corniculatus</i> 2% | | | | | | |
| 15% Diverse plante: <i>Achillea m.</i> (5%), <i>Thymus vulgaris</i> (5%), <i>Plantago m.</i> (5%), | | | | | | |
| 5% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 92 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 – 0,6 bovine/ha sau 2 -3 ovine/ha (producție masă verde 5– 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 12 - 15 t/ha) | | | | | | |
| 22% Vegetatie lemnoasă: | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ling.org. 30. supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu.; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

49.

| U.A.T. | Trupul de pajiște | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------|
| 22,2 | Tarla 70 | Top | | | | |
| Șeica Mare | Între Lacuri | 2217-2250/2 | 32,67 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300Expoziție: E Înclinație: 10-15% Sol: Gleiosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis canina-Phragmites</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Agrostis canina-Phragmites</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> ... | | | | | | |
| 10% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 – 0,4 bovine/ha sau 2 -3 ovine/ha (producție masă verde 1-5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,6 bovină/ha sau 5 ovină/ha (producție masă verde 5 - 8 t/ha) | | | | | | |

V.P.0-15

Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; curățire și ; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O),ingrasamint org. 30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor arbustilor cu acordul Ocolului silvic, pentru curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.

- **cu angajament de agro-mediu;** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală t/

50.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 71 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | La moara lui Culae | 2252-2286 | 3,03 | Fânețe | Culme | Neuniform |

Altitudine: 250-300 Expoziție:S-E Înclinație: 15-20% Sol: Aluviosol calcaric

Datele staționale suplimentare (dacă este cazul):

| |
|---|
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> |
| 60% Graminee: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> (60%); |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderales</i>, <i>Xeranthemum annuum</i>... |
| 3% vegetatie lemnoasa |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 98 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (160kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ing.org.30to/ha supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. |
| - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

51.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 72 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Dosul Iștioanului | 2290-2323 | 40,82 | Fânețe | Culme | Neuniform |

Altitudine: 250-300 Expoziție: S-V Înclinație:15-20 % Sol: Regosol calcaric

Datele staționale suplimentare (dacă este cazul):

| |
|--|
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> |
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) |

| |
|--|
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderale</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> ... |
| 5% vegetatie lemnoasa |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100% |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12 - 15 t/ha) |
| Lucrări executate: |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamant organic 25 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajistii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor, arbustilor cu acordul Ocolului silvic, pentru curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală t/ha.... |

52.

| U.A.T | Trupul de pajște Tarla 75 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | În Hedel | 2340-2363 | 81,45 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 450-500 Expoziție: S-E Înclinație: 25-30 % Sol: Gleiosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajște: <i>Agrostis canina-Phragmites australis</i> | | | | | | |
| 50 % Graminee: <i>Agrostis canina-Phragmites australis</i> | | | | | | |
| 20 % Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (10%), <i>Lotus corniculatus</i> (6%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 15 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderale</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 97 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 vaci/ha sau 2 - 3 oi/ha (producție masă verde 4 –5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| 10% Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> [arbusti in palcuri raslete | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă; curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150 kg/ha N,60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajistii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

53.

| U.A.T. | Trupul de pajște Tarla 76 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | În Hedel | 2370-2419 | 66,46 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 450-500 Expoziție: S-V Înclinație: 30-35 % Sol: Faeoziom | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |

| |
|--|
| Tipul de pajiște: <i>Festuca pratensis</i> |
| 50% Graminee: <i>Festuca pratensis</i>(50%); |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) |
| 18 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderales</i>, <i>Xeranthenum annuum</i>... |
| 15% vegetatie lemnoasa |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95% |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (130kg/ha N, 40 kg/ha P ₂ O ₅ , 40 kg/ha K ₂ O), ing.org.20 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. |
| - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

54.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 77 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | Pe Visa | 2428-2462 | 7,93 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300-350 Expoziție: S-E Înclinație: 15-20% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderales</i>, <i>Xeranthenum annuum</i>... | | | | | | |
| 12% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 97 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12 - 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamant organic 25 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor, arbustilor cu acordul Ocolului silvic, pentru curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală t/ha.... | | | | | | |

55.

| U.A.T. 2 | Trupul de pajiște Tarla 79 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | În Baltă | 2517-2555 | 29,82 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: S-V Înclinație: 2025% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 20 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 3% Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderales</i>, <i>Xeranthemum annuum</i>... | | | | | | |
| 5% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 98 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5– 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12 - 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O), îngrășământ organic 25 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor, taierea arborilor, arbustilor cu acordul Ocolului silvic, pentru curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală t/ha.... | | | | | | |

56.

| U.A.T | Trupul de pajiște Tarla 80 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | Valea Puțului | 2562-2597 | 59,93 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: S-E Înclinație: 20-25% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 55% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (55%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderales</i>, <i>Xeranthemum annuum</i>... | | | | | | |
| 5% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O), îngrășământ organic 25 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor, taierea arborilor, arbustilor cu acordul Ocolului silvic, pentru curățire repetată de vegetație lemnoasă | | | | | | |

silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.
 - **cu angajament de agro-mediu;** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală t/ha....

57.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 81 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Pipirige | 2602-2618 | 4,72 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350 Expoziție: S-E Înclinație:20-25 % Sol: Gleiosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis canina-Phragmites</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Agrostis canina-Phragmites</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderale</i>, <i>Xeranthenum annuum</i>... | | | | | | |
| 3% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,2 - 0,3 bovine/ha sau 1 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3– 4 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,5 bovină/ha sau 3 ovine/ha (producție de 7-10t/ha | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; curățire și ; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O),ingrasamint org. 30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor arbustilor cu acordul Ocolului silvic, pentru curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - <u>cu angajament de agro-mediu;</u> interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală t/ha.... | | | | | | |

58.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 82 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Dealul Chilieii | 2625-2647 | 3,59 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 250-300 Expoziție: S Înclinație:10-15 % Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderale</i>, <i>Xeranthemum annuum</i>... | | | | | | |
| 5% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12 - 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse - fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O), îngrășământ organic 25 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor, taierea arborilor, arbustilor cu acordul Ocolului silvic, pentru curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

59.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 83 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--------|-------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
|--------|-------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|

| | | Top | | | | |
|--|-------|-----------|-------|--------|-------|-----------|
| Șeica Mare | Lăcuț | 2648-2685 | 30,45 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300 Expoziție: S-V Înclinație: 15-20 % Sol: Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște; <i>Agrostis capilaris</i> - <i>Poua pratensis</i> | | | | | | |
| 50 % Graminee <i>Agrostis capilaris</i> - <i>Poua pratensis</i> 50% | | | | | | |
| 30 % Leguminoase: <i>Tripholium sp.</i> (25%), <i>Medicago sativa</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (2%) | | | | | | |
| 14% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (10%); <i>Thymus vulgaris</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,6 – 0,8 bovine/ha sau 4 -5 ovine/ha (producție masă verde 7– 10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovină/ha (producție masă verde 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| 5% Vegetația lemnoasă: rar <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; curățire și ; fertilizare anuală (60 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 50 kg/ha K ₂ O),ingrasamint org. 25 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - <u>cu angajament de agro-mediu</u> ; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

60.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 84 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Moldă | 2687 -2720 | 7,06 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350 Expoziție: E Înclinație:15-20 % Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 5% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamant organic 25 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor, arbustilor cu acordul Ocolului silvic, pentru curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |

- **cu angajament de agro-mediu;** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

61.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 85 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Husulab | 2724-2738 | 2,62 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 280-300 Expoziție: S Înclinație: 15-20 % Sol: Faeoziom | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște; Agrostis capilaris-Poa pratensis | | | | | | |
| 50 % Graminee Agrostis capilaris-Poa pratensis 50% | | | | | | |
| 20 % Leguminoase: Tripodium sp., Medicago sativa, Lotus corniculatus | | | | | | |
| 18% Diverse plante: Aquilea millefolium; Thymus vulgaris; Taraxacum sp.; alte plante (Daucus carota, Prunella vulgaris, Potentilla sp., Rumex sp., Agrimonia eupatoria...) | | | | | | |
| 3 % Plante dăunătoare și toxice: Carduus sp., Eryngium campestre | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95% | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,6 – 0,8 bovine/ha sau 4 -5 ovine/ha (producție masă verde 7– 10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovină/ha (producție masă verde 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| 5% Vegetația lemnoasă: rar Crataegus monogyna, Rosa canina, tineri | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; curățire și ; fertilizare anuală (135 kg/ha N, 40 kg/ha P₂O₅, 50 kg/ha K₂O), îngrășământ org. 20t/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii. scoaterea cioatelor, taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

62.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 86 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Părăuț | 2747-2758 | 4,15 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350 Expoziție: S Înclinație: 15-20% Sol: Faeoziom | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște; Agrostis capilaris-Poa pratensis | | | | | | |
| 50 % Graminee Agrostis capilaris-Poa pratensis 50% | | | | | | |
| 30 % Leguminoase: Tripodium sp. (25%), Medicago sativa (3%), Lotus corniculatus (2%) | | | | | | |
| 15% Diverse plante: Aquilea millefolium; Thymus vulgaris; Taraxacum sp.; alte plante (Daucus carota, Prunella vulgaris, Potentilla sp., Rumex sp., Agrimonia eupatoria...) | | | | | | |
| 1 % Plante dăunătoare și toxice: Carduus sp., Eryngium campestre | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,6 – 0,8 bovine/ha sau 4 -5 ovine/ha (producție masă verde 7– 10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovină/ha (producție masă verde 15 - | | | | | | |

| |
|--|
| 20 t/ha) |
| 3% Vegetația lemnoasă: rar <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri |
| Lucrări executate: |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; curățire și ; fertilizare anuală (135 kg/ha N, 40 kg/ha P ₂ O ₅ , 50 kg/ha K ₂ O),ingrasamint org. 20to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: ; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

63.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 87 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Molda | 2762-2786 | 6,97 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: S Înclinație: 20% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderales</i>, <i>Xeranthemum annuum</i>... | | | | | | |
| 5% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12 - 15 t/ha). | | | | | | |
| Lucrări propuse; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamant organic 25 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor, arbustilor cu acordul Ocolului silvic, pentru curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. cu angajament de agro-mediu: ; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

64.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 88 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 22,4 | Redea | 2805-2854 | 7,74 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 300-350 Expoziție: S-E Înclinație: 15-20% Sol: Aluvisol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis canina-Phragmites australis</i> | | | | | | |
| 50 % Graminee: <i>Agrostis canina-Phragmites australis</i> | | | | | | |

| |
|---|
| 20 % Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (10%), <i>Lotus corniculatus</i> (6%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) |
| 25 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderale</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 98 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 vaci/ha sau 2 - 3 oi/ha (producție masă verde 4 –5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție masă verde 15 - 20 t/ha) |
| 3 % Vegetația lemnoasă: <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> [arbusti in palcuri raslete |
| Lucrări executate: |
| Lucrări propuse: curățire vegetație lemnoasă; curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor, taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

65.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 90 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | Redea | 2857-2932 | 37,91 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 350-400 Expoziție: N-V Înclinație: 10-25% Sol: Aluviosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 13 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderale</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> ... | | | | | | |
| 25% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 98 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12 - 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), ing.org 30to/ha. supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor, taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |
| Lucrări propuse: | | | | | | |

66

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 91 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--------|-------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
|--------|-------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|

| | | Top | | | | |
|---|------------|-----------|-------|--------|-------|-----------|
| Șeica Mare | La Ochiuri | 2955-3009 | 42,70 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Alitudine:250-300 Expoziție: N-E Înclinație: 10-25% Sol: Aluviosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 3% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 98 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| <p>Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O), ing.org 30to/ha. supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.</p> <p>- cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.</p> | | | | | | |

67.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 92 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Grivoaia | 3018-3075/2 | 30,81 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Alitudine: 450-480 Expoziție: S-E Înclinație:25-35 % Sol: Aluviosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 60% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (60%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 23 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2% Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 5% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,0t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12 - 15 t/ha) | | | | | | |
| <p>Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O), ing.org 30to/ha. supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire</p> | | | | | | |

organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.

- **cu angajament de agro-mediu;** interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

Lucrări propuse:

68.

| U.A.T. | Trupul de pajiște T 93 | Parcela Descriptivă Top. | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | <i>Grivoaia</i> | 3077-3084/6 | 15,22 | Faneata | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 450 Expoziție: S-E Înclinație: 35-40 Sol:Aluviosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> | | | | | | |
| 45% Graminee: <i>Agrostis stolonifera-Agropyron repens</i> (45%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 8 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> ... | | | | | | |
| 35% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 - 0,6 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire vegetatie lemnoasa: curățire vegetație lemnoasă și fertilizare anuală (150kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ing org 30to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

69.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 94 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Lanul lui Onuț | 3096/1-3129 | 20,72 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 400 Expoziție: S-E Înclinație:3035 % Sol:Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Brachypodium pinnatum</i> | | | | | | |
| 45% Graminee: <i>Brachypodium pinnatum</i> (45%); | | | | | | |

| |
|---|
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) |
| 8 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthenum annuum</i> ... |
| 35% vegetatie lemnoasa |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100 % |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 3– 5 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8 bovină/ha sau 6 ovine/ha (producție de 10 -1 2 t/ha) |
| Lucrări propuse; fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamant organic 25 to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor, arbustilor cu acordul Ocolului silvic, pentru curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. |

134.

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarala 172 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|--|---------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | Pășunea Sașilor | 6057-6092 | 12,41 | Fânețe | Versant umbrit uniform | Uniform |
| Altitudine: 250 Expoziție: E Înclinație:1- 25° Sol: luvosol stagnogleizat slab | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște;Festuca rubra | | | | | | |
| 50 % Festuca rubra | | | | | | |
| 10 % Leguminoase: <i>Tripholium sp.</i> (5%), <i>Medicago sativa</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (2%) | | | | | | |
| 13% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (10%); <i>Thymus vulgaris</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 2% Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 – 0,6 bovine/ha sau 2 -3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovină/ha (producție masă verde 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| 20% Vegetația lemnoasă: rar <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; curățire și ; fertilizare anuală (180 kg/ha N, 70 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O),ingrasamint org. 35to/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii.scoaterea cioatelor,taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 173 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | Pășunea Sașilor | 6104-6130/2 | 12,81 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 250 Expoziție: E Înclinație: 1- 25° Sol: luvosol stagnogleizat slab | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște; Festuca rubra | | | | | | |
| 50 % Festuca rubra | | | | | | |
| 10 % Leguminoase: <i>Tripholium sp.</i> (5%), <i>Medicago sativa</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (2%) | | | | | | |
| 8% Diverse plante: <i>Aquilea millefolium</i> (10%); <i>Thymus vulgaris</i> (3%); <i>Taraxacum sp.</i> (2%); 3% alte plante (<i>Daucus carota</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Potentilla sp.</i> , <i>Rumex sp.</i> , <i>Agrimonia eupatoria</i> ...) | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Carduus sp.</i> , <i>Eryngium campestre</i> | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 100 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,4 – 0,6 bovine/ha sau 2 -3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 10 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 1 bovină/ha sau 5 ovină/ha (producție masă verde 15 - 20 t/ha) | | | | | | |
| 25% Vegetația lemnoasă: rar <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Rosa canina</i> , tineri | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: curățire repetată de plante dăunătoare și vegetație lemnoasă; curățire și ; fertilizare anuală (180 kg/ha N, 70 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), îngrășământ org. 35t/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii. scoaterea cioatelor, taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatare. | | | | | | |
| - cu angajament de agro-mediu:; interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

| U.A.T. | Trupul de pajiște Tarla 174 | Parcela Descriptivă | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| <i>Șeica Mare</i> | Zăpodia Cetății | 6165-6203 | 18,77 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 250-300 Expoziție: S-E Înclinație: 5-30% Sol: Regosol calcaric | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 8 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i> , <i>Prunella vulgaris</i> , <i>Geranium pratense</i> ... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i> , <i>Veratrum album</i> , <i>Xanthium sp.</i> , <i>Lepidium ruderales</i> , <i>Xeranthemum annuum</i> ... | | | | | | |
| 25% vegetatie lemnoasa | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 95 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |

Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P₂O₅, 60 kg/ha K₂O), îngrășământ organic 25 t/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii. scoaterea cioatelor, taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație.
- cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală.

137.

| U.A.T. Șeica Mare | Trupul de pajiște Tarla 175 | Parcela Descriptivă Top | Suprafața (ha) | Categoria de folosință | Unitatea de relief | Configurația |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Șeica Mare | Zăpodia Cetății | 6206-6212 | 9,39 | Fânețe | Culme | Neuniform |
| Altitudine: 250-500 Expoziție: Vestică Înclinație: 10-25% Sol: Regosol | | | | | | |
| Datele staționale suplimentare (dacă este cazul): | | | | | | |
| Tipul de pajiște: <i>Botriochloa ischaemum</i> | | | | | | |
| 50% Graminee: <i>Botriochloa ischaemum</i> (50%); | | | | | | |
| 10% Leguminoase: <i>Medicago falcata</i> (3%), <i>Lotus corniculatus</i> (3%), <i>Medicago lupulina</i> (2%), <i>Trifolium campestre</i> (2%) | | | | | | |
| 8 % Diverse plante: <i>Potentilla erecta</i>, <i>Prunella vulgaris</i>, <i>Geranium pratense</i>... | | | | | | |
| 2 % Plante dăunătoare și toxice: <i>Euforbia cyparissias</i>, <i>Veratrum album</i>, <i>Xanthium sp.</i>, <i>Lepidium ruderales</i>, <i>Xeranthemum annuum</i>... | | | | | | |
| 20% vegetație lemnoasă | | | | | | |
| Gradul de acoperire cu vegetație a parcelei: 90 % | | | | | | |
| Încărcarea cu animale: în condiții actuale 0,3 - 0,5 bovine/ha sau 2 - 3 ovine/ha (producție masă verde 5 – 7,0 t/ha); în condiții îmbunătățite conform lucrări propuse, 0,8bovină/ha sau 5 ovine/ha (producție de 12- 15 t/ha) | | | | | | |
| Lucrări executate: | | | | | | |
| Lucrări propuse: fertilizare anuală (150 kg/ha N, 60 kg/ha P ₂ O ₅ , 60 kg/ha K ₂ O), îngrășământ organic 25 t/ha, supraînsămânțare cu amestecuri de specii valoroase; târlire organizată; folosire rațională a pajiștii. scoaterea cioatelor, taierea arborilor cu acordul Ocolului silvic, curățire repetată de vegetație lemnoasă silvică; cosire cel puțin o dată pe an; reparare și întreținere drumuri de exploatație. - cu angajament de agro-mediu: interzis arderea vegetației; fertilizare anuală cu gunoi de bovine 5,5 t/ha, sau gunoi de ovine 3,6 t/ha. Cosire după 1 iulie; lucrările executate manual; interzis discuitul; supraînsămânțare cu specii din flora locală. | | | | | | |

CAP. 8. RECOMANDARI. DIVERSE

8.1. BONITAREA TERENURILOR CU PAJIȘTI

Clasa de calitate a terenurilor pentru folosința pajiște se obține pe baza notei de bonitare, rezultată din produsul a 17 indicatori ecopedologici, de climă, sol, teren și hidrologie, conform metodologiei ICPA (1987).

Clasa și nota de bonitare pentru pajiști din teritoriul Șeica Mare 2018.

| Clasa | Nota | Interpretare | Ha | % |
|-------|----------|--|---------|------|
| I | 81 - 100 | Foarte bună, fără limitări sau pericole de degradare (FB) | 33,08 | 1,18 |
| II | 61 – 80 | Bună, cu limitări sau pericole de degradare reduse (B) | 190,58 | 6,79 |
| III | 41 – 60 | Mijlocie, cu limitări sau pericole de degradare moderate (M) | 690,03 | 24,6 |
| IV | 21 – 40 | Slabă, cu limitări sau pericole de degradare severe (S) | 1685,88 | 60,1 |
| V | 1 – 20 | Foarte slabă, cu limitări sau pericole de degradare foarte severe (FS) | 164,4 | 5,86 |
| VI | 0 | Terenuri improprii pentru pajiști (IMP) | 41,18 | 1,47 |

Nota medie de bonitare: 53- Clasa III (US 1-23); 49 clasa III (US 1-25).

| US | Tip | Sol | Textura | | Nota | Clasa | Ha | % |
|----|-----|-----|---------|----------|------|-------|---------|-------|
| | | | A | AC; B | | | | |
| 1 | RS | eu | S | S | 40 | IV | 141,87 | 5,05 |
| 2 | | ka | U | U | 36 | IV | 1284,42 | 45,79 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------|-------|---|----|-----|--------|--------|--------|------|
| 3 | AS | eu-en | S | S | 60 | 40 | III | 9,07 | 0,32 | |
| 4 | | eu | S | U | 80 | | II | 44,28 | 1,58 | |
| 5 | | ka-en-gc3 | U | U | 46 | | III | 13,73 | 0,49 | |
| 6 | | ka | S | S | 87 | | I | 32,53 | 1,16 | |
| 7 | | ka-gc3 | S | S | 77 | | II | 31,2 | 1,11 | |
| 8 | | ka-co | S | S | 75 | | II | 98,01 | 3,49 | |
| 9 | | FZ | ar-cl | T | T | | 51 | III | 146,67 | 5,23 |
| 10 | | | al | S | L | | 73 | II | 17,09 | 0,61 |
| 11 | al-ka | | L | S | 84 | I | 0,55 | 0,02 | | |
| 12 | EL | ti | S | L | 57 | III | 30,7 | 1,13 | | |
| 13 | | ti | L | T | 44 | III | 23,68 | 0,84 | | |
| 14 | | ro-st2 | L | T | 60 | III | 5,0 | 0,18 | | |
| 15 | LV | st2 | S | L | 53 | III | 45,78 | 1,63 | | |
| 16 | | st2 | S | T | 52 | III | 129,64 | 4,62 | | |
| 17 | | st3 | L | T | 55 | III | 263,3 | 9,39 | | |
| 18 | | st4 | S | T | 51 | III | 21,85 | 0,78 | | |
| 19 | | ab- st4 | S | T | 46 | III | 0,61 | 0,02 | | |
| 20 | SG | el | S | T | 35 | IV | 24,81 | 0,88 | | |
| 21 | GS | eu | S | U | 15 | V | 38,08 | 1,36 | | |
| 22 | | ka-al | T | A | 14 | V | 126,32 | 4,5 | | |
| 23 | RS | ka (70%) | U | U | 36 | 40 | IV | 164,35 | 5,86 | |
| | FZ | ar-cl (30) | T | T | 41 | | | 70,43 | 2,51 | |
| 24 | H | Ape | - | - | 0 | VI | 11,75 | 0,41 | | |
| 25 | Nr | Râpe, ravene | - | - | 0 | VI | 29,43 | 1,05 | | |

Fertilizarea cu azot: primăvara și după pășunat sau cosit; cu fosfor și potasiu: toamna sau primăvara și se grăpează, se pot aplica și doze mai mari la 2 ani. Pe versanții nordici și în anii ploioși dozele de NPK se măresc.

Se recomandă fertilizarea pajiștilor de calitate foarte bună-mijlocie (clasa I-III). Fertilizarea organică (la 4-5 ani) în funcție de indicii azot (IN):

| IN | Apreciere | Doza de gunoi de grajd t/ha |
|-----|-------------|-----------------------------|
| 1 | Foarte mic | 35 |
| 1-2 | Mic | 30 |
| 2-3 | Moderat | 25 |
| 3-4 | Moderat | 20 |
| 4-5 | Mare | 15 |
| 5-6 | Mare | 10 |
| 6 | Foarte mare | 0 |

Amendamentele cu calcar se aplică la 5-7 ani toamna și se grăpează de 2 ori.

Urgența de amendare

| | pH (H ₂ O) | VAh % |
|-----|-----------------------|-------|
| I | 5 | 40 |
| II | 5-5,4 | 40-50 |
| III | 5,4-5,8 | 50-75 |

La o medie pe țară a IN: 2%, P: 10 ppm și K: 120 ppm, se recomandă doze de N: 120-150; P₂O₅: 30-60 și K₂O: 65-100 (numai pe terenul fertilizat cu N și P).

Îngrășăminte minerale:

Azot: azotat de amoniu, uree, sulfat de amoniu, nitrocalcar (pe sol acid).

Fosfor: superfosfat.

Potasiu: sare potasică, clorură de potasiu.

8.2. FACTORII LIMITATIVI AI PRODUCȚIEI ȘI MĂSURI DE AMELIORARE A PAJIȘTILOR TERITORIUL ȘECA MARE ANUL 2018

| Factori limitativi și măsuri de ameliorare | Ha | % |
|--|---------|-------|
| 1. Aciditate: pH < 5,8; Vah < 75%. Amendare cu calcare pe baza cartării agrochimice (50-60% din Ah). US: 12,15-20. | 516,69 | 18,42 |
| 2. Rezerva de humus redusă: sub 120 t/ha. Fertilizarea ameliorativă organică și minerală în doze mari. US: 1-5,7,8,12,14-19,21-23. | 2518,64 | 89,79 |
| 3. Textura fină la suprafață: argilă > 33%. Drenaj superficial pe terenuri cu pantă < 10%. US: 22. | 126,32 | 4,5 |
| 4. Compactitate: gradul de tasare > 18% urgența I; 10-18% urgența II; 1-10% urgența III. Afânare adâncă pe terenuri cu exces de umiditate, pe pante < 10%, fără alunecări de teren și apa freatică > 1,5 m. US: 14 (50%), 17 (50%), 18 (80%), 19,20 (70%). | 170,86 | 6,09 |
| 5. Volumul edafic redus: < 50%. Neameliorabil. US: - | - | - |
| 6. Portanță redusă. Desecare, drenaj, destufizare. US: 15,17,18,19 (40% din fiecare). | 132,61 | 4,73 |
| 7. Panta terenului: > 10% și pericol la eroziune. Terasare agrotehnică antierozională, împădurire pe pante > 50%. US: 12,13 și parțial (60%), 1,2,9,14-18,23. | 1418,36 | 50,56 |
| 8. Eroziune în suprafață, agrotehnică antierozională. | 285,25 | 10,17 |

| | | |
|---|--------|-------|
| US: 1 și 2 parțial (20%). | | |
| 9.Pericol de eroziune în adâncime: ogașe, ravene torenți. Amenajări antierozionale specifice, împăduriri. US: 25. | 29,43 | 1,05 |
| 10.Alunecări de teren și excesul de umiditate din izvoare de coastă. Amenajări specifice și/sau împăduriri. US: 9,16,23 și parțial (30%), 1,2,13. | 711,06 | 25,35 |
| 11.Stânci, bolovani, pietre la suprafață. Îndepărtarea pietrelor și bolovanilor. US: - | - | - |
| 12.Exces de umiditate freatică: apa freatică la 0-1 m adâncime și gleizare moderată-foarte puternică-submers. Desecare, drenaj (apa < 1 m), destufizare, drenaj, nivelare. US: 5,7,21,22. | 209,33 | 7,46 |
| 13.Exces de umiditate stagnantă pe pante < 12%, puternic excesiv. Desecare, drenaj superficial (șanțuri rigole). US: 18,19,20 și parțial (30%), 14,15,17. | 141,49 | 5,04 |
| 14.Inundabilitatea frecvent-foarte frecvent (< 5 ani). Îndiguiuri/regularizarea cursului de apă. US: 3-7,22 și parțial (50%), 21. | 149,85 | 5,34 |
| 15.Temperaturi scăzute: < 6°C medie anuală. US: - | - | - |

Unități pedoameliorative

1. Regosoluri pe versanți ± alunecări de teren (US 1,2,23).
2. Aluviosoluri gleizate în lunci (US 5,7).
3. Faeoziomuri pe versanți cu alunecări de teren (US 9,23).
4. Preluvosoluri, luvosoluri și stagnosoluri pe terenuri cu pante $\geq 10\%$, cu exces de umiditate stagnantă și aciditate (US 14,15,17,18,19,20).
5. Preluvosoluri și luvosoluri pe versanți cu alunecări de teren (US 13,16).

6. Gleiosoluri în lunci cu apa freatică la 0,5-1 m și pe versanși cu izvoare de coastă (US 21,22).

7. Terenuri neproductive cu râpe, alunecări de teren active, ravene și torenți (US 25).

| PLANUL DE AMENDARE ȘI FERTILIZARE. Teritoriul Șeica Mare Anul 2018 | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|---------------|------|--------|---------|---------------------------|-----------|--------|------|---|
| Nr IS | Sol | | CaCO3 t/ha | Azot | Fosfor | Potasiu | Gunoi de grajd t/ha | Suprafața | | | |
| | Tip | Subtip | | | | | | kg/ha. SA | | Ha | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | RS | eu | 0 | 150 | 80 | 70 | 30 | 141,87 | 5,05 | | |
| | | ka | 0 | 150 | 60 | 60 | 25 | 1284,42 | 45,79 | | |
| | S | eu-en | 0 | 160 | 70 | 70 | 30 | 9,07 | 0,32 | | |
| | | eu | 0 | 160 | 60 | 60 | 30 | 44,28 | 1,58 | | |
| | | ka-en-gc | 0 | 160 | 75 | 75 | 30 | 13,73 | 0,49 | | |
| | | ka | 0 | 145 | 50 | 50 | 25 | 32,53 | 1,16 | | |
| | | ka-gc | 0 | 150 | 55 | 55 | 30 | 31,2 | 1,11 | | |
| | | ka-co | 0 | 160 | 60 | 60 | 30 | 98,01 | 3,49 | | |
| | | FZ | ar-cl | 0 | 130 | 40 | 40 | 20 | 146,67 | 5,23 | |
| | | al | 0 | 145 | 30 | 30 | 25 | 17,09 | 0,61 | | |
| | | al-ka | 0 | 135 | 50 | 50 | 20 | 0,55 | 0,02 | | |
| | EL | ti | 5 | 170 | 60 | 60 | 35 | 30,7 | 1,13 | | |
| | | ti | 0 | 160 | 60 | 55 | 30 | 23,68 | 0,84 | | |
| | | ro-st | 0 | 170 | 70 | 70 | 30 | 5,0 | 0,18 | | |
| | LV | st | 6 | 190 | 80 | 80 | 35 | 45,78 | 1,63 | | |
| | | st | 6 | 180 | 70 | 60 | 35 | 129,64 | 4,62 | | |
| | | st | 5 | 170 | 60 | 60 | 35 | 263,3 | 9,39 | | |
| | | st | 7 | 190 | 80 | 80 | 35 | 21,85 | 0,78 | | |
| | | ab-st | 4 | 180 | 75 | 75 | 35 | 0,61 | 0,02 | | |
| | SG | el | 6 | 150 | 80 | 80 | 30 | 24,81 | 0,88 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|-----------|---|-----|----|----|----|--------|------|
| 1 | GS | eu | 0 | 160 | 60 | 60 | 30 | 164,35 | 5,86 |
| 2 | | ka-al | 0 | 150 | 60 | 60 | 30 | 70,43 | 2,51 |
| 3 | RS | ka 70% | 0 | 150 | 70 | 70 | 25 | 11,75 | 0,41 |
| | FZ | ar-cl 30% | 0 | 130 | 40 | 50 | 20 | 29,43 | 1,05 |

8.3. TEHNOLOGII PENTRU AMELIORAREA PAJISTILOR

I Lucrări de suprafață

1. Scoaterea cioatelor. US: 1,2,12,13,17.
2. Nivelarea mușuroaielor. US: 3-8,10,11,12,14,15,17,18,19.
3. Degradarea de arbuști, arbori. US: 1,2,9,12-19,23.
4. Grăpat. US: 3-8,10,11,14,15,17-19.
5. Combaterea bolilor (cosiri repetate, combaterea chimică). US: 3-23.
6. Fertilizarea minerală și/sau organică. US: 1-8,12-23.
7. Amendare cu calcar. US: 12,15-20.
8. Autoînsămânțare. US: 1-23.
9. Supraînsămânțare. US 3-19,23.

II Lucrări radicale (pregătirea terenului, fertilizare, semănat ierburi). US: 4,6,7,10,11,14, 15,17-19.

III Eliminarea excesului de apă

1. Freatic. US: 5,7,21,22.
2. Stagnant. US: 15,17,18,19,20.
3. Regularizarea cursului de apă. US: 24.

IV Amenajarea terenurilor degradate

1. Alunecări de teren. US: 1,2,9,13,16,23,25.
2. Eroziune în adâncime. US: 25.
3. Împăduriri pe pante \geq 50-60%. US: 1,2.

V Folosirea rațională a pajiștei

1. Pășunat limitat. US: 1,2,9,13,16,23.
2. Pășunat rațional. US: 3-8,10-12,14,15,17-19.
3. Folosirea ca fâneață. US: 1-11,20-22,23.
4. Folosirea ca pășune. US: 12-15,17-19.

8.4. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A AMENAJAMENTULUI; DURATA ACESTUIA

Prezentul Amenajament pastoral intră în vigoare la data de **01 noiembrie 2018**.
Durata amenajamentului pastoral este de **10 ani**, până în 01 septembrie 2028.

8.5. COLECTIVUL DE ELABORARE A PREZENTEI LUCRĂRI

COLECTIVUL DE ELABORARE A PREZENTEI LUCRĂRI

Directia Agricola Judeteana Sibiu

Ing. DANILESCU ION
Ing. DRUSAN TIBERIU

Primăria Șeica Mare:- Primar - Șușa Nicolae

- Viceprimar- Benghea Florin
- Secretar comună - Coman Vasile
- Consilier – Menchiu Florin Andrei
- Consilier – Chiriac Radita
- Referent – Sobo Mariana
- Referent – Vlaic Daniela

8.6. HĂRȚILE CE SE ATAȘEAZĂ AMENAJAMENTULUI

Planul topografic de bază este "PLAN DE SITUAȚIE PENTRU CADASTRU FUNCJAR", scara 1:5000, aprobat de O.C.O.T.A. în anul 1989. Este compus din 3 secțiuni, atașate la prezenta lucrare.

9. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

- Andreea C. ANDREOIU, Vasile A. BLAJ, Cosmin S. CONSTANTINESCU, Marcela M. DRAGOȘ, Tudor A. ENE, Tudor A. ENE, Emil C. HAȘ, Emil ICHIM, Teodor MARUȘCA, Vasile MOCANU, Doina SILISTRU, Monica A. TOD, Sorin V. TOD, Paul M. ZEVEDEI, 2014. **Ghid de întocmire a Ameneajamentelor Pastorale**, Ed. Capolavoro, Brașov.
- Maria SCHITEA, Teodor MARUȘCA, Doina SILISTRU, Monica TOD, 2011. **Principalele soiuri de graminee și leguminoase perene de pajiști**, Ed. Capolavoro, Brașov.
- I. IONESCU, M. OSICEANU, 2009. **Cultura pajiștilor și a plantelor furajere**, Ed. Sitech, Craiova.
- Al. MOISUC, Gh. MOTCA, I. ROTARU, V. VINTU, 2004. **Cultura pajiștilor și a plantelor furajere**, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iași.
- I. ROTAR, Roxana VIDICAN, 2003. **Cultura pajiștilor**, Ed. Polirom, Cluj Napoca.
- I. IONESCU, 2003. **Cultura pajiștilor**, Ed. Sitech, Craiova.
- Teodor MARUȘCA, 1978. **Îmbunătățirea prin reînsămânțare a pajiștilor degradate**, MAIA, Redacția de Propagandă Tehnică Agricolă, București.
- Gh. BOLDEA, V. CARDASOL, Șt. CRĂCIUN, N. SIMTEA, 1990. **Reînsămânțarea și supraînsămânțarea pajiștilor**, Întreprinderea Poligrafică Deva.
- Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Sibiu, 2016. **Studiul Pedologic și agrochimic, Clase de calitate, Note de bonitare și aprovizionarea cu nutrienți**, Teritoriul Seica Mare.
- Pajistile dintre ȘEICA MARE și VESEUD SIT NATURA 2000.
- **Ordonanța de urgență a Guvernului – OUG nr. 34/2013** privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
- **Ordin nr. 544/2013** privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște, emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
- **Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013** privind Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013.
- **Hotărârea Guvernului nr. 78/2015** privind completarea și modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013.

